




Med
4257
- 1 -

Ausführliches
Recept-Taschenbuch
in
alphabetischer Ordnung
für
praktische Aerzte und Wandärzte.

Mit einleitenden Bemerkungen
über die Art und Weise Recepte zu verordnen.

Herausgegeben

von

J. Karl Wilh. Walther,

Doctor der Medicin und Chirurgie, Professor an der Universität und
Director der chirurg. Poliklinik zu Leipzig.



Erster Band.

L e i p z i g.

Verlag von Gebhardt & Reisland.

1847.

Rezept-Handbuch

alphabetischer Ordnung

praktische Arznei und Wundheilkunde

Mit einleitenden Bemerkungen

über die Art und Weise Rezepte zu verordnen



Leipzig

Verlag von G. B. H. H. H. H.

1883

V o r w o r t.

Bei der Herausgabe dieses Recept-Taschenbuches, welches ich nicht allein als eine Sammlung von Muster-Vorschriften zur Nachbildung für jüngere Aerzte angesehen zu wissen wünsche, sondern auch als eine Zusammenstellung bewährter Heilformeln von Aerzten aller Zeiten, habe ich im Allgemeinen Folgendes zu bemerken:

Bei der Anordnung ist das Arzneimittel selbst und nicht die Form zum Grunde gelegt, die verschiedenen Präparate desselben aber ebenfalls alphabetisch abgehandelt worden; bei den Salzen wählte ich die Basen. Der Uebereinstimmung wegen habe ich die neue Nomenklatur gewählt, die älteren Namen aber in parenthesi dazu gesetzt; und ob ich wohl im Allgemeinen der säch-

sischen Pharmakopoe gefolgt bin, so bin ich doch bisweilen, theils durch Hinzufügung neuer Arzneimittel, die nicht darin enthalten sind, theils durch Hinweglassung älterer Mittel, welche ich entweder für völlig unwirksam (namentlich gilt diess von trockenen Vegetabilien, z. B. *Arum maculatum*, *Asarum europaeum* u. s. w.), oder wenigstens für indifferent, oder leicht durch andere zu ersetzen halte, von derselben abgewichen. Ueberhaupt lag es in meinem Plane, manche Mittel, von deren Wirkung oder vielmehr Nichtwirkung wir theils durch chemische Untersuchungen, theils durch Versuche und Erfahrungen gegenwärtig eine geläutertere, bessere Ansicht gewonnen haben, aus der Reihe der Arzneimittel zu streichen, und aus dem grossen Vorrathe den Ballast, der nur belästiget, zu entfernen. So sind aus diesem ersten Bande von mir weggelassen worden:

Acacia nostras,

Actaea racemosa,

Alcanna spuria,

Alcornoc,

Alisma plantago,
Arum maculatum,
Asarum europaeum,
Asphaltum,
Beta rubra,
Berberinum,
Bistorta,
Brassica oleracea rubra,
Cancer fluviatilis,
Canella alba,
Cardamomum,
Carlina humilis,
Cerasa nigra,
Cerevisia,
Chaerophyllum bulbosum,
Chamaedrys,
Chamomilla romana,
Cichorium,
Clematis,
Consolida,
Convallaria majalis,
Coriandrum,
Curcuma,

Cynara scolymus,
 Cynoglossum,
 Daucus carotta,
 Delphinium staphysagria,
 Ebulus,
 Eruca,
 Faba,
 Foenum graecum,
 Genista tinctoria,
 Gentiana amarella,
 Geoffroya,
 Hedera terrestris,
 Hippocastanum,
 Hyssopus.

Eine besondere Rubrik habe ich den zu vermeidenden Verbindungen gewidmet, um chemische Fehler wo möglich zu verhüten. Von älteren Arzneiformeln sind mehrere aus dem Grunde aufgenommen worden, damit man ihre Zusammensetzung, die man oft vergeblich sucht, kennen lerne, wenn sie in Schriften angeführt werden.

Den äusserlichen Arzneimitteln, welche in den meisten Recept-Taschenbüchern stiefmütter-

lich behandelt werden, habe ich versucht gleiche Rechte zu verschaffen mit den inneren; denn die Chirurgie ist die ebenbürtige Schwester der Medicin.

Dass ich der Kürze wegen die Zahlen für die Gewichtsbestimmungen beibehalten habe, wird man wohl entschuldigen.

Die Anleitung zum Abfassen der Recepte soll als eine wissenschaftliche Einleitung für das Recept-Taschenbuch selbst angesehen werden.

Endlich habe ich noch dem Apotheker, Herrn Martens, meinen besonderen Dank abzustatten für den thätigen Beistand, welchen derselbe mir bei der Ausarbeitung dieses Taschenbuches geleistet hat.

Leipzig, im Mai 1847.

Der Herausgeber.

lich behandelt werden. Jede für diesen Zweck
Nothwendige zu verschaffen mit den meisten
die Ehre ist die nöthige Bedienung der
Medizin.

Es ist sehr der Mühe wegen die Kosten für die
Gewichtsbestimmungen beizubringen habe, und
man soll einsehen.

Die Leistung von Abgaben der Herrschaft soll
als eine wesentliche Leistung für die
Herrschaft angesehen werden.

Endlich habe ich noch den Antheil, den
Märkte, neuen besonderen Markt abzuhalten
für den thätigen Bestand, welchen Gesetze mit
bei der Ausarbeitung dieses Tachbuches ge-
leistet hat.

Leipzig im Jahr 1847

Der Herausgeber

R e c e p t i r k u n s t .

Allgemeine Receptirkunst.

Die ärztliche Receptirkunst*), *Katagraphologia, Ars formulas medicas concinnandi s. conscribendi*, ist die Kunst, gewisse, dem jedesmaligen Heilzwecke entsprechende Arzneimittel zu verordnen und deren Zubereitung zu bestimmen. Diese Verordnungen giebt der Arzt dem Apotheker schriftlich; man nennt sie *Recept, Formula, Praescriptio medica*, franz. *Formule, Recette, Ordonnance*; engl. *Formule, Receipt, Prescription*. Der Name Recept kommt her von *re-cipe*, oder *recipiatur*, nimm, oder es werde genommen.

Das Recept ist ein Zeugniß von den Kenntnissen des Arztes, in Beziehung auf den individuellen Krankheitsfall sowohl, als auch auf die vorzunehmende pharmaceutische Zubereitung der verordneten Arzneimittel, und hat in vorkommenden Fällen gerichtliche Beweiskraft. Es muss deutlich geschrieben, mit dem Datum, dem Namen des Arztes und des Kranken versehen sein. Die chemischen Zeichen, deren man sich ehemals bediente, müssen vermieden werden, und nur die allgemein gebräuchlichen und verständlichen Abkürzungen sind erlaubt.

Das Recept muss lateinisch geschrieben sein. Die Benennung der Mittel wählt man am zweckmässigsten nach der Landespharmacopoe. Das Format eines Receptes ist gewöhnlich ein längliches Octav; doch darf das Blatt nur auf einer Seite beschrieben sein. Oben am Rande schreibt man das Datum, an welchem man das Recept ausstellt. Den Anfang eines jeden Receptes macht das Wort *Recipe*, welches

*) Von der ärztlichen Receptirkunst ist zu unterscheiden die *pharmaceutische Receptirkunst, ars formulas medicas conficiendi*, welches die Kunst ist, die vom Arzte verordneten Arzneiformeln richtig zuzubereiten.

man gewöhnlich in R. oder *Ry.* oder *Rec.* abkürzt. Hierauf folgt die Angabe der Mittel. Der Name eines jeden Arzneimittels soll eine besondere Zeile einnehmen; dazu fügt man auch in derselben Zeile die Quantität, und wenn es der Raum nicht erlaubt, so macht man eine besondere kürzere Zeile, welche etwas entfernter vom linken Rande des Receptes anfängt. Uebrigens setzt man den Namen des Arzneimittels im Genitiv, die Quantität aber im Accusativ. Die Bestimmung der Quantität drückt man sicherer durch Worte, als durch Zeichen und Zahlen aus, so dass man zweckmässiger *unciam unam*, als $\overline{3}j$, *drachmas tres*, als $\overline{3}jjj$ schreibt.

Nach der Angabe der Arzneimittel und des Gewichtes folgt die *Unterschrift*, *Subscriptio*, in welcher der Arzt dem Apotheker nicht allein die Form bezeichnet, welche dem Arzneimittel gegeben werden soll, sondern auch, wie es eingetheilt und genommen werden soll.

Die *Signatur*, d. h., die Anweisung für den Kranken zum Gebrauch des Arzneimittels, beginnt stets mit der Abkürzung des Wortes *Signetur* oder *Signentur*, *S.*; sie muss möglichst kurz und bestimmt sein, wird vom Arzte in der Landessprache verfasst und von dem Apotheker abgeschrieben. Aeusserliche Arzneimittel pflegt man zum Unterschiede von innerlichen mit der Signatur: *zum äusserlichen Gebrauche* zu bezeichnen.

Nach der Unterschrift folgt der Name des Kranken und dessen Stand, oder auch, wenn für mehrere Mitglieder einer Familie zugleich verordnet worden ist, der Vorname, sowie der Name des Arztes.

Es können zwar mehrere Vorschriften auf ein Receptblatt geschrieben werden, allein diese müssen alsdann durch ein Zeichen ($\#$ —) deutlich von einander getrennt werden; oder man fügt den besonderen Vorschriften einzelne Zahlen bei. — Soll eine Vorschrift schnell ausgeführt werden, so setzt man *statim* oder *cito* hinzu. — Bevor der Arzt das Recept aus den Händen giebt, soll er es noch einmal aufmerksam durchlesen, und, wenn es auf ein grosses Blatt geschrieben war, selbst von dem übrigen Papiere ab-

schneiden, damit nicht etwa von andern Personen etwas nöthiges weggeschnitten werde.

Die Vorschriften, welche der Arzt dem Apotheker im Recepte giebt, sind entweder *einfache (Formulae simplices)*, wo nur ein einziges Mittel verschrieben wird, oder *zusammengesetzte (Formulae compositae)*, wo der Arzt mehrere Mittel verordnet und daraus eine besondere Arznei bereiten lässt.

Die vom Arzte verordneten Arzneimittel sind nun 1) entweder in der verlangten Qualität schon in den Apotheken vorrätbig und heissen dann *Officinalformeln, Formulae officinales s. dispensatoriales*, d. h. Vorschriften zur Bereitung von Arzneimitteln, welche in den Apotheken vorrätbig gehalten werden sollen, oder nach der gesetzmässigen Angabe der Landespharmakopoe sogleich bereitet werden müssen; 2) oder die verordneten Mittel müssen erst vom Apotheker so zubereitet werden, wie es der Arzt im Recepte verordnet hat und heissen dann *Magistralformeln, Formulae magistrales s. extemporaneae*. Dieses sind demnach Vorschriften von Aerzten zur Verabreichung mehrerer einfacher oder zur Bereitung zusammengesetzter Arzneien, in welchen dem Apotheker genau Alles angegeben werden muss, was derselbe mit den Arzneimitteln vorzunehmen hat. Diese Magistralformeln sind der eigentliche Gegenstand der Receptirkunst.

Die einfache Arzneivorschrift, in welcher der Arzt entweder ein einfaches Mittel oder eine officinelle Formel verordnen kann, wird blos mit einem D. als Abkürzung von *detur* oder *dentur* unterschrieben, wobei zuweilen auch das Gefäss bestimmt wird, worin das Mittel gegeben werden soll, z. B. *D. ad scatulam, ad chartam ceratam, ad vitrum* u. s. w. Hierauf folgt die Signatur.

Die zusammengesetzten Arzneiformeln (*Formulae compositae*) bestehen zuweilen aus sehr verschiedenartigen Arzneistoffen, zu deren Wahl und Mischung der Arzt nicht allein durch den Zustand des Kranken, sondern auch durch die chemische Beschaffenheit der Mittel selbst veranlasst wird.

Alle Mittel aber, welche in einer zusammengesetzten

Arzneiformel vorkommen, lassen sich unter vier Abtheilungen bringen:

1) das *Hauptmittel (Basis)*, dasjenige Mittel, von dessen Wirkung der Arzt den meisten Erfolg hofft. Es soll wo möglich einfach sein, doch können zwei Arzneistoffe in einer zusammengesetzten Formel das Hauptmittel ausmachen, z. B. *Calomel* und *Sulphur antimonii auratum*. — Das Hauptmittel kann aber zuweilen nicht in einfacher Form dargereicht werden, entweder weil es sich in seiner eigenthümlichen Form nicht gut anwenden lässt, z. B. Kampher, Stinkasand u. s. w., oder weil es nicht allen Heilanzeigen entspricht, oder weil es wegen der geringen Quantität der Gabe nicht füglich ohne Binde-Mittel verabreicht werden kann u. s. w. Daher wählt der Arzt noch:

2) das *Unterstützungs-Mittel (Remedium adjuvans)*, wodurch die Wirkung des Hauptmittels sicherer erfolgt; so setzt man z. B. *Ipecacuanha* zum *Tartarus stibiatus*, um desto sicherer Erbrechen zu erregen. Oder man verbindet ein Unterstützungsmittel mit dem Hauptmittel, um die Wirkung dieses auf ein besonderes Organ zu leiten; so fügt man *Ipecacuanha* dem *Opium* bei, um auf die Haut zu wirken.

3) das *Verbesserungs-Mittel (Remedium corrigens)*, wodurch oft unangenehme Nebenwirkungen des Hauptmittels vermieden oder Geruch und Geschmack desselben verbessert werden; so setzt man zu den Säuren Schleim, um die Einwirkung dieser auf Zähne, Schlund und Magen zu vermindern u. s. w. Jedoch darf ein solches Mittel weder die Wirkung des Hauptmittels aufheben, noch eine so bedeutende Wirksamkeit besitzen, dass es leicht Schaden erregen könnte.

4) Das *Binde-Mittel* oder gestaltgebende Mittel (*Remedium constituens, Vehiculum*), welches dem Hauptmittel entweder bloss zur Einhüllung dient, oder auch die verlangte Consistenz, Form giebt. Zuweilen ist das Verbesserungsmittel schon Bindemittel, z. B. der Syrup in Lattwergen, manche Wässer bei Auflösungen. Das Bindemittel soll entweder ein indifferenter Stoff sein, oder gleiche Wirkung mit dem Haupt- und Unterstützungsmittel haben, damit es diesen nicht widerspreche oder die chemische Zusammensetzung nicht etwa verändere. Man nennt das Bin-

demittel auch das *aufnehmende* (*Excipiens*), die übrigen Bestandtheile aber die *aufzunehmenden* (*Excipienda*) Mittel.

Es ist jedoch keinesweges nothwendig, dass jede zusammengesetzte Arzneiformel alle vier verschiedene Arten von Mitteln zugleich enthalte, wohl aber muss jedes in einer zusammengesetzten Formel enthaltene Mittel sich unter eine von diesen vier Abtheilungen bringen lassen.

Allgemeine Regeln für die zusammengesetzten Arzneiformeln sind:

dass die einzelnen Ingredienzien sich gehörig mit einander mischen oder mengen lassen;

dass sie sich chemisch nicht zersetzen;

dass sie einander in ihrer Wirkung nicht stören oder gar schädliche Verbindungen hervorbringen;

dass sie wo möglich inländische Mittel sind, weil man bei diesen mehr vor Verfälschung gesichert ist, man diese stets frisch haben kann und sie auch wohlfeiler sind;

dass das ganze Mittel keine zu unangenehme Form annehme, und

dass man endlich nicht mehr Mittel zusammenmischen lasse, als wirklich nothwendig ist, und stets nach der grössten Einfachheit und bei Armen auch nach Wohlfeilheit strebe.

Die *Ordnung*, in welcher man die einzelnen Mittel einer zusammengesetzten Formel auf einander folgen lässt, ist verschieden nach der Form des Mittels. Gewöhnlich stellt man die einzelnen Ingredienzien nach der Gleichheit der Gewichte oder der Mittel zusammen, oder man stellt das Hauptmittel voran, hierauf die unterstützenden und verbessernden Mittel, und lässt endlich das Bindemittel folgen. In Formen, welche einer besonderen pharmaceutischen Zubereitung bedürfen, ordnet man die Ingredienzien am zweckmässigsten nach der pharmaceutischen Bereitung. Ingredienzien, deren Menge und Gewicht man von dem Apotheker bestimmen lässt (und diess darf *nur* bei dem Bindemittel stattfinden), setzt man zuletzt.

Die Unterschrift der zusammengesetzten Arzneiformeln ist die Abkürzung des Wortes *Misceatur* oder *misceantur* (M.) worauf entweder sogleich *detur* (D.), *signetur* (S.)

mit der Signatur folgt, oder es wird erst noch die Form bestimmt, welche das Mittel bekommen soll; dies geschieht durch das Wort *Fiat*, wozu man oft noch *lege artis* fügt. Bei Mitteln, bei welchen es auf eine genaue Mischung ihrer Ingredienzien ankommt, schreibt man *Misceantur exactissime*. Alles dieses wird gewöhnlich abgekürzt: *M. exactiss. f. l. a.* —

Die *Bestimmung* der Gabe, der Dosis, der Menge jedes einzelnen Arzneimittels geschieht nach dem in der Landespharmacopoe gebräuchlichen Medicinalgewichte; gewöhnlich ist diess das Nürnberger Medicinalgewicht. Das bürgerliche Pfund (*Libra civilis*) enthält 16 Unzen, das medicinal-Pfund (*Libra medicinalis*) nur 12 Unzen, die Unze (*Uncia*) 8 Drachmen oder Quentchen, die Drachme (*Drachma*) drei Scrupel, der Scrupel (*Scrupulus*) 20 Gran, der Gran (*Granum*) wird nur in seine Bruchtheile getheilt.

℥j	℥j	℥j	ʒj	Grj
Pfund	Unze	Drachme	Scrupel	Gran
1	12	96	288	5760
	1	8	24	480
		1	3	60
			1	20
				1

In Frankreich ist das *metrische* oder *Grammen*-Gewicht das gesetzliche Medicinalgewicht. Folgendes ist die Eintheilung desselben, welcher wir den Werth in Nürnberger Medicinalgewicht beifügen:

1 Myriagramme = 10000 Grammes = L. 27. U. 11.

Dr. 2. Scr. 2. Gr. 4,2 oder 160964,2 Gr.

1 Kilogramme = 1000 Grammes = L. 2. U. 9. Dr. 4.

Gr. 16,42 oder 16096,42 Gr.

1 Hectogramme = 100 Grammes = U. 3. Dr. 2. Scr. 2.

Gr. 9,64 oder 1609,64 Gr.

1 Décagramme = 10 Grammes = Dr. 2. Scr. 2. Gr. 0,96 oder 160,96 Gr.

1 Gramme = Gr. 16,10

1 Décigramme = $\frac{1}{10}$ Gramme = Gr. 1,61 (ohngefähr $1\frac{3}{5}$ Gr.)

1 Centigramme = $\frac{1}{100}$ Gramme = Gr. 0,161 (ohngefähr $\frac{1}{6}$ Gr.)

1 Milligramme = $\frac{1}{1000}$ Gramme = 0,016 (ohngefähr $\frac{1}{60}$ Gr.)

Von Maassen bei wässerigen Flüssigkeiten ist in Deutschland fast nur die *Messkanne*, das *Quart* in Sachsen, (*Mensura*) zu **32 Unzen** (*in Preussen 36 Unzen*) und der *Tropfen* (*Gutta*) in Recepten gebräuchlich. In Frankreich kommen folgende Maasse für wässrige Flüssigkeiten vor:

1 Litre = 1 Kilogramme.

1 Décilitre = $\frac{1}{10}$ Litre = 1 Hectogramme.

1 Centilitre = $\frac{1}{100}$ Litre = 1 Décagramme.

1 Millilitre = $\frac{1}{1000}$ Litre = 1 Gramme.

Das Gewicht eines Tropfens ist verschieden nach der Natur der Flüssigkeit; so gehen von dünneren Syrupen **45**, von verdünnten Säuren **50**, von wässerigen Auflösungen ohngefähr **50**, von destillirtem Wasser **60**, von Copaivabalsam **70**, von Weingeist **110**, von Vitriolnaphta **200** Tropfen auf eine Drachme.

Manche Mittel, welche gezählt werden können, werden bloß durch die beigesetzte Zahl angegeben, z. B. Eidotter, Blutegel u. s. w. —

Endlich pflegt man bei der Bestimmung des Gewichtes Einheit zu beobachten; man schreibt desshalb nicht 1 Pfund und 3 Unzen, sondern **15 Unzen**; nicht 1 Unze und 1 Drachme, sondern **9 Drachmen** u. s. w. — In gewissen Fällen, wenn die Quantität mehrerer Arzneimittel gleich ist, pflegt man die Quantität nur bei dem letzten Mittel anzuzeigen mit dem Beisatz: von jedem, *ana*, *āā*, *singularum*. — Zuweilen, und eigentlich nur bei dem Bindemittel, überläßt man, wie bereits erwähnt worden ist, dem Apotheker die Menge eines Arzneimittels zu bestimmen; dann schreibt man: so viel als nöthig ist, *quantum sufficit*, *quantum satis*, *q. s.* —

Soll ein Arzneimittel in mehrere Theile getheilt werden, so wird die Eintheilung vom Arzte durch das Wort: *dividatur* angegeben, dann läßt man die Zahl der Theile folgen, z. B. *in partes octo*; wenn aber das verordnete Mittel in einer mehrfachen Anzahl verfertigt werden soll, so fügt man hinzu: *dentur s. dispensentur tales doses octo, sex*, oder *detur in duplo, quadruplo* u. s. w.

Die Quantitäten der Arzneimittel, welche der Kranke bei der Anwendung jedesmal verbrauchen soll, bestimmt der Arzt, wenn er nicht schon die Gaben vom Apotheker hat

abtheilen lassen, nach Tassen, Gläsern, Löffeln, Messerspitzen, nach der Zahl und nach Tropfen. Einen Theelöffel (*Cochlear parvum*) voll Flüssigkeit rechnet man gleich zwei Scrupel bis eine Drachme, einen Esslöffel (*Cochlear magnum*) voll gleich drei bis vier Drachmen, eine Tasse, Glas, Becher (*Cyathus, Vitrum, Poculum*) voll zwei bis drei Unzen. Der Arzt lasse sich bei Bestimmung der Dosis jedesmal das Gefäss zeigen, um einen richtigen Maassstab zu haben. Bei Pulvern rechnet man einen Theelöffel voll einen bis zwei Scrupel, eine Messerspitze voll 15 — 30 Gran. Pillen, Bissen, Morsellen verordnet man nach der Zahl. Bei trocknen Kräutern und Species rechnet man eine *Prise*, *Pfötchen* oder *drei Finger voll* (*Pugillus*) zu einer halben bis ganzen Drachme; eine *Hand voll* (*Manipulus*) zu vier bis sechs Drachmen; ein *Bündel* oder *Armvoll* (*Fasciculus*) zu sechs bis acht Unzen.

Die *Form* eines Arzneimittels ist die äussere Beschaffenheit, Gestalt desselben, unter welcher der Apotheker das Mittel dem Kranken verabreicht. Diese äussere Beschaffenheit besteht nicht allein in dem Verhalten des Arzneimittels als Masse rücksichtlich der Dichtigkeit, Gestalt u. s. w., sondern auch in Bezug auf Geruch, Geschmack, Farbe u. s. w. — Die Wahl der Arzneiform ist nicht blos abhängig von den gewählten Arzneistoffen selbst, sondern zum Theil auch von der Natur der Krankheit, von individuellen Verhältnissen des Kranken, Alter, Geschlecht, Vermögen u. s. w. So wird man z. B. bei schleuniger Hülfe nicht Formen wählen, welche einer langen pharmaceutischen Zubereitung bedürfen; bei Kindern keine Pillen, bei der Wasserscheu keine flüssige Form. Endlich hängt die Bestimmung der Form eines Arzneimittels hauptsächlich von der chemischen Beschaffenheit der Mittel selbst ab; so z. B. darf man keine unauflöslichen Arzneimittel in flüssiger Form geben, höchstens in kleinen Quantitäten; aromatische Pflanzenstoffe dürfen nicht gekocht werden; flüchtige Arzneimittel, Spiritus, Ammonium u. s. w. setze man nie der Wärme aus u. s. w.

Die Formen der Arzneimittel, deren man sich in der Heilkunde bedient, sind nach ihrer Consistenz verschieden; sie sind entweder *trocken* oder *weich* oder *flüssig*.

I. Zur *trocknen* Form rechnet man:

- 1) die Species, Species.
- 2) das Pulver, Pulvis.
- 3) die Pillen, Pilulae, Catapotia.
- 4) die Bissen, Boli.
- 5) die Morsellen, Täfelchen, Morsuli, Tabellae.
- 6) die Zeltchen, Sternkugelchen, Rotulae, Orbiculi, Trochisci, Pastilli.
- 7) den Oelzucker, Elaeosaccharum.
- 8) den Teig, Pasta.
- 9) das Pflaster, Emplastrum.
- 10) die Wachskerzchen, Cereoli.
- 11) die Stuhlzäpfchen, Suppositoria.

II. zur *weichen* Form:

- 12) die Lattwerge, Electuarium, Opiatum, Conditum.
- 13) die Conserven, Conservae, Syrupe, Syrupi, Honigsäfte, Mellita.
- 14) die Gallert, Gelatina.
- 15) die Umschläge, Epithemata.
- 16) die Salbe, Unguentum.
- 17) das Oelwachs, Ceratum.

III. Zur *flüssigen* Form:a) *tropfbar-flüssige Form*

- 18) die ausgepressten Pflanzensäfte, Succi plantarum expressi.
- 19) die Auflösung, Solutio.
- 20) die Mixtur, Schütteltrank, Mixtura.
- 21) den Aufguss, Infusum.
- 22) die Abkochung, Decoctum.
- 23) die Tisane, Ptisana
- 24) die Pflanzenmilch, Emulsio.
- 25) die Molke, Serum lactis.
- 26) den Schleim, Mucilago.
- 27) den Lecksaft, Linctus, Looch, Pinselsaft, Litus oris.
- 28) die Gurgelwässer, Gargarismata.
- 29) die Waschwässer, Lavacra.
- 30) die Einspritzungen, Injectiones.
- 31) die Bähungen, Fomentationes.
- 32) die Einreibungen, Infrictiones.
- 33) die Bäder, Balnea.

b) *elastisch-flüssige Form:*

34) Gasarten.

35) Dämpfe, α) feuchte

β) trockne = Rauch, Räucherungen,
Suffitus, Fumigationes.

Manche einfache Arzneimittel werden bisweilen in *Substanz* ohne weitere pharmaceutische Zubereitung, ausser etwa der Reinigung oder einer einfachen Verkleinerung, verordnet, sowohl zum innerlichen als auch zum äusserlichen Gebrauche, z. B. Leberthran, Copaivabalsam, Campher, Kreosot, Terpenthinöl, Chlorkalk etc.

Besondere Receptirkunst.

I. Trockene Form.

Species.

Species, *Species*, nennt man eine Mengung trockner Arzneimittel in gröblich verkleinerter Gestalt, gewöhnlich vegetabilischer Natur, z. B. Wurzeln, Rinden, Hölzer, Kräuter, Blätter, Blüthen, Früchte, Samen, aber auch Harze, Gummiharze, Salze, Kleie, Campher u. s. w. Man nimmt die *Species* sowohl zum innerlichen Gebrauch, um sie mit Wasser, Wein u. s. w. aufgiessen oder kochen zu lassen, als auch zum äusserlichen Gebrauch zu Bädern, Umschlägen, Bähungen, Klystieren, Räucherungen u. s. w.

Beim Verordnen der Ingredienzien zur *Species* hat man darauf zu achten, dass zu Aufgüssen oder Abkochungen nur solche Arzneimittel verschrieben werden, welche sich durch eine und dieselbe Flüssigkeit auf gleiche Weise vollkommen ausziehen lassen; dass man Arzneikörper, welche einen sehr widerlichen Geschmack oder Geruch haben und die man nicht durch Corrigentien umändern kann, vermeide; dass alle Theile der verordneten Masse gleichmässig geschnitten oder zerstoßen werden. Die Ordnung beim Verordnen ist gewöhnlich die, dass man mit der grössten Menge anfängt und gleiche Gewichtsmenge und gleiche Pflanzentheile zusammenstellt. In der Unterschrift giebt man dem Apotheker die Weisung, die Ingredienzien zu zerkleinern, die Wurzeln, Rinden, Kräuter, Blätter u. s. w. mit dem Messer zu zerschneiden, die Samen aber im Mörser zu zerstoßen; daher schreibt man *Concisa et contusa misce f. l. a. Species. D. S. Species*, oder nach ihrer Wirkung, *Brustspecies, Species zum Gurgelwasser* u. s. w. Man giebt auch gewöhnlich an, wie viel davon auf eine bestimmte Menge Flüssigkeit genommen werden soll, oder lässt vom Apotheker die *Species* in einzelne Dosen abtheilen.

Man wendet die Species häufig zum äusserlichen Gebrauch trocken an; so hat man *Kräuterbetten* (*Lectuli medicati*), *Kräuterkissen* (*Pulvinaria medicata*), *Kräutermützen* (*Cucuphae*), *Kräutersäckchen* (*Epithemata sicca*); hierzu bedient man sich meistens derjenigen Blumen, Kräuter u. s. w., welche einen starken Geruch haben und diesen nicht so leicht verlieren; man lässt diese gröblich pulvern (*f. pulvis grossiusculus*), linnene Säckchen damit füllen und diese matrattenartig durchnähen. Zu *feuchten Umschlägen* (*Cataplasmata*) muss man in der Regel mehr von den Species verordnen, als zu den trocknen, weil jene öfters erneuert werden müssen. — Die Species zu Räucherungen (*Sp. ad suffiendum s. pro fumo*) sind gröbliche Pulver, welche entweder auf Kohlen oder auf heisse Platten gestreut werden; sie bestehen meistens aus wohlriechenden Harzen oder Pflanzentheilen, und da sie in der Regel in den Apotheken vorräthig sind, so wird der Arzt nicht so leicht nöthig haben eine Formel dazu zu verschreiben.

Beispiele.

R Florum verbasci
 „ sambuci
 Herbae tussilaginis
 Radicis liquiritiae
 „ althaeae ana drachmas duas
 „ iridis florentinae
 Seminum foeniculi ana drachmam unam.

Concisa et contusa misce. Fiant Species. D. S. Brustspecies.

R Stipitum dulcamarae
 Radicis caricis arenariae ana unciam unam
 „ graminis
 „ Saponariae ana unciam semis.

Conc. m. f. Species, dividatur in sex partes aequales. S. Einen Theil mit einer halben Kanne Wasser aufzugießen und etwas einzukochen.

R Florum chamomillae vulgaris
 „ sambuci ana drachmas duas
 „ Herbae menthae piperitae drachmam unam

Farinae secalinae drachmas duas

Camphorae scrupulum unum.

Misce, fiat pulvis D. S. Zum Kräuterkissen.

R_x Herbae serpylli

„ thymi ana unciam unam

Semen carvi

Radicis calami aromatici ana unciam dimidiam.

Concisa et contusa misce. D. S. Mit kochendem Wasser aufzugießen zu einem Bade.

R_x Radicis taraxaci

„ saponariae

„ valerianae minoris

Florum chamomillae vulgaris

Semen lini ana unciam semis

Herbae centaurei minoris

„ marrubii albi ana drachmas duas.

Conc. cont. M. D. S. Eine Handvoll mit einem Pfunde Wasser zu kochen. Zu einem Klystier.

Pulver.

Pulver, *Pulvis*, nennt man ein trocknes, aus fein zertheilten (auf mechanische Weise durch Stossen, *Pulveratio*, *Contusio*, durch Reiben, *Trituratio*, *Laevigatio*, durch Schlemmen, *Elutriatio*, durch Feilen, *Limatura*) gleichartigen Theilen bestehendes Arzneimittel. Man unterscheidet *einfache* und *zusammengesetzte* Pulver (*Pulveres simplices et P. compositi*), je nachdem nur ein einziges trocknes Arzneimittel in fein zertheilten, gleichartigen Theilen verordnet wird, oder mehrere Substanzen zusammen. Man unterscheidet ferner ausser dem gewöhnlichen Grade der Feinheit des Pulvers ein ganz feines Pulver (*Pulvis alcoholisatus*, *Alcohol, subtilissimus*) und gröbliches Pulver (*Pulvis grossus, rudior*).

Jedes Arzneimittel kann in Pulverform verordnet werden, welches entweder für sich allein oder mit andern Arzneimitteln gemischt, die Pulverform annimmt. Selbst flüssige Körper, z. B. ätherische Oele, natürlich Balsame, Kam-

pher u. s. w., Extracte, wenn sie mit festen Körpern gemengt werden, können in die Pulvermasse aufgenommen werden.

Man *vermeidet* aber in Pulverform zu reichen folgende Arzneimittel:

1) sehr heftig wirkende Mittel, namentlich metallische Gifte, z. B. Sublimat, Arsenik, weil dadurch leicht örtliche Reizungen des Mundes, Schlundes und Magens hervorgebracht werden können;

2) schwach wirkende und stark aufquellende Mittel, z. B. Althäawurzel, Quassiaholz und andere specifisch leichte und lockere Pflanzenpulver, weil sie der grossen Masse wegen schwer und unangenehm einzunehmen sind;

3) klebende und zähe Mittel, z. B. Balsame, Harze, welche in der Wärme zusammenbacken, weil sie sich nicht leicht pulvern lassen und im Munde klümprig werden;

4) öligschleimige Samen, z. B. Mohn-, Lein-Samen, welche, wenn man sie pulvern will, eine teigige Masse bilden, weil man einen Zusatz von vielem Pulver zufügen muss;

5) flüchtige Mittel, z. B. Kalmus-Wurzel, Chamillen-Blumen u. s. w., weil sie durch das Austrocknen und Pulvern viel von ihren wirksamen Bestandtheilen verlieren;

6) alle an der Luft zerfliessende Stoffe, z. B. *Ammonium muriaticum ferratum*, *Kali aceticum* u. s. w., weil sie dann eine klümprige Masse bilden;

7) alle Mittel, welche einen sehr widerlichen Geschmack und Geruch haben, z. B. *Asa foetida*, *Aloe* u. s. w., weil sie dieser unangenehmen Eigenschaften wegen leicht Uebelkeiten und Erbrechen erregen.

Bei zusammengesetzten Pulvern darf man die Ingredienzien nicht zu sehr häufen, sondern möglichst einfach verschreiben, und zwar in der Ordnung, dass man die kleinsten Quantitäten (gewöhnlich das Hauptmittel) voranstellt, und die grössten zuletzt. Bindemittel sind hierbei gewöhnlich Zucker, Süssholzpulver, Fenchelsamen, Oelzucker u. s. w.

In der Gabe steigt man selten über eine Drachme, gewöhnlich verordnet man nur 10 bis 15 Gran auf eine Gabe; Kindern weniger. Wenn in einem Pulver stark wirkende Mittel enthalten sind, so lässt man das Pulver vom Apotheker

in die einzelnen Gaben theilen, und überlässt nicht dem Kranken die Theilung.

Ist das verschriebene Pulver ein einfaches, so setzt man als Unterschrift: *Detur*, und bezeichnet das Gefäß, worin es gegeben werden soll, *ad scatulam*, *ad chartam ceratam*, enthält es flüchtige Bestandtheile oder solche, welche Feuchtigkeit aus der Luft anziehen, *ad vitrum*. Ist das Pulver zusammengesetzt, so schreibt man: *Misce, fiat pulvis*. — Wenn mehr als eine Gabe verordnet wird, so kann man, wie bereits erwähnt, auf eine zweifache Weise verfahren: 1) man verordnet im Recepte eine Quantität, die zu einer Gabe bestimmt ist, und lässt diese Gabe mehrfach bereiten, z. B. *M. f. pulvis, dentur tales doses octo*; oder 2) man schreibt die bestimmte Quantität dem Apotheker vor und lässt sie von diesem in gleiche (6, 8, 10 u. s. w.) Theile theilen, z. B. *M. f. pulv. dividatur in partes octo*. — In der Signatur muss die Zeit, zu welcher die Gaben genommen werden sollen, und, wenn das Pulver nicht abgetheilt verordnet wurde, auch die Quantität angegeben werden, welche von dem Kranken jedesmal genommen werden soll, z. B. ein Theelöffel oder eine Messerspitze voll. Endlich soll auch das Vehikel bestimmt werden, in welchem das Pulver genommen wird.

Beispiele.

R_y. Tartari stibiati granum unum
Pulveris radice Ipecacuanhae scrupulum unum.

M. f. pulvis. D. S. Brechpulver, auf einmal mit Chamillenthee zu nehmen.

R_y. Tartari stibiatis grana duo
Pulveris radice Ipecacuanhae scrupulos duos
Amyli drachmam dimidiam.

M. f. pulvis, dividatur in partes quatuor aequales. D. S. Aller zehn Minuten ein Pulver zu nehmen bis Erbrechen erfolgt.

R_y. Bismuthi nitrici praecipitati
Extracti nucis vomicae spiritusosi exsiccati ana
granum dimidium

Magnesiae albae grana tria
 Sacchari albi grana quindecim
 Olei menthae piperitae guttas tres.

M. f. pulvis, dentur tales doses Numero sex ad chartam ceratam.
 S. Aller 3 Stunden ein Pulver in Melissenthee zu nehmen.

Ry. Sulphuris sublimati loti drachmas duas
 Tartari depurati drachmas sex
 Sacchari albi unciam unam.

M. f. pulvis. D. ad scatulam S. Täglich 2–3 Mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Die Pulverform wird aber nicht allein innerlich, sondern auch äusserlich angewendet. Man hat zum äusserlichen Gebrauche Augenpulver, Riechpulver, Niesepulver, Zahnpulver, Streupulver und Waschpulver.

Das *Augenpulver* (*Pulvis ophthalmicus*) ist das feinste Pulver, welches unmittelbar auf die verdunkelte Bindehaut der Hornhaut angewendet wird. Man bläst nämlich solche Pulver entweder durch einen Federkiel oder man streicht sie vermittelst eines feinen, in Oel getauchten Pinsels auf das Auge. Daher verordnet man stets: *f. pulvis subtilissimus*.

Beispiele.

Ry. Boli armenae
 Tartari depurati
 Sacchari albi ana scrupulos duos.

M. f. pulvis subtilissimus. S. In das Auge zu blasen.

Das *Riechpulver* (*Odoramentum siccum*) ist eine Mischung gewöhnlich aus Ammonium-Präparaten, ätherischen Oelen, Kalk u. s. w.; es darf niemals in grossen Quantitäten verordnet werden, weil es seinen Geruch leicht verliert und muss in geschliffenen Gläsern mit eingeriebenen Stöpseln aufbewahrt werden.

Beispiele.

Ry. Ammonii muriatici drachmam unam
 Calcariae ustae drachmas duas.

M. f. pulv. D. ad Vitrum epistomio vitreo clausum S. Riechpulver.

Ry. Kali sulphurici aciduli unciam dimidiam
Kali acetici drachmas duas.

M. S. pulv. D. ad. vitrum bene clausum. S. Riechpulver. Beim Gebrauch mit etwas Essig oder Wasser zu befeuchten.

Das *Niese- oder Schnupf-Pulver* (*Pulvis errhinus, sternutatorius*), welches man meistentheils anwendet, um öfteres Niesen zu erregen, darf nicht zu fein sein, damit es nicht bis in die Stirnhöhlen hinaufdringen kann; es besteht gewöhnlich aus aromatischen Vegetabilien und ätherischen Oelen, zuweilen aber auch aus scharfen Stoffen, wozu man sich vorzüglich der weissen Niesswurz bedient. Adstringirende Schnupfpulver werden auch wohl bei Erschlaffung der Nasenschleimhaut und bei Blutungen aus der Nase angewendet.

Beispiele.

Ry. Pulveris florum rosae rubrae
„ „ chamomillae
„ „ convallariae majalis
„ herbae majoranae
„ radicis iridis florentinae ana drachmam unam.

M. f. pulvis. D. S. Niesepulver.

Ry. Hydrargyri muriatici mitis drachmam unam
Sacchari albi drachmas tres
Pulveris radicis valerianae minoris
„ florum liliorum convallium ana drachmam unam.

M. exactissime, f. pulvis. D. S. Schnupfpulver.

Ry. Aluminis crudi scrupulum unum
Extracti ratanhia
Corticis quercus ana drachmam unam.

M. f. pulvis D. S. Schnupfpulver.

Das *Zahnpulver* (*Pulvis dentifricius*), dessen man sich bedient, theils um die Zähne von Schmutz, Schleim, Weinstein zu befreien, theils aber auch um auf das Zahnfleisch einzuwirken, braucht nicht ganz fein zu sein. Man wendet es mittelst einer Bürste oder auch mittelst der Finger an.

B e i s p i e l e.

Ry. Corticis chinae fusci drachmas sex
 Ligni santali rubri drachmas duas
 Olei caryophyllorum
 „ bergamottae ana guttas tres.

M. f. pulvis subtilissimus. D. in scatula. S. Zahnpulver.

Ry. Coccionellae grana duo
 Aluminis usti scrupulum unum
 Concharum praeparatarum unciam unam
 Olei cassiae cinnamomeae guttas duas
 Balsami peruviani guttas octo.

M. f. pulvis. D. S. Zahnpulver.

Das *Streupulver* (*Pulvis adpersorius*, *Adspargo*, *Pasma*, *Empasma*), welches sowohl auf die unverletzte Haut, als auch auf die zufällig oder absichtlich verletzte, auf Geschwüre und selbst auf Wunden angewendet wird, muss sehr fein gepülvert sein.

B e i s p i e l e.

Ry. Pollinis Lycopodii
 Corticis peruviani fusci alcoholisati ana unciam dimidiam.

M. f. pulvis subtilissimus. D. ad vitrum panno bombycino tenuiore tectum. S. Streupulver.

Ry. Aluminis crudi scrupulum unum
 Gummi arabici unciam dimidiam.

M. f. pulvis subtilissimus. S. Streupulver.

Ry. Strychnii granum dimidium
 Sacchari albi grana tria.

M. f. pulvis subtilissimus. D. S. Auf die durch ein Blasenpflaster wund gemachte Hautstelle zu streuen.

Das *Waschpulver* (*Pulvis collutorius*, *cosmeticus*), welches gemeiniglich aus Benzoe, Wallrath, Kampher, ätherischen Oelen u. s. w. mit Mandel- oder Weizenkleie oder Seife besteht, wird sowohl zur Verschönerung der Haut als auch gegen Hautkrankheiten angewendet.

Beispiele.

Ry. Farinae amygdalarum uncias tres
 Saponis veneti unciam unam
 Radicis enulae
 „ iridis florentinae ana unciam dimidiam
 Olei rosarum guttas quinque
 M. f. pulvis D. S. Waschpulver.

Ry. Furfurum amygdalarum uncias duas
 Saponis veneti unciam unam
 Natri carbonici depurati sicci
 Radicis iridis florentinae ana drachmas duas
 Olei bergamottae
 „ citri ana gutta quatuor.
 M. f. pulvis. D. S. Waschpulver.

Pillen.

Pillen (*Pilulae* — von *pila* der Ball — *pilula* ein Bällchen —, *Catapotia*, *Sphaerulae Galeni*) sind kleine, weiche, aus einer halbfesten, zähen Masse (*Massa pilularum*) geformte Kugeln, welche gewöhnlich 1 bis 3 Gran schwer sind.

Die Pillenform gewährt viele Vortheile; denn man kann Arzneimittel, welche sehr übel riechen und schmecken, auf diese Weise dem Kranken leicht verordnen; man kann die Gabe des Mittels sehr genau bestimmen; man kann corrosive, sehr scharfe Mittel, welche Mund und Speiseröhre und auch den Magen reizen würden, in dieser Form durch Einhüllung ohne Nachtheil anwenden; endlich kann man Arzneimittel auf diese Art lange aufbewahren, ohne dass sie verderben.

Dagegen darf man die Pillenform nicht anwenden, wenn man eine schnelle Wirkung eines Arzneimittels erwartet; wenn ein Mittel in der Speiseröhre schon seine Wirkung äussern soll; bei grosser Reizbarkeit der Speiseröhre und des Magens und bei Neigung zum Erbrechen, bei Hindernissen in den Schlingorganen, bei Kindern und bei Personen, die so unverständlich sind, dass sie die Pillen nicht hinunterschlucken können, sondern sie jedesmal zerkauen.

Zur Pillenform eignen sich besonders Harze, Schleimharze, Extracte, Seifen, feine Pulver, welche in nicht grosser Gabe gegeben werden müssen, mineralische Mittel u. s. w.; überhaupt alle Arzneisubstanzen, welche entweder für sich, wie Extracte, Seifen u. s. w. oder in Verbindung mit anderen Mitteln eine halbfeste Masse bilden, wie Pulver mit Honig oder Syrup u. s. w.

Nicht geeignet zu dieser Form sind: zerfliessende Salze oder Alkalien, Schwefelleber, Arsenik, Substanzen, welche Feuchtigkeit aus der Luft anziehen; solche, welche nur in grösserer Masse eine Wirkung hervorbringen und daher zu grosse Gaben der Pillen bedingen würden, namentlich leichte Pflanzenpulver; ferner schwer auflösliche Substanzen u. s. w.

Um eine Pillenmasse zu bereiten, hat man gewöhnlich zweierlei Bestandtheile nöthig: 1) die *aufzunehmenden* (*Excipienda*) und 2) die *aufnehmenden*, gestaltgebenden (*Excipientia*) Substanzen. Es giebt jedoch Arzneimittel, welche schon für sich allein oder durch blosse Anfeuchtung eine Pillenmasse darstellen.

Die *aufzunehmenden* Substanzen (*Excipienda*) sind in der Regel feine und trockene Pulver, Metalloxyde und Metallsalze u. s. w., überhaupt Arzneikörper, welche sich in Pulver verwandeln lassen; jedoch können sie auch flüssig sein.

Die *aufnehmenden*, gestaltgebenden Substanzen (*Excipientia*) sind gewöhnlich Extracte, Honig, Conserven, Seife, Balsame u. s. w.

Die Beschaffenheit des aufnehmenden oder gestaltgebenden Mittels muss sich nach der Natur des Hauptmittels oder des aufzunehmenden Mittels richten; wenn dieses ein trockenes, durch Anfeuchten mit Wasser u. s. w. nicht zusammenklebendes Pulver ist, so wählt man Honig, Syrup, Pflanzenschleim, Wachholdersaft oder ein ähnliches indifferentes Bindemittel, oder dicke Extracte; ist das aufzunehmende Mittel flüssig, so nimmt man ein Pulver, Süssholz-, Althaeawurzel u. s. w.; ist es ein Harz, Schleimharz, so setzt man einige Tropfen Weingeist hinzu, und wenn dann noch keine gute Pillenmasse entsteht, so nimmt man Seife in Pulverform, welche das beste Bindemittel für diese Substanzen

ist. Besteht das aufzunehmende Mittel aus schleimhaltigen, leicht zusammenhaltenden Pulvern, aus trockenen Extracten, Seife u. s. w., so bedarf es zuweilen nur der Anfeuchtung mit Wasser oder eines Syrupes, um eine gute Pillenmasse zu bilden.

Das Verhältniss der einzelnen Bestandtheile der Pillenmasse zu einander lässt sich im Allgemeinen nicht genau angeben, daher muss man dem Apotheker zuweilen die Menge des nöthigen gestaltgebenden Mittels überlassen, welches man jedesmal zuletzt im Recepte schreibt und mit *quantum sufficit* oder *quantum satis*, *q. s.* bezeichnet.

Beim Verschreiben der Pillen beginnt man mit der kleinsten Quantität, welches gewöhnlich die wirksamsten Mittel und die aufzunehmenden Substanzen sind. Die Quantität der Pillenmasse richtet sich nach der Zahl der Pillen, welche der Kranke jedesmal nehmen soll, nach der Schwere derselben, nach der Anzahl der täglichen Gaben und der Tage, während welchen die Pillen angewendet werden sollen. Wenn z. B. ein Kranker täglich dreimal fünf Pillen zu zwei Gran Schwere acht Tage lang einnehmen soll, so multiplicirt man die Zahl der Pillen mit der Zahl der Schwere und mit der Zahl der täglichen Gaben und der Tage auf folgende Weise:

$$5 \times 2 = 10 \times 3 = 30 \times 8 = 240 \text{ Gran} = \text{℥} \text{ss};$$

demnach ist so viel Pillenmasse erforderlich. — Wenn man dem Apotheker die Quantität des gestaltgebenden Mittels überlässt, so muss man stets die Zahl der Pillen angeben, welche aus der Masse verfertigt werden soll. — Verschreibt man mehrere wirksame Mittel in einer Pillenmasse, so bestimmt man, wie viele Grane von jedem Mittel der Kranke jedesmal einnehmen soll, rechnet die Zahl dieser Grane zusammen und multiplicirt diese Summe mit der Zahl der Gaben und der Tage, so lange das Mittel angewendet werden soll; das Verfahren ist dem so eben beschriebenen ganz gleich.

Die Unterschrift eines Pillenreceptes giebt die Bereitungsart, die Eintheilung, das Bestreuen oder Ueberziehen und das Behältniss, in welchem die Pillen abgegeben werden sollen, an. Man schreibt dem Apotheker vor, wie schwer die

Pillen werden sollen, auf folgende Weise: *Misce, fiant pilulae ponderis grani unius, granorum duorum, trium u. s. w.* oder *Misce, fiat massa, ex qua formentur pilulae u. s. w.* — Um das Zusammenkleben der Pillen zu verhüten, zuweilen auch um denselben ein angenehmes Aeussere an Farbe, Geruch u. s. w. zu geben, muss man dieselben mit einem trocknen Pulver bestreuen lassen; dazu nimmt man gewöhnlich Bärlappsamen-, Süssholz-, Zimmtrinden-, Veilchenwurzel-Pulver, und bezeichnet es durch die Worte: *Conspergantur pulvere radice liquoritiae u. s. w.* Ehemals liess man auch die Pillen mit Zinnober oder mit Indigo und Austerschalen-Pulver bestreuen. Zuweilen lässt man dieselben noch mit Gold- oder Silber-Blättchen überziehen, wodurch nicht allein der schlechte Geschmack mancher Pillen verborgen wird, sondern auch die Pillen vor der Einwirkung der Luft geschützt werden; nur dürfen solche Pillen keine Schwefelmitel, namentlich keine Schwefelleber enthalten; man schreibt dann: *Obducantur foliis auri, argenti.* — Endlich giebt man das Behältniss an, in welchem die Pillen abgegeben und aufbewahrt werden sollen; gewöhnlich ist es eine Schachtel. Müssen die Pillen jedoch vor Zutritt der Luft und Feuchtigkeit gesichert werden, so lässt man ein Glas nehmen; die Bezeichnung ist dann: *Detur in scatula* oder *in vitro.*

In der Signatur wird die Zahl der Pillen, welche der Kranke jedesmal einnehmen soll, und die Zeit, zu welcher sie genommen werden sollen, bestimmt; man schreibt demnach: *Signetur* Früh und Abends 3 oder 6 Pillen zu nehmen.

Gewöhnlich werden die Pillen mit Wasser verschluckt; es können jedoch auch andere Vehikel, z. B. Oblate, gekochte Früchte u. s. w. gewählt werden, sobald dadurch keine Zersetzung geschehen kann.

B e i s p i e l e.

Ry. Plumbi acetici grana quindecim
 Opii puri grana quinque
 Pulveris radice enulae drachmas quinque
 Mellis despumati drachmas tres.

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum. Conspergantur pulvere radice althaeae. D. S. Täglich dreimal fünf Stück zu nehmen.

Ry. Olei Crotonis guttas sex
 Pulveris radiceis Jalappae
 Saponis medicati ana scrupulos quatuor.

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum. Conspergantur pulvere seminis anisi. D. S. Aller vier Stunden fünf Stück zu nehmen.

Ry. Argenti nitrici crystallisati scrupulum dimidium
 Pulveris radiceis iridis florentinae drachmam unam.

M. fiant cum pauxillo mucilaginis gumm. mimosae pilulae No. quadraginta. Conspergantur pulvere radiceis iridis florentinae. D. ad vitrum, S. Täglich zweimal ein Stück zu nehmen.

Ry. Asae foetidae
 Saponis medicati ana drachmas duas.

M. fiat massa, ex qua formentur pilulae ponderis granorum duorum. Conspergantur pulvere corticeis cinnamomi. D. S. Täglich dreimal vier Stück zu nehmen.

Ry. Extracti Cicutae drachmam unam
 Pulveris cicutae q. s. ut fiant pilulae triginta.

Obducantur foliis argenti. D. S. Früh und Abends zwei Stück zu nehmen.

Die *Zahnpillen* (*Pilulae antodontalgicae*) bestehen in der Regel aus narkotischen, reizenden und scharfen Mitteln, gemeiniglich aus Extracten, welche sich in dem hohlen und schmerzhaften Zahne beim Zutritt des Speichels leicht auflösen. Man macht sie ungefähr 1 Gran schwer oder auch noch kleiner.

B e i s p i e l.

Ry. Opii puri grana quinque
 Olei Caryophyllorum grana tria
 Extracti hyoscyami grana quinque
 „ belladonnae grana decem
 Pulveris radiceis pyrethri q. s.

ut fiant pilulae triginta. Conspergantur pulvere Caryophyllorum. D. in vitro. S. Eine Pille in den hohlen Zahn zu drücken.

B i s s e n.

Der Bissen (*Bolus*) ist eine halbfeste Arzneisubstanz von runder oder länglichrunder Gestalt, welche grösser, aber

nicht so fest als eine Pille ist, doch etwas fester als Lattwerge, ungefähr von einer halben Drachme bis zu einer ganzen Drachme Schwere. Man kann in dieser Form alle Arzneistoffe geben, welche sich überhaupt in diese Form bringen lassen, mit Ausnahme der zerfliessenden Substanzen, besonders scharfe, übelschmeckende und ekelerregende Mittel. Bei den Bissen findet ein ähnliches Verhältniss zwischen den aufzunehmenden und aufnehmenden Stoffen statt, wie bei den Pillen. Wenn nämlich jene (*Excipienda*) trocken und Pulver sind, so wählt man zu diesen (*Excipientia*) flüssige Substanzen, namentlich Honig, Syrup, Conserven, Extracte u. s. w. Im Allgemeinen giebt man nicht gern Substanzen in Bissen, welche in grossen Gaben angewendet werden müssen. Auch bei der Zubereitung der Bissen überlässt man dem Apotheker oft die Quantität des gestaltgebenden Mittels, und schreibt dann: *q. s. ut fiat massa, ex qua formetur bolus*. Man lässt die Bissen ebenfalls mit trocknen Pulvern bestreuen, wie die Pillen, und in Schachteln oder Büchsen abgeben. Auf der Signatur bemerkt man das Vehikel, worin die Bissen genommen werden sollen.

Für Kinder möchte diese Form nicht zweckmässig sein, am besten passt sie bei hydrophobischen Kranken und bei solchen, wo ein leichtes Hinderniss beim Hinunterschlucken durch eine etwas feste Masse leichter überwunden wird, als durch eine Flüssigkeit.

Beispiele.

Ry. Pulveris radiceis rhei drachmam dimidiam
Mellis despumati q. s.

ut fiat bolus. Conspergatur pulvere seminum anisi. D. in scatula.
S. Des Morgens zu nehmen.

Ry. Pulveris herbae gratiolae
Extracti chelidonii majoris ana scrupulos duos.

M. f. boli ponderis granorum duodecim. Conspergantur pulvere corticeis cinnamomi. D. ad scatulam. S. Täglich zweimal ein Stück zu nehmen.

Ry. Pulveris cantharidum granum dimidium
„ radiceis belladonnae

Camphorae
 Hydrargyri muriatici mitis ana grana quatuor
 Pulveris radice liquoritiae scrupulum unum
 Mellis despumati q. s.

ut fiat Bolus. Dispensentur toles doses No. sex. Conspergantur pulvere radice liquoritiae. D. ad scatulam. S. Alle Stunden ein Stück zu nehmen.

Morsellen.

Die Morsellen, Imbisschen, Täfelchen (*Morsuli*, *Tabellae*, *Tabulata*, bei den Alten *Electuaria solida*) sind trockene, in länglich-viereckige, flache Täfelchen geformte Arzneimittel, deren gestaltgebende Substanz der Zucker ist, welcher in Wasser aufgelöst, gekocht und zur gehörigen Consistenz abgedampft werden muss. Man setzt alsdann dem Zucker die nöthigen Ingredienzien, welche meistens aus Gewürzen, Samen, Mandeln, eingemachten Pomeranzenschalen u. s. w. bestehen, und gröblich gepulvert sein müssen, zu. Von mineralischen Substanzen nimmt man nur solche, die nicht sehr specifisch schwer sind, so dass sie sich leicht beim Erkalten niederschlagen können. Zu vermeiden sind zähe Massen, zerfliessliche Substanzen, als Salze, Flüssigkeiten und alle sehr differente Mittel. Das Verhältniss des Zuckers zu den Ingredienzien ist wie 4 bis 6 zu 1, je nachdem das specifische Gewicht derselben verschieden ist. Gewöhnlich giebt man den Morsellen durch verschiedene Blumen eine schöne Farbe und durch Zusatz von ätherischen Oelen einen angenehmen Geruch. — In der Unterschrift schreibt man: *Fiant l. a. morsuli*. In der Signatur giebt man die Zahl der Morsellen an, welche jedesmal genommen werden sollen. In der Regel sind die Formeln zu Morsellen Officinal-, selten Magistral-Formeln.

Beispiele.

Rx. Pulveris seminis foeniculi drachmam dimidiam
 „ „ tanacetum drachmam unam
 „ „ santonicum drachmas quinque
 Sacchari albi ad consistentiam tabulandi cocti
 Uncias duas cum dimidia.

Fiant morsuli No. sedecim. Cuivis morsulo insperge guttam unam olei citri. D. ad scatulam. S. Täglich drei Stück zu nehmen.

Ry. Pulveris ciocolatae

„ sacchari albi ana unciam unam et dimidiam

„ carbonis vegetabilis unciam unam

„ siliquae vanigliae drachmam unam

Mucilaginis gummi tragacanthae q. s.

ut fiant tabellae ponderis scrupuli unius. D. ad scatulam. S. Täglich einigemal ein Stück zu nehmen.

Sternkügelchen.

Die *Sternkügelchen*, *Zeltchen*, *Plätzchen*, *Schluck-* oder *Leck-Kügelchen* (*Trochisci*, *Tesselli*, *Pastilli*, *Rotulae*, *Orbiculi*) sind kleine, runde, plattgedrückte Kügelchen, welche, wenn sie in Stengel- oder Stäbchen-Form sind, *Bacilli* genannt werden. Sie unterscheiden sich in ihren Bestandtheilen wenig von den Morsellen, und haben die Consistenz einer etwas festen Pillenmasse; auch pflegt man ihnen zuweilen mittelst eines Stempels einen Stern aufzudrücken. Die Ingredienzien dazu müssen wohlschmeckend sein, weil man sie grösstentheils für Kinder verordnet. Die aufzunehmenden Substanzen sind gewöhnlich trocken: Pulver, Samen, metallische Mittel u. s. w. Die gestaltgebenden Mittel sind dann meistentheils flüssig, wie Syrup, Honig, Pflanzenschleim u. s. w. Die Sternkügelchen sind meist 5 bis 10 Gran schwer; man lässt sie mit trockenem Pulver bestreuen, um das Zusammenkleben zu verhindern. Man verordnet sie Stückweise zu nehmen; in der Unterschrift giebt man dem Apotheker: *M. fiat l. a. massa, ex qua formantur trochisci numero* — *Conspergantur* u. s. w. Meistens sind es Officinalformeln.

Beispiele.

Ry Radicis ipecacuanhae grana octo

Sacchari albi drachmas decem

Mucilaginis gummi tragacanthae q. s.

ut fiant l. a. trochisci No. sexaginta. Conspergantur pulvere seminis anisi. D. S. Brustkügelchen.

Ry. Calomelanos scrupulum unum
 Pulveris seminum santonici drachmam unam
 Elaeosacchari tanaceti drachmam unam cum dimidia
 Mucilaginis gummi tragacanthae q. s.

ut fiant l. a. trochisci No. quindecim. D. ad scatulam. S. Morgens ein Stück zu nehmen.

Oelzucker.

Der *Oelzucker* (*Elaeosaccharum*) ist eine Verbindung von Zucker mit ätherischem Oel in Pulverform. Man nimmt gewöhnlich auf einen Scrupel Zucker einen bis zwei Tropfen ätherischen Oeles. Den Oelzucker darf man nur in kleinen Quantitäten verschreiben, und zwar in Wachspapier oder in Gläsern,

Beispiel.

Ry. Sacchari albi drachmam unam
 Olei chamomillae aetherei guttas tres.

M. f. pulvis, dividatur in sex partes. D. ad chartam ceratam. S. Alle 4 Stunden ein Stück zu nehmen.

Teig.

Der *Teig* (*Pasta*) besteht aus einer zähen, der Pillenmasse ähnlichen Consistenz, und wird von schleimigen Stoffen und Zucker bereitet. Diese Arzneiform wird bei uns in Magistralformeln nicht mehr verordnet; sie hat sich nur noch in einigen Officinalformeln erhalten als *Pasta althaeae*, *P. lichenis islandici*, *P. liquiritiae* u. s. w.

Pflaster.

Das *Pflaster* (*Emplastrum*) ist ein zum äusserlichen Gebrauch bestimmtes Arzneimittel, welches in gewöhnlicher Temperatur trocken und hart, bei einer mässigen Wärme weich und zähe ist, so dass es sich mit Leichtigkeit auf Leder, Leinwand, Seidenzeug u. s. w. mittelst eines Spatels streichen lässt. Man wendet die Pflaster an: 1) zu rein mechanischen Zwecken, z. B. zur Vereinigung von Wunden u. s. w.; 2) um eine imperspirable Decke über einem Theile zu bilden, oder diesen vor der Einwirkung atmosphärischer Einflüsse zu schützen; 3) um einen Reiz auf der Haut her-

vorzurufen; 4) um bestimmte Heilkräfte auf einen Theil einwirken zu lassen.

Die Bestandtheile eines Pflasters sind ebenfalls aufzunehmende und aufnehmende Substanzen; diese bestehen gewöhnlich in milden Oelen, thierischem Fette, Wachs, Honig, Terpenthin, Harzen, Schleimharzen, Pech, Seifen u. s. w.; jene können sowohl trockene Mittel sein, als Pulver, Metalloxyde u. s. w., oder flüssige, als ätherische Oele, Balsame u. s. w.

Bei der Bereitung eines Pflasters hat man vorzüglich darauf zu sehen, dass die Ingredienzien desselben gleichförmig gemengt sind, und dass die ganze Masse die gehörige Consistenz eines Pflasters erhält.

Beim Verschreiben eines Pflasters setzt man das Hauptmittel voran und das gestaltgebende Mittel nach, weil auch hierbei dem Apotheker oft die Bestimmung der Quantität überlassen bleibt. Das Verhältniss der Ingredienzien richtet sich aber nach der Consistenz der Masse, welche man beabsichtigt. Man nimmt 1 Theil Oel und 1 Theil Wachs zu $\frac{1}{2}$ Theil Pulver zu einer weichen Consistenz, — 1 Theil Oel, $1\frac{1}{2}$ Theil Wachs zu $\frac{3}{4}$ Theil Pulver zu einer etwas festeren Consistenz —, 1 Theil Oel, 2 Theile Wachs und 1 Theil Pulver zu einer harten oder festen Masse. Man kann auch 1 Theil Oel, 4 Theile Wachs, 2 Theile Harz oder Terpenthin zu 2 — 3 Theilen Pulver nehmen. Den Grad der Wärme zur Bereitung des Pflasters überlässt man dem Apotheker und schreibt: *M. f. l. a. emplastrum*. Werden flüchtige Substanzen zugesetzt, so lässt man diese zuletzt, nachdem die übrige Masse vom Feuer genommen und halb erkaltet ist, zumischen, und schreibt: *Ab igne remotis et aliquantulum refrigeratis admisce etc.* Will man zu einer Pflastermasse Pulver oder ein anderes Pflaster hinzufügen, so lässt man entweder die eine Masse bei mässiger Hitze schmelzen und dann die andere hinzusetzen — *leni igne liquefactis admisceantur* — oder, wenn dieses schon durch blosses zusammenkneten geschehen kann, so verordnet man: *Malaxando misce*. Ueberlässt man dem Kranken selbst das Pflaster zu streichen, so signirt man es: *zum äusserlichen Gebrauch*. Soll aber der Apotheker das Pflaster streichen, so giebt man in der Unterschrift die

Grösse, Form und den Stoff an, auf welchen es gestrichen werden soll: *Extende supra corium (linteum, alutam) magnitudine palmae manus u. s. w.* Bei manchen schlecht klebenden Pflastern lässt man den Rand mit Heftpflaster bestreichen und bezeichnet es dem Apotheker durch: *Margo obducatur emplastro adhaesivo.*

Eine besondere Art von Pflaster ist diejenige, wo die Leinwand in geschmolzene Pflastermasse eingetaucht wird, so dass beide Seiten der Leinwand getränkt sind; man nennt sie *Sparadrapa*. In der Regel sind viele Pflastermassen in den Apotheken vorrätig, so dass man leicht aus mehreren officinellen Pflastern eine Zusammensetzung bereiten oder einer officinellen Pflastermasse andere Substanzen beimischen lassen kann.

Beispiele.

Ry. Cerae flavae unciam unam
 Olei olivarum drachmas duas
 Terebinthinae coctae drachmam unam cum dimidia
 Solutis et colatis admisce
 Pulveris tacamahacae
 „ mastiches ana drachmam unam
 Nucis moschatae scrupulum unum
 Balsami peruviani scrupulum dimidium
 Olei destillatae menthae
 „ „ cumini
 „ „ caryophyllorum ana grana sex.
 M. f. Emplastrum. D. S. Magenpflaster.

Ry. Tartari stibiati drachmam unam
 Emplastri adhaesivi drachmas sex.
 Malaxentur. D. S. Auf Leder zu streichen.

Ry. Emplastri meliloti drachmas duas
 Pulveris cantharidum scrupulum unum

M. f. l. a. emplastrum, extende supra corium ad magnitudinem palmae manus, adde marginem ex emplastro adhaesivo. D. ad chartam ceratam. S. Nach Vorschrift.

Wachskerzen.

Die *Wachskerzen*, *Kerzen*, (*Cereoli*, *Candelae*, franz. *Bougies*) sind dünne, aus Leinwandstreifen oder baumwollenen Fäden bereitete und in eine flüssig gemachte Pflastermasse getauchte Cylinder, gewöhnlich 9 bis 12 Zoll lang und von verschiedener Stärke. Man kann sie in Bezug auf den damit beabsichtigten Zweck eintheilen in Untersuchungskerzen (*Cereoli exploratorü*), in Erweiterungskerzen (*C. dilatatorü*), in Arzneikerzen (*C. medicati*, *C. compositi*) und Aetzkerzen (*C. armati*, *caustici*). Die Kerzen müssen sehr glatt und von bestimmter Stärke, je nach dem Zwecke und dem Orte, wo man sie einführen will, die Spitze abgestumpft und so fest sein, dass sie nicht abbricht; namentlich gilt diess von den Kerzen, welche man bei Krankheiten der Harnröhre anwendet. Die beiden ersten Arten von Kerzen bestehen meistens blos aus Leinwandstreifen in Wachsmasse eingetaucht; zu den letzten setzt man verschiedene Arzneistoffe, je nachdem es der Heilzweck erfordert.

Beispiel.

Rx. Cerae flavae uncias sex.

Leni igne liquatis admisce circumagitando
Aceti plumbi drachmas duas.

Ab igne remotis immerge telas tenues, e quibus l. a. fiant cereoli. D. ad chartam ceratam. S. Bleiwachskerzen.

Stuhlzäpfchen.

Das *Stuhlzäpfchen* (*Suppositorium*) ist eine dem Pflaster ähnliche Masse, welche in Form eines Cylinders bestimmt ist, in den Mastdarm, namentlich bei Kindern, eingebracht zu werden. Man lässt sie gewöhnlich 1 — 2 Zoll lang und $\frac{1}{2}$ Zoll stark und aus Seifen, Schleimharzen, Butter, Honig und Mehl u. s. w. bereiten. Jetzt sind sie fast ganz ausser Gebrauch gekommen, und zwar mit Recht, weil sie leicht eine örtliche Ueberreizung hervorbringen. Mit Nutzen können sie nur noch bei einigen Krankheiten des Mastdarmes, z. B. bei krampfhafter Stricture, zuweilen auch bei Askariden, angewendet werden.

B e i s p i e l.

Rx. Amyli triticei drachmas sex
 Extracti belladonnae grana quindecim
 Syrupi opii q. s. ut f. massa, ex qua
 formentur suppositoria tria.

D. ad chartam ceratam. **S.** Mit Oel bestrichen in den Mastdarm zu bringen.

II. W e i c h e F o r m.

Lattwerge.

Die *Lattwerge* (*Electuarium*, *Opiatum*, *Conditum*, *Confectio*) ist eine weiche, in Rücksicht der Consistenz zwischen der des Syrups und des Extractes stehende Arzneiform zum innerlichen Gebrauch, welche vom Spatel nicht abfließt, wenn man etwas damit aufnimmt; man lässt sie zuweilen jedoch etwas dünner und weicher (*E. molle*), zuweilen etwas dicker und fester (*E. spissius*) bereiten. Die Bestandtheile einer Lattwerge sind dieselben wie bei den Bissen, man muss indessen bei der Lattwerge mehr auf Geschmack und Geruch Rücksicht nehmen; es passen daher keine übelriechenden, leicht gährenden und verderbenden Substanzen. Gewöhnlich nimmt man trockene, gepulverte Arzneistoffe, man muss aber solche vermeiden, welche specifisch sehr schwer, dabei unauflöslich sind und leicht zu Boden sinken, oder sehr voluminöse. Die aufzunehmenden Mittel müssen in feiner Pulverform zubereitet sein. Da eine gleichförmige Mischung der aufzunehmenden Mittel nicht gut möglich ist, so darf man stark wirkende Stoffe in dieser Form nicht verabreichen, weil die Gabe dann unsicher ist. Die gestaltgebenden Mittel sind meist Honig, Syrupe, eingedickte Pflanzensäfte, Flieder-, Pflaumen-Muss u. s. w. Die Quantität dieser Mittel richtet sich nach der Quantität und Qualität der aufzunehmenden Arzneien; meistentheils ist das Verhältniss dieser Mittel zu den gestaltgebenden wie 1 zu 4; nicht selten aber überlässt man dem Apotheker die Bestimmung der Quantität des gestaltgebenden Mittels und schreibt: *quantum sufficit, ut fiat Electuarium*. In der Unterschrift giebt man das Gefäss an, in

welchem die Lattwerge gegeben werden soll, z. B. *D. in fictile*, *olla u. s. w.* Die Signatur zeigt die Gabe und die Zeit an, wann die Lattwerge genommen werden soll. Vor dem Einnehmen soll man sie jedesmal umrühren. Gegenwärtig bedient man sich seltener dieser Arzneiform, am öftersten bei Kindern (*Wurmlattwergen*) und bei Frauenzimmern.

Zum äusserlichen Gebrauch hat man die *Zahnlattwerge* (*E. dentifricium*), welche zum Abreiben der Zähne dient. Die aufzunehmenden Substanzen sind dieselben wie bei dem Zahnpulver, nur lässt man dieses durch Zusatz eines süssen Saftes, z. B. des Rosenhonigs, zur Lattwerge machen.

Die *Zahnfleisch - Lattwerge* (*E. gingivale*) wird aus adstringirenden, balsamischen, antiscorbutischen u. s. w. Heilmitteln in Pulverform und in Verbindung mit Honig, Extracten oder wässerigen und spirituösen Flüssigkeiten bereitet, und hat den Vortheil vor den Mundwässern, dass sie länger auf dem Zahnfleische verweilt.

Lattwergen für die äussere Haut sind mehr zu den Salben oder Linimenten zu rechnen.

B e i s p i e l e.

Ry. Pulveris radiceis jalappae scrupulos duos
 „ „ valerianae minoris drachmas duas
 „ seminis santtonici unciam dimidiam

Syrupi corticum aurantiorum q. s. ut fiat electuarium molle.

D. in olla. *S.* Täglich zweimal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Ry. Coccionellae pulveratae scrupulum unum
 Myrrhae pulveratae drachmam dimidiam
 Pulveris radiceis iridis florentinae
 „ corticeis chinae rubrae ana drachmas tres
 Mellis rosati q. s. ut fiat electuarium.

D. in olla. *S.* Zahnlattwerge.

Ry. Corticeis chinae fuscae subtilissime pulverati drachmas duas
 Extracti Ratanhiae pulverisati drachmam unam cum dimidia
 Aquae cinnamomi vinosae q. s. ut fiat electuarium.

D. ad ollam. *S.* Zahnfleischlattwerge.

Conserven. Syrupe. Honigsäfte.

Die *Conserven*, *Kräuterzucker* (*Conservae*), *Syrupe*, *Zuckersäfte* (*Syrupi*) und die *Honigsäfte* (*Mellita*) sind Arzneiformen, welche höchst selten in einer Magistralformel verschrieben werden. Sie bilden sämmtlich den Uebergang von den Lattwergen zu den Lecksäften.

Die *Conserven* bestehen aus einer Mischung von vegetabilischen Substanzen, Blumen, Blättern, Früchten mit Zucker. Diese Pflanzenstoffe werden entweder frisch (und diess ist eigentlich allein zweckentsprechend) zu einem Brei gestossen, oder getrocknet und zu Pulver gestossen und mit Zucker gemengt.

Die *Syrupe* bestehen aus einem Theile irgend einer arzneilichen Flüssigkeit, einer Abkochung u. s. w., mit zwei Theilen Zucker. Die Auflösung des Zuckers geschieht entweder in gewöhnlicher oder etwas erhöhter Temperatur, oder durch Kochen, und dann seihet man sie warm durch ein Tuch.

Die *Honigsäfte* sind Mischungen von Honig mit einer Flüssigkeit, welche mehr oder weniger mit Arzneistoffen geschwängert ist; zuweilen werden diese dem Honig durch Kochen beigelegt.

Gallerte.

Die *Gallerte* (*Gelatina*, franz. *Gelée*) ist eine durchsichtige, zähe, elastische, zitternde Masse zum innerlichen Gebrauch, welche theils aus animalischen theils aus vegetabilischen Theilen bereitet wird; Hirschhorn, Hausenblase, Isländisches Moos, Salep u. s. w. sind die gewöhnlichen Bestandtheile derselben. Man lässt nämlich die zur Gallerte bestimmte Substanz mit Wasser in gehöriger Menge abkochen, durchseihen und so weit einkochen, bis die Flüssigkeit, wenn man einen Tropfen derselben auf einen kalten Teller fallen lässt, zu einer zitternden Masse gerinnt. Nun setzt man Zucker oder Gewürz u. s. w. zu, stellt die Masse an einen kühlen Ort und gewinnt auf diese Weise eine gute Gallerte. Durch einen Zusatz von Hausenblase kann man jeden Aufguss, jede Abkochung zur Gallerte machen lassen. Beim Verordnen setzt man zuerst den auszuziehenden

Stoff und die Quantität des Wassers (gewöhnlich 8mal so viel), lässt dasselbe bis zur Hälfte und noch darüber einkochen (*coque ad remanentiam dimidiaie partis*), die Abkochung durchseihen und mit Hausenblase, welche in heissem Wasser gelöst worden ist, vermischen und bis zur gehörigen Consistenz einkochen. Dann erst wird der Zucker zugesetzt. Zuweilen lässt man des besseren Aussehens wegen die Flüssigkeit mit Eiweiss klären (*Eliqua cum ovi unius albumine*); endlich giebt man den Ort an, wohin das Gefäss gestellt werden soll (*Reponetur in loco frigido, ut in gelatinam abeat*). Isländisches Moos wird vor der Abkochung stets mit siedendem Wasser abgebrüht. In der Unterschrift giebt man das Gefäss an, worin die Gallerte verabreicht werden soll. Die Gallerte lässt man Theelöffelweise nehmen.

B e i s p i e l e.

Ry. Radicis senegae concisae

„ althaeae concisae ana drachmas duas.

Coque cum aquae communis q. s. ad colaturam unciarum quatuor

Ichthyocollae minutissime concisae drachmam dimidiam.

Fiat gelatina, cola et adde

Syrupi capillorum veneris unciam unam.

M. D. ad ollam. S. Täglich viermal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Ry. Lichenis islandici concisi aquae fervidae q. s. abluti uncias duas

Corticis peruviani contusi unciam unam

Coque cum aquae communis unciis viginti quatuor ad remanentiam unciarum duodecim.

Finite coctione adde

Corticis cinnamomi contusi drachmam unam.

Ebullitione unica cola et solve

Sacchari albi uncias duas.

Eliqua albumine ovi quassati unius et liquorem colatum evapora leni igne, ut in loco frigido repositus consistentiam gelatinae assumat.

D. ad ollam. S. Täglich dreimal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Umschläge.

Umschläge (Epithemata) nennt man äusserliche Arzneimittel von verschiedener Form und Consistenz, welche auf die Oberfläche des Körpers angewendet werden. Die Umschläge können nun trocken sein und aus verschiedenen Pulvern bestehen (*Epithemata sicca. S. Species pag: 14.*); oder sie sind flüssig, dann nennt man sie Bähungen (*S. Bähungen*); oder sie sind von einer breiartigen Consistenz und werden dann *Breiumschläge (Cataplasmata)* genannt.

Es giebt zwei Arten dieser Breiumschläge, *rohe* und *gekochte*; jene (*C. cruda*) werden durch Zerquetschen, Zerstoßen u. s. w. frischer Vegetabilien, oder durch Zusammenmischen gepulverter Vegetabilien mit anderen flüssigen oder auch festen Substanzen bereitet; so z. B. nimmt man Merrettigwurzeln, Mohrrüben, welche man zerreibt, Zwiebeln, frische Früchte u. s. w. zu rohen Breiumschlägen; man nimmt aber auch Senfpulver, zerstoßenen Pfeffer, Wachholderbeeren u. s. w., feuchtet diese mit Essig, Wein u. s. w. an, oder mengt sie mit Sauerteig und lässt daraus einen Breiumschlag bereiten. In der Unterschrift schreibt man blos: *q. s. ad consistentiam cataplasmatidis.*

Die gekochten Breiumschläge (*Cataplasmata cocta*) bestehen aus verschiedenen, besonders vegetabilischen Ingredienzien, z. B. Samen, Blättern, Blüthen, Mehl, Kleie u. s. w., welche man entweder mit Flüssigkeiten, als Wasser, Milch, Bier, Essig, Wein u. s. w. kocht, oder sie mit diesen, wenn man sie heiss gemacht hat, zusammenmengt. Setzt man dazu noch flüchtige Arzneistoffe, z. B. Kampher, so muss diess erst kurz vor dem Gebrauche des Umschlages geschehen. Die trockenen Bestandtheile sollen nicht zu grob gepulvert sein, damit sie den Kranken nicht drücken. Gewöhnlich verordnet man nur die trockenen Ingredienzien und lässt diese in der Behausung des Kranken kochen oder durch heisse Flüssigkeiten erweichen. — Die Breiumschläge müssen stets so gross sein, dass sie den kranken Theil völlig bedecken, ja noch etwas darüber hinausragen. Man macht sie noch dicker als trockene Umschläge, nur dürfen sie nicht durch Druck belästigen. Auch ist es nothwendig, dass man das Material oft erneuert, weil es leicht sauer wird,

oder wenn die Umschläge von Eiter durchdrungen sind, diess bei jedem neuen Verbande thut. Den Grad der Temperatur für die warmen Umschläge muss der Arzt jedesmal dem Krankheitszustande gemäss bestimmen. — Die Breiumschläge werden nun entweder auf Leinwand gestrichen und unmittelbar auf die Haut gelegt, wie es namentlich bei den rohen Breiumschlägen der Fall ist, oder man legt sie zwischen Leinwand, Mousselin, Tücher, wie es meist mit den gekochten geschieht.

B e i s p i e l e .

Ry. Seminum sinapeos contusorum
Fermenti panis ana unciam unam
Aquae fervidae q. s. ut f. Cataplasma.

D. ad ollam. **S.** Auf Leinwand zwei Linien dick zu streichen.

Ry. Seminum lini
Florum chamomillae
Radicis althaeae
Herbae malvae
„ meliloti ana unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S. Mit kochendem Wasser zu einem dicken Brei zu machen.

S a l b e .

Salbe (Unguentum) nennt man eine weiche, in Bezug auf Consistenz dem ausgelaufenen Honig oder dem Schweineschmalze ähnliche, zum äusserlichen Gebrauch bestimmte Arzneiform, welche weder so flüssig wie Oel, noch so fest als Pflaster sein darf, und auf Leinwand oder Charpie gestrichen *aufgelegt* (Verbandsalbe) oder auf unverletzte Flächen des Körpers *engerieben* wird.

Das gestaltgebende Mittel derselben ist in der Regel ein mildes Oel oder Fett, seltener Eigelb, weil solche Salben leicht trocknen und sich zersetzen. Die aufzunehmenden Stoffe sind entweder vegetabilische, animalische oder mineralische Substanzen, als Pulver, Canthariden, Metalloxyde u. s. w. Diese Substanzen müssen aber sehr fein gepulvert sein,

damit sie sich gleichförmig vertheilen lassen. Wenn die aufnehmenden Mittel nicht bereits flüssig sind, wie Oele, sondern mehr fest, als Wachs, Harze, Fette, so ist es nothwendig, dass sie zuvor durch mässiges Erwärmen flüssig gemacht werden. Beim Verschreiben giebt man gemeinlich dem Apotheker die Materialien an und überlässt ihm die Zubereitung: *M. f. Unguentum*. Selten ist es, dass man demselben die pharmaceutische Zubereitung vorschreibt, z. B. dass das Wachs zuvor geschmolzen und dann erst ein Arzneikörper beigemischt werden soll: *Leni igne liquefacta M. etc.* Das Verhältniss der Ingredienzien ist meistens so, dass man auf 1 Unze Fett oder Oel 2 bis 3 Drachmen Wachs und 1 Drachme Pulver nimmt; lässt man die Salbe ohne Wachs bereiten, so nimmt man auf 1 Unze Oel 2 bis 3 Drachmen Pulver. Gewöhnlich bedient man sich der Officinalformeln, seltener ist das Verordnen von Magistralformeln; diess geschieht vorzugsweise bei Augensalben, weil diese stets ganz frisch bereitet sein müssen. Metallische Mittel sollen in einem steinernen oder gläsernen Mörser gemischt werden: *M. in mortario lapideo, vitreo*. In der Signatur zeigt man den Gebrauch an, ferner, wie viel Salbe jedesmal zu nehmen und wie oft die Einreibung oder der Verband zu wiederholen ist.

Zuweilen ist es unerlässlich, dass der Arzt in der Signatur bemerkt, womit die Salbe eingerieben werden soll, z. B. bei der Brechweinstein-, Quecksilber-, Kanthariden-Salbe, mittelst Handschuhen. Man lässt die Salben gewöhnlich in einer Büchse, wenn die Salbe aber sehr weich ist, in einem Glase verabreichen; seltener lässt man die einzelnen Quantitäten abtheilen.

Bei Salben, welche für das Auge bestimmt sind, *Augensalben* (*Unguenta s. Balsama ophthalmica*) sollen die pulverigen Substanzen besonders fein gepulvert und vorzugsweise gleichförmig gemischt sein. Man lässt diese Salben, zu welchen man, um das Ranzigwerden zu verhüten, milde und stets frische Fette, namentlich frisches Schweinefett, seltener Oele wählt, und überhaupt, besonders aber, wenn Metalloxyde darin enthalten sind, nur kleine Quantitäten, 1—2 Drachmen auf einmal, verschreibt, entweder mittelst eines Pinsels oder auch mit dem Finger auftragen und be-

stimmt hierbei ebenfalls die jedesmalige Quantität, sowie die Zeit, wie oft es geschehen soll.

Salben, welchen man ätherische Oele zusetzte und diese vorzüglich zu Einreibungen anwendete, nannte man ehemals *künstliche Balsame* (*Balsama artificialia*).

B e i s p i e l e.

Ry. Kali hydriodici subtilissime triti
Natri carbonici depurati sicci ana drachmam dimidiam
Unguenti rosati unciam dimidiam.

M. f. unguentum. D. ad pixidem. S. Morgens und Abends eine Bohne gross einzureiben.

Ry. Zinci oxydati albi drachmam unam
Unguenti simplicis unciam unam.

M. f. unguentum. D. ad pyxidem. S. Zum Verbande.

Ry. Tartari stibiati subtilissime pulverati drachmam unam
Adipis suilli recentis unciam unam.

M. f. unguentum. D. ad pyxidem. S. Mittelst eines Stückes Schweinsblase eine Bohne gross einzureiben.

Ry. Zinci oxydati albi grana quinque
Olei amygdalarum dulcium recentis scrupulum unum
Axungiae porcinae recentis drachmas duas.

M. exactissime, f. unguentum. D. S. Mit einem Pinsel täglich eine Linse gross ins Auge zu streichen.

Oelwachs.

Oelwachs, Wachssalbe, Cerat (*Ceratum*, *Ceroleum*, *Oleoceratum*) ist eine zum äusserlichen Gebrauch bestimmte, zwischen Pflaster und Salbe der Consistenz nach innestehende Masse, gewöhnlich in kleinen viereckigen Tafelchen in den Apotheken vorrätig, deren Grundlage stets aus einem Fette oder Oele und Wachs oder Harz besteht. Ihre Bestandtheile sind übrigens dieselben, wie beim Pflaster. Man nimmt gewöhnlich auf 1 Unze Wachs $1\frac{1}{2}$ bis 2 Unzen Oel und $\frac{1}{2}$ Unze Pulver. Ob man sich gleich gegenwärtig dieser Form nicht mehr so häufig wie ehemals be-

dient, so hat doch diese Masse vor den Salben den Vorzug, dass sie nicht so leicht schmilzt und, wie diess bei ätzenden Mitteln der Fall ist, sich nicht weiter verbreitet, als man beabsichtigt. Man hat hiervon mehrere officinelle Formeln. In der Unterschrift schreibt man: *Leni igne liquefactis fiat Ceratum in capsulas papyraceas effundendum et in taleolas secundum.*

B e i s p i e l.

Ry. Cerae albae.

Cetacei

Olei amygdalarum dulcium ana drachmas duas.

M. f. ceratum in taleolas effundendum. S. Zum äusserlichen Gebrauch.

III. F l ü s s i g e F o r m.

a) Tropfbar-flüssige Form.

Frische, ausgepresste Pflanzensäfte.

Frische, ausgepresste Kräutersäfte (Succi plantarum recentes, expressi) können nur im Frühjahr aus frischen, saftigen Pflanzen oder Blättern, selten aus Früchten und Wurzeln, jedoch niemals aus Rinden und Hölzern bereitet werden. Die Pflanzen, welche in der Nähe wild wachsen oder wenigstens in Gärten zu finden sein müssen, werden nämlich zerkleinert und der Saft ausgepresst; bisweilen, wenn sie zu zähe und trocken sind, legt man sie zuvor eine Zeitlang in Wasser. Man lässt die frischen Kräutersäfte des Morgens mit Kalbfleischbrühe oder auch mit Selterwasser trinken; bisweilen verordnet man, weil sie leicht Indigestion hervorbringen, bald darnach Magentropfen zu nehmen, oder setzt den Säften selbst ein aromatisches Wasser zu. Man verschreibt gewöhnlich nur die täglich zu verbrauchende Quantität der Säfte (etwa 2—4 Unzen) und lässt diese esslöffelweise oder Tassenweise nehmen.

Beispiele.

R_y. Succi recens expressi herbae nasturtii aquatici
 " " " " taraxaci
 " " " " fumariae
 " " " " beccabungae ana
 unciam unam.

M. D. S. Mit Fleischbrühe Tassenweise zu trinken.

R_y. Succi recens expressi herbae taraxaci
 " " " " millefolii
 " " " " fumariae
 Aquae cinnamomi ana unciam unam.

M. D. S. Tassenweise zu trinken.

Auflösung.

Die *Auflösung* (*Solutio*) ist eine flüssige Arzneiform, worin ein auflöslicher Körper mit seinem Auflösungsmittel (*Menstruum*) chemisch so verbunden ist, dass man beide durch das Gesicht nicht mehr unterscheiden noch mechanisch trennen kann. Wenn man ein Arzneimittel in einer Auflösung geben will, so muss man 1) das richtige Auflösungsmittel wählen, welches zugleich dem Heilzwecke entspricht; 2) muss man die gehörige Temperatur und 3) die relative Menge des Auflösungsmittels berücksichtigen. — Auflösungsmittel sind z. B. Wasser für viele Salze, Zucker, Seife, wässrige Extracte u. s. w., Weingeist für Harze, ätherische Oele u. s. w. Was die Temperatur betrifft, so wird gewöhnlich von einem warmen oder heissen Auflösungsmittel mehr aufgelöst, als von einem kalten. Dass sich gewisse Substanzen in einem Auflösungsmittel nur in einer bestimmten Quantität auflösen, ist eine bekannte Sache; diese bestimmte Menge aber zu kennen, ist für den Arzt ganz nothwendig, wenn er keine Fehler in dem Receptschreiben begehen will.

Folgende Tabelle von *Phoebus* über die Auflösbarkeit in einer Unze destillirten Wassers bei mittlerer Temperatur ist besonders zweckmässig:

A. Schwer auflösliche Substanzen. 1 Unze löst weniger als $\frac{1}{2}$ Scrupel auf:

Chinium sulphuricum	$\frac{24}{37}$ Gran.
Chinium	$1\frac{1}{5}$ „
Hydrargyrium aceticum	$1\frac{3}{7}$ „
Tartarus depuratus	$1\frac{23}{25}$ „
Acidum benzoicum sublimatum	$2\frac{2}{5}$ „
Creosotum	6 „
Arsenicum album	8 „
Cinchonium sulphuricum	$8\frac{8}{9}$ „

B. Ziemlich schwer auflösliche Substanzen. 1 Unze löst weniger als 1 Drachme auf:

Bromum	14 Gran.
Acidum boracicum	16 „
„ succinicum	19 „
Cuprum aluminatum	24 „
Morphium muriaticum	24 „
Hydrargyrium muriaticum corrosivum	26 „
Kali oxymuriaticum	28 „
Tartarus stibiatus	32 „
Cuprum aceticum	34 „
Natrum carbonicum acidulum . . .	37 „
Alumen	37 „
Borax	40 „
Kali sulphuricum	48 „
Aether sulphuricus	48 „

C. Leicht auflösliche Substanzen. 1 Unze löst weniger als $\frac{1}{2}$ Unze auf:

Hydrargyrium hydrocyanicum . . .	60 Gran.
Calcaria chlorica	60 „
Aether aceticus	68 „
Salicinum	80 „
Kali nitricum depuratum	96 „
Kali carbonicum acidulum	} 120 Gran.
Natrum phosphoricum	
Tartarus ferratus	
Cuprum sulphuricum	
Saccharum lactis	

Ammonium carbonicum	}	160 Gran.
„ „ pyro-oleosum		
„ muriaticum		
„ „ ferratum		
Natrum aceticum	}	160 Gran.
„ muriaticum		
„ sulphuricum crystallisatum		
Baryta muriatica		
Gummi mimosae		
Manna		
Zincum sulphuricum		192 Gran.

D. Sehr leicht auflösliche Substanzen. 1 Unze löst $\frac{1}{2}$ Unze oder mehr auf

Kali sulphuratum	}	240 Gran.
„ sulphuricum acidum		
Natrum carbonicum		
„ nitricum		
Tartarus ammoniatus	}	320 Gran.
Magnesia sulphurica		
Ferrum sulphuricum crystallisatum		
Argentum nitricum		
Acidum tartaricum	}	480 Gran.
Tartarus natronatus		
Plumbum aceticum		
Cuprum sulphurico - ammoniatum		
Aurum muriaticum	}	720 Gran.
Kali carbonicum		
„ tartaricum		
Tartarus boraxatus		
Ferrum muriaticum oxydulatum	}	960 Gran.
Kali hydriodicum		
Kali causticum		
„ aceticum		
Saccharum		1440 Gran.
Calcaria muriatica		1920 Gran.

Es dürfen aber auch einer Auflösung niemals solche Stoffe zugesetzt werden, welche dieselben wieder trennen.

Die Auflösungen werden eingetheilt in *einfache* und in *zusammengesetzte*; jene enthalten nur eine einzige Substanz

in einem Auflösungsmittel, diese mehr als eine und bisweilen auch in mehr als einem Auflösungsmittel aufgelöst. Endlich theilt man die Auflösungen auch noch in *gemischte* ein, d. h. in solche, wozu man noch Mittel, welche zur Auflösung nicht wesentlich gehören, hinzufügt.†

Beim Verschreiben einer Auflösung setzt man zuerst den aufzulösenden Stoff, sodann das Auflösungsmittel und bezeichnet es durch: *Solve in*. Soll aber die Auflösung sehr concentrirt sein, so überlässt man dem Apotheker die Menge des Auflösungsmittels durch: *q. s. ut fiat solutio*, oder *q. s. ad perfectam solutionem*. Bei einer gemischten Auflösung fügt man hinzu: *Solutioni adde*. In der Unterschrift setzt man blos: *M. D. S.* — Die Auflösung gewährt dem Arzte besonders die Vortheile, dass man die Theilung in einzelnen Gaben genau bestimmen, dass man starke und scharfe Stoffe einhüllen und dass man eine schnelle Wirkung der Mittel auf den Organismus erwarten kann.

Beispiele.

Ry. Tartari stibiati grana duo.

Solve in

Aquae destillatae unciis duabus.

D. S. Einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Kali tartarici drachmas sex

Extracti graminis unciam unam.

Solve in

Aquae rubi idaei unciis quatuor.

Adde

Syrupi simplicis unciam dimidiam.

M. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Magnesiae sulphuricae unciam unam.

Solve in

Aquae destillatae unciis quatuor.

Adde

Syrupi cerasorum acidorum unciam unam.

M. D. S. Esslöffel voll.

Mixtur.

Mixtur (Mixture) nennt man im weiteren Sinne eine jede flüssige Arzneiform, welche entweder blos aus mehre-

ren flüssigen Arzneimitteln bestehet, oder aus Flüssigkeiten in Verbindung mit auflöslichen Substanzen, oder auch aus Flüssigkeiten in Verbindung mit unauflöslichen Stoffen.

Mixtur im engeren Sinne (*M. stricte sic dicta*) oder *Elixir* (*Elixir*) ist eine flüssige, meistens aus mehreren auflöslichen Mitteln, z. B. Salzen, Extracten — aber keinem Pulver — zusammengesetzte Arzneiform. Das Verhältniss der verschiedenen Bestandtheile richtet sich sowohl nach dem Heilzwecke als nach den allgemeinen Regeln der Receptirkunst.

Tränkchen (*Mixtura diffusa, Haustus*), auch *Julep* (*Julapium*) genannt, ist diejenige Form, welche aus mehreren Flüssigkeiten, die in Bezug auf Geruch, Geschmack und Gesicht angenehm sind, bestehet, gewöhnlich auf einmal genommen und daher in kleiner Quantität verschrieben wird.

Schütteltränkchen (*M. cum pulvere s. media*) ist eine aus Flüssigkeiten mit einem oder mehreren unauflöslichen Stoffen, Pulver u. s. w. bestehende Arzneiform, welche jedesmal vor dem Einnehmen umgeschüttelt werden muss.

Tropfen (*Guttae*), *Tropfenmixtur* (*M. concentrata, contracta*) nennt man eine durch Vermischung meist flüssiger Substanzen gebildete flüssige Arzneiform, welche schon in kleinen Gaben sehr wirksam ist und daher tropfenweise, besonders wo schnelle Hülfe nöthig wird, z. B. bei Ohnmachten, gegeben wird. Meistentheils wählt man zu dieser Form nur einfache Flüssigkeiten, z. B. Tincturen u. s. w., und giebt von 2 bis höchstens 80 Tropfen. Man muss jedoch dabei auf die specifische Schwere der Tropfen und auf den Rand des Glases Rücksicht nehmen. Pulver darf man in dieser Form nicht anwenden, wohl aber Auflösungen von festen Körpern, Extracte, Salze u. s. w. in einer angemessenen Menge von Flüssigkeit; weniger passend sind zähe Substanzen, z. B. Copaivbalsam, in Tropfenform zu verabreichen. In der Signatur giebt man die Gabe und die Zeit an, wenn die Tropfen, zuweilen auch das Vehikel, worin sie genommen werden sollen.

Mischungen zum äusserlichen Gebrauche pflegt man niemals Mixturen zu nennen, sondern bezeichnet sie nach ihren Bestimmungen, als Waschung, Einreibung u. s. w.

Beispiele.

Ry. Extracti cardui benedicti
„ centaurei minoris ana drachmam unam
Aquae melissae uncias quatuor
Syrupi corticum aurantiorum unciam dimidiam.

M. D. S. Aller 3 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Acidi sulphurici diluti drachmam unam
Aquae rubi idaei uncias tres
Syrupi rubi idaei unciam unam.

M. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Tartari stibiati granum unum
Aquae destillatae unciam unam
Oxymellis scillitici
Syrupi althaeae ana drachmas duas
Pulveris radices Ipecacuanhae scrupulum unum.

M. D. S. Umgeschüttelt, aller Viertelstunden einen Löffel voll zu nehmen bis Erbrechen erfolgt.

Ry. Aetheris sulphurici drachmam unam
Tincturae cinnamomi drachmas duas.

M. D. S. Aller Viertelstunden 10 Tropfen zu geben.

Aufguss.

Aufguss (Infusum) nennt man eine flüssige Arzneiform, welche durch Maceration und Digestion einer oder mehrerer Arzneisubstanzen in einem Auflösungsmittel erhalten wird. Diese Arzneisubstanzen, welche man aufgiesst, sind nur vegetabilischer Natur; man nennt sie *Species zum Aufguss (Species infundendae)*. Eine jede Flüssigkeit, welche sowohl zum innerlichen als zum äusserlichen Gebrauche anwendbar ist, kann das Auflösungsmittel sein, z. B. Wasser, Essig, Wein u. s. w.

Nachdem die Flüssigkeit einen Theil oder auch das Ganze der auflöslchen Stoffe von den Arzneisubstanzen, welche man aufgiessen lässt, in sich aufgenommen hat, trennt man diese durch Abgiessen, Durchsiehen und Filtriren. — Man theilt die Aufgüsse ein in *kalte*, wenn man die arzneilichen Substanzen mit kalten Auflösungsmitteln, in *heisse*, wenn

man sie mit heissen behandelt. Die Wahl der Auflösungsmittel hängt von der Beschaffenheit der Species zum Aufguss und von der Natur der Krankheit ab; so kann man aus vielen vegetabilischen Substanzen verschiedene Stoffe ausziehen, je nachdem man jene mit Wasser oder mit Wein oder Alcohol, kalt oder heiss aufgiesst.

Der *kalte Aufguss* (*Infusum frigide paratum, frigidum*) wird mit Wasser, Wein, Weingeist, Essig, Bier u. s. w. bereitet; die Species dazu werden entweder grob geschnitten oder pulverisirt. Beim Verschreiben setzt man zuerst die Species, dann die aufzugießende Flüssigkeit (gewöhnlich 6 — 8 mal so viel als die Species), deren Quantität man zweckmässiger dem Apotheker überlässt; dagegen bestimmt man die Menge des zu liefernden durchgeseihten Aufgusses. Hierauf giebt man die Zeit an, wie lange das Auflösungsmittel mit dem auszuziehenden Körper in Berührung bleiben soll, ob es durchgeseiht (wenn die Species grob zerschnitten waren) oder filtrirt (wenn sie in Pulverform waren) werden soll. Endlich schreibt man noch die Zusätze vor, welche man zu der durchgeseihten oder filtrirten Flüssigkeit gemacht haben will. Die ganze Unterschrift lautet demnach folgendermaassen: *Infunde cum aquae communis unciiis octo (q. s.), stent in loco frigido per horas . . . , cola (filtra), colaturae (filtrato) adde . . . M. D. S.* Zuweilen muss der Aufguss mehrmals umgerührt werden, dann schreibt man: *saepius agitando*.

Der *heisse Aufguss* (*Infusum fervide paratum, fervidum, calidum*) wird so bereitet, dass die Species, welche hierbei nur grob geschnitten, nicht gepulvert sein dürfen, mit kochendem Wasser u. s. w. aufgegossen werden und nach ihrer Beschaffenheit mit dem Auflösungsmittel eine bestimmte Zeit, — $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Stunde — in Berührung bleiben, und zwar in einem verschlossenen Gefässe und an einem temperirten Orte, dann durchgeseiht, zuweilen auch ausgedrückt werden. Der durchgeseihten Flüssigkeit, welche man die *Colatur* (*Colatura, Colatum*) nennt, kann man noch andere Arzneimittel zusetzen. Sind diese hinzuzusetzenden Arzneimittel flüchtiger Natur, z. B. Kampher, Ammonium u. s. w., so dürfen sie erst nach dem Erkalten des Aufgusses hinzugesetzt werden. — Die Unterschrift wird nun so gemacht

werden: *Infunde cum aquae fontanae q. s. ad colaturam unciarum, stent in digestionem vase clauso per horam dimidiam loco tepido, colaturae (refrigeratae) adde, oder: cola et exprime, oder; in colatura solve u. s. w.* Man kann auch die heissen Aufgüsse gleich als fertig verschreiben, z. B. *Ry. Infusi valerianae aquosi parati e drachmis duabus radicis uncias quatuor.* In der Signatur giebt man die Quantität der Gabe und die Zeit des Gebrauches an.

Beispiele.

Ry. Corticis chinae pulverisati unciam dimidiam.

Infunde cum

Aquae fontanae frigidae q. s.

Macerentur per nycthemeron loco frigido saepius agitando; filtrato unciarum quatuor adde

Syrupi florum naphae unciam dimidiam.

M. D. S. Aller 3 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Radicis valerianae minoris

„ serpentariae virginianae ana unciam dimidiam.

Infunde cum

Aquae fervidae q. s.

Ad colaturam unciarum octo, cui refrigeratae adde

Spiritus sulphurico-aetherei drachmam unam

Syrupi corticum aurantium unciam dimidiam.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Abkochung.

Die *Abkochung*, der *Åbsud* (*Decoctum*, *Apozēma* — ἀπόζεμα), ist eine flüssige Arzneiform, welche durch Kochen einer zum Theil auflöslichen, festen Substanz mit einem Auflösungsmittel bereitet wird; dieses Kochen besteht entweder nur in einem *Aufwallen* (*ebullire*), oder in einem *Ein-kochen*, wobei die Quantität des Auflösungsmittels durch das länger fortgesetzte Kochen vermindert wird. Die Substanz (*Species decoquendae*, *Species decocti*) ist meist von vegetabilischer Beschaffenheit und muss grob zerschnitten oder zerstoßen, aber nicht pulverisirt sein; sehr flüchtige Substanzen eignen sich nicht zur Abkochung. Das Auflösungsmittel ist grösstentheils Wasser, zuweilen auch Bier, Wein

u. s. w. Was die Temperatur betrifft, so ist Siedhitze erforderlich; die Zeit des Kochens richtet sich nach der Auflöslichkeit der Substanz und nach der Wahl des Auflösungsmittels. Nach dem Kochen wird die Flüssigkeit durchgeseiht. Was die Zusätze zu den Abkochungen, die Quantität derselben, die Ordnung beim Verschreiben, die Unterschrift und Signatur betrifft, so gilt das im vorigen Kapitel bei dem Aufgusse Erwähnte auch hierbei.

Aus der Verbindung einer Abkochung und eines Aufgusses entstehen noch zwei Arzneiformen:

a) Die *Aufguss-Abkochung* (*Infuso-decoctum*), wenn nemlich die Species zuerst aufgegossen, die Flüssigkeit abgeseiht und der Rückstand nachher gekocht wird, entweder mit derselben oder mit einer neuen Flüssigkeit, und dann beide durchgeseihete Flüssigkeiten zusammengemischt werden. Es geschieht diess vorzüglich, um alle Bestandtheile der Vegetabilien, die flüchtigen sowohl als die fixen, zu erhalten. (In den meisten Apotheken werden gegenwärtig die Aufgüsse und Abkochungen zweckmässiger und schneller mittelst heisser Wasserdämpfe bereitet, und Aufgüsse und Abkochungen unterscheiden sich nur durch kürzere oder längere Dauer der Einwirkungen der Flüssigkeiten.) Im Uebrigen verfährt man nach den bei dem Aufgusse und der Abkochung angegebenen Regeln.

b) Der *Abkochung-Aufguss* (*Decocto-infusum*), wenn man eine zur Abkochung weniger oder nicht geeignete Substanz mit einem noch heissen Decocte aufgiessen lässt. Das übrige Verfahren ergibt sich aus dem bereits Mitgetheilten.

Beispiele.

Ry. Corticis simarubae drachmas duas.

Coque cum

Aquae fontanae unciis sex.

Colaturae unciarum trium adde

Extracti ligni campechiani drachmam unam

Syrupi opii drachmas tres.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Radicis columbo unciam dimidiam.

Coque cum

Aquae communis unciis sedecim ad remanentiam unciarum octo.

Colaturae expressae et refrigeratae adde

Syrupi corticum aurantiorum unciam unam.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

ad a)

R_y. Radicis calami aromatici

„ caryophyllatae ana drachmas tres.

Infunde

Aquae fervidae q. s. ad Colaturam unciarum sex.

Stent in digestionem per horam dimidiam.

Radicis residuas coque cum

Aquae communis unciis sex ad colaturam fortiter expressam unciarum quatuor.

Liquores colatos misce, refrigeratis adde

Syrupi cinnamomi unciam unam.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

ad b)

R_y Corticis chinae unciam dimidiam.

Coque cum

Aquae fontanae q. s. ad remanentiam unciarum quatuor.

Sub finem coctionis adde

Radicis valerianae minoris

„ calami aromatici ana drachmam unam.

Digere per octavam horae partem vase clauso. Colaturae refrigeratae adde

Syrupi corticum aurantiorum unciam dimidiam.

M. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

T i s a n e.

Die *Tisane* (*Ptisana*, *Decoctum tenue*) ist eine flüssige Arzneiform, welche zum innerlichen Gebrauche bestimmt, theils durch Aufguss, theils durch Abkochung, zuweilen auch durch blosse Maceration, Mischung und Auflösung bereitet wird. Da die Tisane meist zu einem längeren Gebrauch bestimmt ist, so giebt man ihr durch Zusatz von süßen Stoffen einen Wohlgeschmack. Sehr häufig verordnet man dem Kranken die Species, damit er die Tisane in sei-

ner Behausung bereiten lassen kann. Die Gabe wird nach Gläsern, Tassen oder Flaschen bestimmt.

B e i s p i e l.

Ry. Ligni guajaci unciam unam.

Radicis caricis arenariae

„ bardanae

„ saponariae

„ liquiritiae ana unciam dimidiam.

Concisa M. D. S. Einen Esslöffel voll mit einem halben Quart Wasser zu kochen und tassenweise zu nehmen.

Pflanzenmilch.

Pflanzen- oder *Samenmilch* (*Emulsio*) nennt man eine flüssige Arzneiform, welche milchartig aus einer vegetabilischen Substanz und Wasser (*emulgendero*) bereitet wird. Man theilt die Emulsionen ein in 1) *wahre* oder *ächte* und 2) in *falsche* oder *unächte*.

1) Die wahre, achte Emulsion (*E. vera, genuina*) wird aus einer zum Theil unauflöslichen vegetabilischen Substanz (meist Samen oder Kerne, welche ölig-schleimige Bestandtheile besitzen) mit Wasser, worin die Theile dieser Substanz mechanisch zertheilt schweben, erhalten. Das Verhältniss dieser beiden Ingredienzien ist gemeiniglich auf 8 Theile Wasser 1 Theil Samen oder Kerne. Da das gemeine Wasser oft viel Kohlensäure oder kohlensaure Salze enthält, so ist destillirtes Wasser für die Samen-Emulsionen empfohlen worden; sie scheiden sich, mit destillirtem Wasser bereitet, nicht so leicht. Solche Vegetabilien sind Mandeln, Lein-, Hanf-, Mohn-Samen; die Mandeln werden zuvor mit heissem Wasser abgebrüht und geschält, was bei Samen nicht nöthig ist, mit Zusatz von wenig Wasser gestossen, dann die vorgeschriebene Menge Wasser nach und nach zugesetzt; man seihet hierauf die Emulsion durch und macht zuweilen des besseren Geschmacks willen Zusätze von Syrup, Zucker u. s. w. Arzneiliche Zusätze kann man nur in kleinen Quantitäten machen und mit Rücksicht auf die chemische Verwandtschaft, damit dadurch keine Zersetzung der Emulsion erfolgt, z. B. durch Säuren, Tinkturen u. s. w. — Beim Verschreiben einer wahren Emulsion setzt man zuerst die Samen oder die abgeschälten Mandeln u. s. w.,

dann die Flüssigkeit mit Angabe der Menge derselben, oder man überlässt diess dem Apotheker und bestimmt die Menge der durchgeseihten Emulsion; hierauf schreibt man die Verfertigung der Emulsion vor: *Terendo sensim aquam affunde, ut fiat emulsio*, oder einfach: *fiat l. a. emulsio*. Setzt man noch etwas hinzu, so bemerkt man: *Colaturae adde*, dann *M. D. S.* In der Signatur giebt man die Dosis und die Zeit derselben an.

2) Die *unächte, falsche Emulsion (E. spuria)* zerfällt in die *Oel-Emulsionen (E. oleosae)* und in die *Harz-Emulsionen (E. resinosae)*.

Die Oel-Emulsion kann aus jedem milden, fetten Oele bereitet werden; das Auflösungsmittel ist auch hier das Wasser, doch muss man noch eine oder mehrere Substanzen hinzufügen, um eine Verbindung zwischen dem Oele und dem Wasser zu bewirken, so dass diese sich nicht sogleich im Glase wieder trennen. Man nennt ein solches Mittel das *aneignende*, und es besteht meist aus einer schleimigen, eiweisstoffigen Substanz, z. B. Eigelb, arabischem Gummi, Tragant schleim u. s. w. Das Oel muss rein und frisch sein; es wird zuerst mit dem aneignenden Mittel nach und nach gemischt, und dann setzt man das Wasser zu. Gewöhnlich nimmt man auf 1 Theil Oel den achten Theil Schleim; zuweilen überlässt man dem Apotheker die Bestimmung der Menge des Schleims. Beim Verschreiben setzt man zuerst das Oel, dann das aneignende Mittel, hierauf das Wasser, und zuweilen fügt man noch Verbesserungsmittel des Geschmacks wegen hinzu. In der Unterschrift folgt die Anweisung, eine Emulsion daraus zu bereiten.

Die Harz-Emulsion besteht aus einem Harz oder Gummiharz, Balsam u. s. w., aus Wasser und einem aneignenden Stoffe, gewöhnlich Eigelb oder Schleim. Das Verhältniss der Stoffe zu einander, die Bereitungsart, Zusätze, Gabe u. s. w., alles dieses ist wie bei den öligen Emulsionen.

Beispiele.

Ry. Amygdalarum dulcium excorticatarum unciam unam.
Contunde in mortario lapideo et affunde sensim terendo
Aquae destillatae uncias octo.

F. l. a. Emulsio.

Colaturae adde

Sacchari albi unciam dimidiam.

M. D. S. Aller Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Seminum cannabis

„ papaveris albi ana drachmas tres.

Contunde et tere cum

Aquae communis q. s. ut f. l. a. Emulsio.

Colaturae unciarum sex adde

Nitri depurati drachmam dimidiam

Syrupi papaveris albi unciam dimidiam.

M. D. S. Aller zwei Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Olei amygdalarum dulcium unciam dimidiam

Gummi arabici drachmam unam

Aquae florum tiliae uncias quatuor.

M. f. l. a. Emulsio, cui adde

Syrupi althaeae unciam dimidiam.

M. D. S. Aller zwei Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Ry. Balsami copaivae drachmas sex

Gummi arabici drachmas duas

Aquae corticum aurantiorum uncias sex.

M. f. l. a. Emulsio, cui adde

Spiritus nitrico-aetherei drachmam dimidiam.

M. D. S. Aller drei Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Molken.

Molke, Schotten, Wadeke, Wattig (Serum lactis) ist die aus der Milch zurück gebliebene Flüssigkeit, nachdem sich der Rahm und der Käse durch Coagulation aus der Milch abgeschieden haben. Diese Coagulation geschieht theils von selbst, wenn der Milchzucker durch andauernde Einwirkung der Wärme und der Luft anfängt in saure Gährung überzugehen, theils wird sie durch verschiedene Zusätze künstlich bewirkt; jene nennt man *saure Molken (Serum lactis spontaneum, acidum)*, diese *süsse Molken (S. l. dulce)*.

Die Mittel, eine Coagulation der Milch zu bewirken, sind vorzüglich saure; das einfachste und beste, um die reinste Molke zu erhalten, ist der saure Kälberlaabmagen. *) Man bedient sich aber auch des Citronensaftes, des Weinsteins, der Tamarinden, des Alauns, des Rheinweins, des Senfs, der Schwefelsäure u. s. w.

Man verschreibt gewöhnlich nur die täglich zu verbrauchende Quantität der Molken auf einmal, weil sie leicht verderben. Zuerst setzt man die Qualität (*Kuh-, Ziegen- u. s. w. Milch*) und die Quantität der Milch (*jederzeit einige Unzen mehr als die Molken betragen*), und das Aufsieden in einem irdenen Gefässe — *ebulliant in vase fictili* —, dann den Zusatz, wodurch sie zur Gerinnung kommen soll, *q. s. ad perfectam casei separationem*. Hierauf werde die Flüssigkeit durchgeseiht und mit Eiweiss abgeklärt, *cola et eliqua cum albumine ovi*.

B e i s p i e l.

Ry. Lactis vaccini libras duas.

Ebulliant in vase fictili, tunc adde

Succi citri q. s. ad perfectam casei separationem.

Cola et filtra.

D. S. Tassenweise zu nehmen.

Schleim.

Der *Schleim* (*Mucilago, Mucago*) ist eine dem Honig an Consistenz ähnliche, meist geschmack- und geruchlose Flüssigkeit, welche aus verschiedenen Pflanzentheilen, die bald mit kaltem bald mit heissem Wasser behandelt werden, gewonnen wird. Die Schleime dienen theils für sich als Arzneimittel, theils werden sie als Zusatz zu anderen Arzneistoffen gebraucht. Der Arzt muss aber beim Verordnen des Schleimes das Verhältniss der schleimigen Pflanzen-

*) Anmerkung. Der saure Kälberlaabmagen wird so zubereitet, dass der Magen 6 — 12 Stunden lang in Essig eingeweicht, dann aufgeblasen, getrocknet und in fingerlange Stücke zerschnitten wird, welche vor ihrem Gebrauche wieder 10 — 12 Stunden, 1 Theil in 12 Theilen kalten Wassers, eingeweicht werden. Von dieser Flüssigkeit nimmt man 1 Theelöffel auf 12 Unzen Milch, setzt diese einer gelinden Wärme aus, bis die Gerinnung beendet ist, und scheidet dann durch Coliren die Molken vom dem Käsestoffe ab.

stoffe zu den Flüssigkeiten genau kennen, so z. B. giebt eine Drachme von arabischem Gummi, in Verbindung mit höchstens 2 — 3 Unzen Wasser, eine gehörige schleimige Mischung, eine Drachme Traganth aber mit 6 — 8 Unzen Wasser. Am zweckmässigsten überlässt man dem Apotheker die Bereitung des Schleimes und verschreibt denselben als bereits fertig.

Beispiel.

Ry. Mucilaginis gummi arabici
Aquae valerianae ana uncias tres
Camphorae tritae grana sex
Syrupi cinnamomi unciam unam.

M. l. a. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Lecksaft.

Der *Lecksaft*, *Saft* (*Linctus*, *Looch*, *Eclegma*), ist eine flüssige, zum innerlichen Gebrauche bestimmte Arzneiform von der Consistenz des Syrups oder Honigs und von angenehmem Geschmacke. Das Hauptmittel im Lecksaft kann sowohl in einer auflöslichen als unauflöslichen Substanz bestehen. Gewöhnlich giebt man nur kleine Gaben, verbindet diese mit Honig, Syrup, süßem Mandelöle u. s. w.; sind die Stoffe zu dickflüssig, so setzt man etwas destillirtes Wasser hinzu. In der Unterschrift schreibt man: M. f. linctus. Die Gabe ist in der Regel Theelöffelweise.

Von dem Lecksaft unterscheidet sich der *Pinselfaft* (*Litus oris*) blos dadurch, dass derselbe nur zum äusserlichen Gebrauche bestimmt ist; im Uebrigen ist die Bereitung und Zusammensetzung dieselbe.

Beispiele.

Ry. Sulphuris stibiati aurantiaci
Extracti Hyoseyami ana grana tria
Syrupi althaeae
Aquae florum tiliae ana unciam unam.

M. f. linctus. D. S. Ungeschüttelt einen Theelöffel voll stündlich zu nehmen.

Ry. Boracis venetae drachmam unam
Syrupi mororum unciam unam.

M. D. S. Pinselsaft.

Gurgel - Mund- und Augen - Wasser.

Die *Gurgel-*, *Mund-* und *Augen-Wässer* (*Gargarismata*, *Collutoria*, *Collyria* s. *Aquae ophthalmicae*) sind flüssige Arzneiformen, welche, zum äusserlichen Gebrauche bestimmt, zwar keine besonderen Formen von Arzneimitteln darstellen, indem sie bald Auflösungen von Salzen und Schleim, bald Aufgüsse, Abkochungen u. s. w. sind; allein sie dürfen keine unauflöslichen Substanzen enthalten, und müssen, namentlich die Augenwässer, sehr vorsichtig abgeklärt werden. Die Gurgel- und Mund - Wässer, deren Temperatur man bei der Anwendung bestimmen muss, sollen von dem Kranken nicht verschluckt werden; daher kann man vorzüglich die ersteren auch bei Kindern nicht anwenden. Die Augenwässer werden entweder ins Auge eingetröpfelt, oder mittelst Compressen oder Pinsel, welche man damit befeuchtet, angewendet.

B e i s p i e l e.

Ry. Florum sambuci
Herbae malvae ana drachmas tres.

Infunde

Aquae fervidae q. s. ad colaturam unciarum octo.

Refrigeratae adde

Mellis rosarum unciam unam.

M. D. S. Gurgelwasser.

Ry. Extracti ratanhiaie drachmas tres.

Solve in

Aquae salviae unciis sex

Spiritus cochleariae unciam dimidiam.

M. D. S. Mundwasser.

Ry. Lapidis divini granum unum.

Solve in

Aquae rosarum unciis quatuor

Laudani liquidi guttas decem
 Mucilaginis seminum cydoniorum drachmam unam.
 M. D. S. Augewasser.

Waschwässer.

Die *Waschwässer (Lavacra)* sind flüssige Arzneimittel, welche seltener zu therapeutischen Zwecken, mehr als Schönheitsmittel angewendet werden. Gewöhnlich bedient man sich wohlriechender Wässer, verschiedener Spiritusse, in denen man Borax, Säuren, Seifen u. s. w. auflöst.

Beispiele.

Ry. Tincturae benzoes drachmas tres
 Aquae rosarum uncias octo.

M. D. S. Waschwasser.

Ry. Camphorae (tritae) scrupulum unum.

Solve in

Spiritus vini rectificati unciis duabus.

Adde

Aceti vini uncias octo.

M. D. S. Lauwarm mit einem Schwamme Brust und Unterleib täglich einigemal zu waschen.

Einspritzungen.

Einspritzungen (Injectiones) sind flüssige Arzneimittel, welche mittelst einer Spritze in verschiedene Oeffnungen und Höhlen des menschlichen Körpers eingespritzt werden. Man bedient sich gewöhnlich auflöslicher Stoffe in Verbindung mit kaltem oder warmem Wasser, oder der Aufgüsse, Abkochungen, verschiedener Oele u. s. w., vermeidet aber gern pulverige Substanzen. Alle diese Flüssigkeiten werden nach den bisher angegebenen allgemeinen Regeln verschrieben und bereitet. Der Arzt muss die Quantität und die angemessene Temperatur einer jeden Einspritzung dem Kranken zuvor genau angeben. — *Klystiere (Clysteres, Clysmata, Enemata)*, d. h. Einspritzungen in den Dickdarm, wendet man gewöhnlich von einer Temperatur an, welche der des menschlichen Organismus gleichkommt; zuweilen

jedoch müssen sie kalt sein. Die Quantität eines Klystieres ist nach dem Alter und nach den Umständen verschieden; für Erwachsene nimmt man 8—12 Unzen, für Kinder 2—4 Unzen. Sollen die Klystiere aber längere Zeit im Dickdarm zurückgehalten werden, so dürfen sie für Erwachsene nur 3—4 Unzen betragen.

B e i s p i e l e.

Ry. Infusi florum chamomillae uncias octo
Asae foetidae drachmam dimidiam
Vitellum ovi unius.

M. f. l. a. emulsio. D. S. Zum Klystier.

Ry. Tincturae opii simplicis guttas sedecim
Aquae calcis vivae uncias sex.

M. D. S. Zu Einspritzungen zwischen Vorhaut und Eichel.

Ry. Herbae rutae
„ scordii

Corticis salicis ana drachmas tres.

Coque cum aquae communis q.s. ad colaturam uncia-
rum sex; refrigeratae adde

Tincturae myrrhae unciam dimidiam.

M. D. S. Zu Einspritzungen in die Mutterscheide.

Bähungen.

Bähungen (Fomentationes, Fomenta, Epithemata liquida) sind Flüssigkeiten, welche man mittelst leinener oder wollener Tücher, Schwämme oder in Schweinsblasen auf die kranken Theile anwendet; sie sind daher nach Beschaffenheit des jedesmaligen Krankheitszustandes bald kalt, bald warm, bald stärkend, bald erweichend u. s. w. Die Bähungen müssen dünnflüssig, durchaus nicht pulverig sein und keine unauflöslichen Substanzen enthalten. Ist die Stelle, auf welcher die Bähungen angewendet werden sollen, von der Oberhaut entblösst, so muss man dieselben weder zu heiss noch mit solchen Mitteln getränkt anwenden, durch deren Aufsaugung Nachtheil für die Gesundheit entstehen

kann, z. B. Blei, narkotische Mittel u. s. w. Zuweilen verschreibt man blos die Species und lässt die Bähungen im Hause des Kranken bereiten. Uebrigens ist ausser den bereits angegebenen allgemeinen Regeln keine besondere Vorschrift hierbei zu geben.

Beispiele.

Ry. Ammonii muriatici sublimati drachmam unam
Nitri crudi drachmas tres.

M. f. pulvis. D. S. Zwischen ein Tuch zu legen und mit einer Mischung aus 1 Unze Essig und 4 Unzen Wasser zu befeuchten.

Ry. Florum chamomillae
„ sambuci
Herbae hyoscyami ana unciam unam.

Concisa M. f. Species. D. S. Mit 1 Quart kochenden Wassers aufzugiesen, wollene Tücher einzutauchen und über den leidenden Theil zu legen.

Einreibungen.

Unter *Einreibungen* (*Infrictiones*) versteht man diejenigen Arzneiformen, welche bestimmt sind, in äussere oder auch innere Theile des Körpers eingerieben zu werden. Sie können daher ganz flüssig wie Wasser, oder halbflüssig wie Salbe sein. Da bereits von den ganz flüssigen Arzneimitteln zur äusseren Anwendung die Rede gewesen ist, so beschränken wir uns hier blos auf das *Liniment* oder die *Schmiere* (*Linimentum*). Das Liniment steht in Bezug auf die Consistenz zwischen den Waschmitteln und den eigentlichen Salben. Was die Bereitungsart und die Bestandtheile desselben betrifft, so gilt von ihnen fast dasselbe, was von den Salben gesagt worden ist. Zur Basis nimmt man fette Oele, Eigelb, Galle u. s. w.; diesen Mitteln setzt man verschiedene, besonders flüchtige, reizende Arzneistoffe hinzu. In der Unterschrift schreibt man: *M. f. Linimentum*, und wenn es flüchtige Mittel enthält, so fügt man hinzu: *D. ad vitrum bene obturatum*. In der Signatur giebt man die Quantität und die Stelle an, wo das Mittel eingerieben werden soll.

Beispiele.

Ry. Olei papaveris unciam unam
Liquoris ammonii caustici drachmas duas.

M. f. linimentum. D. ad vitrum bene clausum. S. Einen Theelöffel voll auf die schmerzhafteste Stelle einzureiben.

Ry. Olei amygdalarum dulcium drachmas duas
Balsami copaivae drachmas tres
Pulveris gummi mimosæ drachmam unam
Aquae rosarum unciam unam.

M. f. linimentum. D. S. Einen Theelöffel voll einzureiben.

B ä d e r.

Bäder (Balnea) sind Flüssigkeiten, in welche entweder der ganze Körper oder nur einzelne Theile desselben eingetaucht werden. Man theilt sie daher in *ganze Bäder (Balnea universalia)*, *Halbbäder (Semicupia)*, in *Sitz- oder Bidet-Bäder (Insessus)*, wobei blos die Nates und die Geschlechtstheile eingetaucht werden, in *Fussbäder (Pediluvia)*, in *Armbäder (Brachiluvia)*, in *Handbäder (Maniluvia)* und in andere örtliche Bäder (*B. topica, localia*) ein. Ausserdem giebt es noch *Tropfbäder (Stillicidia)*, *Douchbäder (Ducciae)*, *Regen- oder Staub-Bäder (Impluvia)*, *Sturz- oder Giess-Bäder (Embrocationes, Affusiones)* und *Eintauchungen (Submersiones)*.

Die Bäder sind entweder *natürliche* oder *künstliche*, sogenannte *medizinische (Balnea medicata)*, mit welchen wir uns hauptsächlich hier beschäftigen.

Die Grundlage der Bäder ist das Wasser, dem man nach den verschiedenen Heilanzeigen Milch, Fleischbrühe, Wein, Aufgüsse und Abkochungen von Vegetabilien, Seifen, Schwefelalcalien, Salze u. s. w. zufügen kann. Das Verhältniss der verschiedenen Ingredienzien richtet sich nach dem Krankheitszustande und der Wirkung der Mittel. Entweder werden die Mittel im Badewasser blos aufgelöst, z. B. Seesalz u. s. w., oder sie werden mit kochendem Wasser vorher aufgegossen, gekocht u. s. w., und dann dem Bade zugesetzt. Daher verschreibt man meistens die Species zum

Bade und giebt dem Kranken die Anweisung, sie im Hause bereiten zu lassen. Eine Hauptsache bei Bädern ist die Temperatur derselben. Man theilt sie in dieser Beziehung ein in: kalte Bäder $+ 4^{\circ} — + 11^{\circ}$ Réaum., kühle Bäder $+ 12^{\circ} — + 23^{\circ}$ Réaum., lauwarme Bäder $+ 23^{\circ} — + 28^{\circ}$ Réaum., warme Bäder $+ 28^{\circ} — + 36^{\circ}$ Réaum., heisse Bäder $+ 36^{\circ} — + 50^{\circ}$ Réaum.

Unter *trockenen Bädern* versteht man hauptsächlich die Anwendung von warmen Kleien oder Sande in Form eines Bades, namentlich für die Füße. Ausserdem giebt es noch *thierische* oder *Thier-Bäder* (*Balnea animalia*), welche darin bestehen, dass man kranke Theile in den Leib so eben geschlachteter, noch warmer Thiere einbringt.

B e i s p i e l e.

Ry. Herbae menthae crispae

„ serpylli

„ thymi

Florum lavendulae ana uncias tres.

Concisa M. F. Species, D. S. Mit heissem Wasser aufzugiesen und dem Badewasser beizumischen.

Ry. Kali sulphurati unciam unam.

Dentur tales doses No. sex in vase figulino.

S. Eine Dosis mit einem halben Quart Wasser bis zur Auflösung zu kochen und dann ins Bad zu giessen.

b) Elastisch- flüssige Formen.

Unter dieser Form begreifen wir die *Gasarten* und die *Dämpfe*, welche in der Medicin angewendet werden. Von den Gasarten, die durch künstliche chemische Zersetzungen gewonnen werden, werden nur wenige zum äusserlichen Gebrauche, zu allgemeinen oder örtlichen Bädern, öfter zur Reinigung der Luft aus der Apotheke verschrieben; meistens finden sie sich in der Natur, in den natürlichen Bädern vor; zum innerlichen Gebrauche, zum Einathmen, verordnet man bisweilen Chlor, Essigsäure u. s. w.

Die Dämpfe sind entweder *feuchte* oder *trockene* (*Rauch*). Man bereitet trockene Dämpfe aus verschiedenen

vegetabilischen Substanzen (*S. Species*), aber auch aus mineralischen Substanzen, z. B. Schwefel, Zinnober, Quecksilber-Präparaten u. s. w., welche sowohl zum Einathmen, als auch für die äussere Haut und zu Klystieren, z. B. Tabakrauch, angewendet werden. Feuchte Dämpfe werden zum Einathmen, z. B. Wasserdampf, als Dämpfe von Auszügen vegetabilischer Substanzen gegen örtliche Affectionen, als *Bähungen*, als Dampfdouche mittelst eines Leitungsrohres in Anwendung gebracht. Allgemeine Dampfbäder (*Balnea vaporis*) bereitet man am häufigsten aus blossem Wasser, selten aus anderen Flüssigkeiten, z. B. Essig, Weingeist, indem man das Wasser in kleinen Quantitäten auf glühende Steine oder Metallplatten giesst, oder den Weingeist, Essig u. s. w. durch eine darunter angezündete Weingeistlampe erhitzt. Oertliche Dampfbäder können ebenfalls aus blossem Wasser bereitet werden, häufiger aber aus anderen Flüssigkeiten, z. B. Wein, Essig, oder aus Wasser, womit man Pflanzenstoffe oder Ameisen und Ameiseneier extrahirt hat, oder man lässt die Wasserdämpfe durch ein durchlöchertes Gefäss, worin sich die Species befinden, streichen.

... (faint, mirrored text, likely bleed-through from the reverse side) ...

... (faint, mirrored text, likely bleed-through from the reverse side) ...

Recept-Taschenbuch.

Receipt - Tascapen

A.

Abrotānum. Eberreis.

(*Artemisia Abrotanum* L. Eberraute, Stabwurz,
Gartheil, Harthagel).

Herba et Summitates, die Blätter und Spitzen.

Form u. Gabe. Am zweckmässigsten im Aufguss mit Wasser oder Wein, $\text{℥}\beta\text{--}\text{℥}\text{j}$ auf $\text{℥}\text{vj--}\text{℥}\text{viij}$ Colatur. Selten als Pulver oder Lattwerge zu $\text{℥}\text{j--}\text{℥}\beta$. Zu Klystieren $\text{℥}\beta\text{--}\text{℥}\text{j}$ auf $\text{℥}\text{viij--}\text{℥}\text{xij}$.

Man vermeide Verbindungen mit Metallsalzen.

1. **Ry.** Herbae abrotani

„ marrubii albi āā $\text{℥}\text{ij}$.

Conc. inf. in aq. ferv. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor. in vase claus. Col. $\text{℥}\text{viij}$ adde

Extracti enulae $\text{℥}\beta$

Syrupi foeniculi $\text{℥}\text{j}$.

M. D. S. Aller 3 Stunden $\frac{1}{2}$ Kaffeeschale voll.

Anwend. Bei Magenschwäche und in der Reconvalescenz langwieriger Krankheiten.

C. J. Mayer.

2. **Ry.** Summitat. abrotani rec.

„ absinthii āā manip. j.

Fiat cum

Aceti vini gener. s. q. cataplasma.

D. S. Zum Umschlage.

Anwend. Gegen Contusionen.

J. X. Hartman.

3. *Ry.* Herb. abrotani $\bar{3}j$.

Inf. c. aqu. ferv. q. s. et digere
per $\frac{1}{4}$ hor. in loco calido.

Colatur. $\bar{3}viii$ adde

Olei lini $\bar{3}j$.

M. S. Klystier.

Anwend. Gegen Würmer, besonders Madenwürmer.

Absinthium. Wermuth.

(*Artemisia Absinthium L.* Wiegenkraut,
Wurmtod.)

Herba et Summitates Absinthii, Wermuthkraut und Spitzen.

Form u. Gabe. Innerlich selten als Pulver zu $\mathfrak{3}j$ – $\mathfrak{3}\beta$. Frisch ausgepresster Saft zur Frühlingskur, und zuweilen zur Bereitung des Dicksaftes. Aufguss mit Wasser, Bier, Wein, $\mathfrak{3}\beta$ – $\mathfrak{3}j$ auf $\mathfrak{3}viii$, esslöffelweise viermal täglich. Extrakt $\mathfrak{3}\beta$ – $\mathfrak{3}ij$ täglich. Aether. Oel 3–4 Tropfen mit Zucker. Tinktur 15–30 Tr. täglich dreimal. Aeusserlich Klystier, $\mathfrak{3}\beta$ auf $\mathfrak{3}iv$ Milch. Streupulver, Umschlag, Bad $\frac{1}{2}$ –1 Pf.

Man vermeide Verbindungen mit essigsauren Bleisalzen, schwefelsaurem Eisen und Zink.

4. *Ry.* Herbae absinthii

Kali carbonici $\bar{aa}$ $\bar{3}j$.

Infunde cum

Vini rhenani $\mathfrak{8}ij$.

Digere per 20 horas. Cola.

D. S. Täglich 4–6 Unzen zu nehmen.

Anwend. Kräftiges Diureticum und Auflösungsmittel.

P. Frank.

5. *Ry.* Herbae absinthii
 Baccar. juniperi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}\beta$.
 Digere per 6 horas. Cola.

D. S. *Täglich dreimal ein Weinglas voll zu nehmen.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Weikard.

6. *Ry.* Summitat. absinthii $\bar{z}j$
 Cort. aurant. $\bar{z}\beta$
 Rad. rhei $\bar{z}ij$
 „ gentianae $\bar{z}j$.
 Conc. inf. in aqu. bullient. s. q.
 Colat. $\bar{z}vj$ adde
 Syrupi cort. aurantior. $\bar{z}j$.

D. S. *Täglich in 2 Portionen getheilt zu ver-
 brauchen.*

Anwend. Bei Dyspepsie.

J. Hosp.

7. *Ry.* Extr. absinthii $\bar{z}j$
 Aquae menthae piper. $\bar{z}iv$
 Tinct. cort. aurant. $\bar{z}ij$.

M. D. S. *Täglich 2—3 Mal einen Esslöffel voll zu
 nehmen.*

Anwend. Gegen Magenschwäche.

Augustin.

8. *Ry.* Tincturae absinthii
 „ asae foetidae $\bar{a}\bar{a}$.

M. D. S. *Täglich 3 Mal 60 Tropfen.*

Anwend. Gegen Bandwurm bei nervenschwachen Frauen.

Hufeland.

9. *Ry.* Folior. absinthii
 Florum arnicae

Florum sambuci
 „ chamomillae vulg. $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$.
 Terantur in pulv. med. subtilit.

D. S. Zu Kräutersäckchen. Erwärmt auf das Auge zu legen.

Anwend. Gegen Ophthalmia arthritica.

J. A. Schmidt.

10. *Rx.* Herbae absinthii
 Fol. lauri
 „ rorismarini $\overline{aa}$ $\overline{3}j$
 Aquae $\mathfrak{L}v$.
 Coque in vase clauso ad col. $\mathfrak{L}j$.

D. S. Als Umschlag zu brauchen.

Anwend. Bei Contusionen, Sugillationen, Luxationen u. s. w.

Edwards et Vavasseur.

11. *Rx.* Herbae absinthii
 „ sabinae
 „ rutae $\overline{aa}$ $\overline{3}ij$.
 Coque c. aq. font. $\overline{3}xvj$ ad colat. $\overline{3}x$.
 Adde
 Olei Ricini $\overline{3}\beta$.

M. D. S. Zu 2 Klystieren.

Anwend. Gegen Askariden.

Duncan.

12. *Rx.* Herbae absinthii
 „ serpylli
 „ menthae crispae $\overline{aa}$ $\overline{3}j$
 Rad. calami arom. $\overline{3}\beta$.

Conc. M. D. S. Mit 2 Quart kochenden Wassers aufgegossen zu einem Bade.

Anwend. Gegen Muskelschwäche, schwache Verdauung bei Kindern.

Acetum. Essig.

(*Acetum crudum s. commune, Acetum vini, roher, gemeiner Essig, Weinessig.*)

Form u. Gabe. Innerlich zu ℥j-℥iij auf ℥ij Wasser mit Zucker täglich. Aeusserlich als Waschmittel, zu Augen-, Mund- und Gurgelwässern, Fomentationen, Injektionen, Klystieren und in Dampfform.

Man vermeide Verbindungen mit Kali tartaric., Tartarus natronat., ammoniat., Alkalien, Erden, Metalloxyden.

13. Rx. Aceti vini ℥j
Aquae fontanae ℥xvj.

M. S. Tassenweise als Getränk.

14. Rx. Aceti vini ℥ij
Aquae fontanae ℥ij
Syrupi rubi idaei ℥j.

M. D. S. Aller zwei Stunden eine Tasss voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Bleikolik.

Andria.

15. Rx. Aquae flor. sambuci ℥x
Aceti vini acerrimi ℥j
Extr. cort. peruvian. ℥iij
Roob sambuci v. Syrup. cujusd. ℥j.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Im Faulfieber nach Ausführung der galligen Stoffe, oder beim Typhus, wo wahre Schwäche vorhanden ist.

Gesner u. Jahn.

16. *Rx.* Aceti vini
 Spirit. vini rectific. $\overline{aa}$ $\overline{3iv}$.
 Aquae fontanae $\overline{8iv}$.

M. S. Waschwasser.

Anwend. Zur Beförderung der Ausdünstung in Fiebern. Brust, Arme und Hals, oder auch der ganze Körper werden täglich einige Male damit gewaschen.

Berends.

17. *Rx.* Aceti vini $\overline{3ij}$ - $\overline{3iv}$
 Aquae destillatae $\overline{3iv}$.

M. S. Zum Befeuchten der Kompressen.

Anwend. Gegen katarrh. Augenentzündungen.

Lerche.

18. *Rx.* Aceti $\overline{3\beta}$
 Spirit. vini $\overline{3ij}$
 Aquae rosarum $\overline{3iv}$.

M. S. Augewasser.

Anwend. Bei chronischen Augenentzündungen.

Scarpa.

19. *Rx.* Aquae salviae $\overline{3v}$
 Aceti vini $\overline{3j}$.

M. D. S. Mundwasser.

20. *Rx.* Aceti vini $\overline{3ij}$
 Mellis rosati $\overline{3vj}$
 Decocti hordei $\overline{3vj}$.

M. D. S. Gurgelwasser.

21. *Rx.* Aquae font. $\overline{8j}$
 Aceti vini

Alcohol. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{\text{z}}$ vij

Ammonii muriat. dep. $\bar{\text{z}}$ ij.

M. D. S. Kompressen damit zu befeuchten.

Anwend. Bei Wasserbrüchen jüngerer Personen oder frisch entstandenen, bei Aneurysmen des truncus art. coeliacae.

Swediaur.

22. *Ry.* Farinae sem. lini q. s.

Aceti q. s.

F. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Bei Quetschungen und Sugillationen.

23. *Ry.* Decocti avenae excort. $\bar{\text{z}}$ vj

Aceti crudi $\bar{\text{z}}$ ij iij.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. Um kräftig zu reizen bei hartnäckigen Verstopfungen, Schlagflüssen u. s. w.

Reil.

24. *Ry.* Aceti vini

Aquae commun. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{\text{z}}$ iv.

M. S. Zum Klystier.

Vogt.

Acetum aromaticum. Gewürz-,
Pest-, Sicherungs-Essig.

(*Acetum pestilentielle, antisepticum, prophylacticum, bezoardicum, Vinaigre de quatre voleurs.*)

Form u. Gabe. Innerlich zu $\bar{\text{z}}$ ij- $\bar{\text{z}}$ iv, esslöffelweise täglich einige Mal. Aeusserlich als Riechmittel, zum Waschen und Verdunsten.

74 ACETUM CONCENTR. ACIDUM ACETICUM.

25. R_y. Infusi flor. arnicae ex ℥iij parat. ℥vj.

Colat. refriger. adde

Aceti aromat. ℥j

Syrupi cort. aurantior. ℥β.

M. D. S. *Aller zwei Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.*

Schubarth.

26. R_y. Kali carbon. ℥ij

Aceti aromat. q. s. ad saturat.

Aquae cinnamomi simpl. ℥j

Vini gallici alb. ℥iv.

M. D. S. *Alle Stunden 1—2 Esslöffel.*

Hecker.

Acetum concentratum. Concentrirter Essig.

(Acetum per frigus concentratum.)

Form u. Gabe. *Innerlich zu ℥j-℥j, täglich einige Mal. Aeusserlich als Riechmittel.*

27. R_y. Naphthae aceti ℥β

Aceti concentr. ℥ij-iiij

Aquae rubi idaei ℥v

Syrup. rubi idaei ℥ij.

M. D. S. *Aller 1—2 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. *Bei erethistischen Nervenfebern.*

Sundelin.

Acidum aceticum. Essigsäure.

(Alcohol aceti, Acetum glaciale, radicale, concentratissimum.)

28. R_y. Acidi sulphur. dep. ℥β

„ acetici ℥iβ

Unguent. cetacei $\mathfrak{z}$ iß.

M. f. unguentum.

D. S. Morgens und Abends einer Nuss gross einzureiben.

Thomson.

Acidum hydrocyanicum. Blausäure.

(*Ac. zooticum, borussicum, coerulei berolinensis.*
Wasserstoffblau-, preussische, thierische Säure.)

Nach verschiedenen Bereitungsarten verschieden.

Form u. Gabe. Innerlich nach der *Ittner'schen Methode* bereitet zu $\frac{1}{2}$ —3 Tropfen, nach der (jetzt nicht mehr gebräuchlichen) *Vauquelin'schen* zu 1—6 Tropfen, mit destillirtem Wasser vermischt. Aeusserlich zu 5—20 Tropfen.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Erden, Schwefellebern, vielem Wasser und wässerigen Arzneimitteln; man setze sie nicht dem Lichte, der Luft und der Wärme aus.

29. *Ry.* Acidi hydrocyanici *Ittner.* gutt. vj
Aqua destillatae $\mathfrak{z}$ ij.

M. D. in vitro charta nigra involuto.

S. 15 Tropfen mit Wasser zu nehmen.

Anwend. Bei Krämpfen mit Erregung des Gefässsystems und verminderter Spannung der Fasern.

Hufeland.

30. *Ry.* Acidi hydrocyanici *Gay-Lussac.* gutt. j
Alcohol. gutt. vj.

M. S. *Magendie's officinelle* Blausäure.

31. *Ry.* Acidi hydrocyanici offic. Magend. gr. viijß
 Aquae destillatae $\mathfrak{z}$ iv
 Sacchari albiss. $\mathfrak{z}$ j - jß.

M. S. Umgeschüttelt früh u. Abends einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Vereiterung der Lungen. Man kann bis zu 8 Esslöffeln täglich steigen.

Magendie.

32. *Ry.* Acidi hydrocyanici Ittn. gutt. ij
 Spirit. muriat. aether. vel
 Tinct. valerianae aether. $\mathfrak{z}$ ß.

M. S. 20 — 30 Tropfen auf einmal.

Anwend. Gegen alle Arten Krämpfe.

Schneider.

33. *Ry.* Acidi hydrocyanici Ittn. $\mathfrak{z}$ j
 Aquae destillatae $\mathfrak{z}$ j - $\mathfrak{z}$ ß.

M. S. Ins Auge zu streichen.

Anwend. Gegen chronische Hornhautentzündung, Pannus, Hornhautflecke.

Blasius.

34. *Ry.* Decoct. rad. althaeae $\mathfrak{z}$ vj
 Acidi hydrocyanici Vauquel. gutt xxx.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Scirrhus des Fruchthälters.

Brera.

35. *Ry.* Acidi hydrocyanici off. Magend. $\mathfrak{z}$ ijj - jv
 Aquae lactucae $\mathfrak{z}$ xxxij.

M. S. Umgeschüttelt zum Waschen oder Einspritzen.

Anwend. Gegen Flechten, Krebsgeschwüre, Gebärmutterkrebs.

Magendie.

Acidum lacticum. Milchsäure.

Form u. Gabe. *Lösung und Plätzchen*, 2—6 Gran
 aler 2—3 Stunden.

36. *Rx.* Acidi lactici ʒj - ʒiv
 Aquae communis ʒxxxij
 Syrupi sacchari ʒij.

M. S. Limonade.

Magendie.

37. *Rx.* Acidi lactici puri et siccati ʒij
 Sacchari pulv. ʒj
 Gumm. tragacanth. q. s.
 Tinct. vanillae gutt. jv.

Form. past. pond. ʒβ, vase bene clauso asserv.

S. Innerhalb 24 Stunden 6 Stück zu nehmen.

Magendie.**Acidum muriaticum.** Salzsäure.

(*Acidum hydrochloricum, hydricum depuratum, Spiritus salis acidus, Oleum salis, Acidum salis marini s. communis. Chlorwasserstoffsäure, Salzgeist, Kochsalzsäure.*)

Form u. Gabe. Innerlich verdünnt und eingehüllt zu 5—20 Tropfen, täglich mehrmals; in Pillen- oder Bissenform. *Aeusserlich* unverdünnt als Aetzmittel, verdünnt zu Mund- und Gurgelwässern zu ʒj auf ʒvj Wasser, zu Pinselsäften, Augenwässern, Linimenten, Salben, Umschlägen, Waschungen und Bädern zu ʒvj - viij.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Erden, Metalloxyden, namentlich Quecksilbersalzen, salpetersaurem Silber, Salzen vegetabilischer Säuren.

38. *Ry.* Acidi muriatici $\bar{3}$ ij.
 Aquae rubi idaei $\bar{3}$ ij
 Syrup. rubi idaei $\bar{3}$ j.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel in schleimigem Getränk.

Anwend. Im Typhus, Ausschlagsfiebern u. s. w.

Jahn.

39. *Ry.* Acidi muriatici $\bar{3}$ j—jv.
 Aquae rubi idaei $\bar{3}$ jv.

M. S. Alle 1—2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Neben schleimigem Getränk beim Skorbut, Blut-
 fleckenkrankheit, Petechien u. s. w.

W. L. Sachs.

40. *Ry.* Decocti hordei $\bar{8}$ ij
 Acidi muriatici $\bar{3}$ ij
 Syrupi simpl. $\bar{3}$ ij.

M. S. Tassenweise während des Tages zu verbrauchen.

Anwend. Gegen adynamische Fieber.

Hôtel-Dieu.

41. *Ry.* Acidi muriatici gutt. v—x
 Aquae rosarum $\bar{3}$ j.

M. S. Augewasser.

Anwend. Gegen schwammige Auswüchse der Augenlider.

van Wy.

42. *Ry.* Acidi muriatici gutt. xx
 Mucilag. gumm. mimos. $\bar{3}$ j
 Aquae rosarum $\bar{3}$ ij.

M. S. Mittelst eines Augenwännchens das Auge zu baden.

Anwend. Zur Auflösung von Eisensplintern, welche ins Auge ge-
 drungen sind und entweder zu klein sind oder zu tief lie-
 gen, um mit Instrumenten oder dem Magnete entfernt werden
 zu können. Innerhalb 10.—15 Minuten sollen sie aufgelöst
 werden.

Krimer.

43. *Rx.* Acidi muriat. diluti $\mathfrak{z}\text{j} - \text{ij}$
Mellis rosati $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Zum Bepinseln des Mundes.

Anwend. Gegen Schwämmchen.

Vogt.

44. *Rx.* Acidi muriat. puri $\mathfrak{z}\text{ij}$
Syrupi mororum $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Bis zur angenehmen Säure in Salbeiaufguss zum Mund- und Gurgelwasser.

Anwend. Gegen Merkurialspeichelfluss.

Kopp.

45. *Rx.* Herbae salviae
„ scordii $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$.

Inf. aquae ferv. q. s. ad col. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Adde

Acidi muriatici puri $\mathfrak{z}\text{j}\beta$

Syrupi mororum $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen brandige Bräune beim Scharlach.

Wendt

46. *Rx.* Acidi muriatici
„ nitrici $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$
Olei lini $\mathfrak{z}\text{iv}$.

M. f. linimentum *S.* Zum Einreiben.

Anwend. Gegen skorbutische Flecke.

Gieckler.

47. *Rx.* Acidi muriatici
Unguent. althaeae $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$
„ juniperi $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. f. ungt. *S.* Täglich 2mal einzurciben.

Anwend. Gegen Grind.

Plenk.

48. *Rx.* Acidi muriat. ℥iv .

S. Zum Fussbad in einem hölzernen Gefässe.

Anwend. Gegen Anschwellung der Leber und Milz. Man kann die Flüssigkeit einige Mal benutzen.

Scott.

Acidum nitricum. Salpetersäure.

(*Spiritus nitri acidus.* Stickstoff-, Azot-Säure.)

Form u. Gabe. Nur mit Wasser oder einem schicklichen Zusatze vermischt zum innerlichen Gebrauche zu $\text{℥j} - \text{℥j}$ täglich. Aeusserlich wie die Salzsäure.

Man vermeide Verbindungen mit Salzen, und vegetabilischen und animalischen Stoffen, welche oxydirt werden.

Man unterscheidet zwei Arten der Salpetersäure:

a) *Acidum nitricum dilutum.*

49. *Rx.* Acidi nitrici diluti $\text{℥j} - \text{℥j}$
Aquae rubi idaei $\text{℥vj} - \text{viij}$
Syrupi rubi idaei ℥j .

M. S. Alle Stunden einen (nicht metallenen) Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In der honigartigen Harnruhr.

Rob. Evernest.

50. *Rx.* Acidi nitrici puri ℥j
Aquae destillatae ℥ij .

M. S. Zwei bis drei Gläser des Morgens zu trinken.

Anwend. Bei Haut- und syphilitischen Krankheiten.

Alyon. Zeller. Scott.

51. *Rx.* Acidi nitrici dep. ℥β
Aquae fontanae mens. β
Sacchari albi ℥iij .

M. S. Mit beliebiger Menge Geilnauer oder Selterserwasser zu trinken.

Anwend. Gegen Quecksilberspeichelfluss, in Verbindung mit Schwefel.

Wedekind.

52. *Rx.* Decocti hordei ℥j
Acidi nitrici dil. ℥j.

M. S. Täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Färbung der Haut von salpetersaurem Silber. Zugleich wäscht man sich 2—3mal damit.

Ure.

53. *Rx.* Acidi nitrici diluti
Aquae cinnamomi vinos. āā ℥β.

M. S. Täglich 1—2mal mittelst eines Federbartes aufzustreichen.

Anwend. Gegen torpide Frostbeulen.

R u s t.

54. *Rx.* Acidi nitrici ℥jβ
„ muriatic. ℥β.

M. S. Zu einem Bade.

Anwend. Gegen Leberkrankheiten, eingewurzelte Syphilis. Eine halbe bis eine ganze Stunde lang zu baden, einen Tag um den andern.

S c o t t.

55. *Rx.* Acidi nitrici diluti
„ muriatici āā ℥β
Aquae fontanae ℥xxij.

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen nicht entzündliche Anschwellung der Milz nach vorgängigen Abführungen.

Annesley.

56. *Rx.* Acidi nitrici diluti ℥ij
Mellis rosati
Syrup. moror. āā ℥j.

M. S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen hartnäckige syphilitische Mundgeschwüre.

Oppert.

57. *Ry.* Acidi nitrici diluti $\overline{3}\beta - j$
 Aquae rosar. $\overline{3}vj$
 Tinct. thebaicae $\overline{3}j$.

M. S. Charpie damit befeuchtet auf die Geschwüre gelegt.

Anwend. Gegen syphilitische Geschwüre.

Oppert.

58. *Ry.* Acidi nitrici $\overline{3}j$
 Axung. porc. $\overline{3}j$.

M. f. leni calore unguent. D. S. Zum Verbande.

Anwend. Zum Verbande syphilitischer Geschwüre, des Kopfgrindes, von Flechten und Krätze.

Alyon.

b) Acidum nitricum concentratum, Spiritus nitri fumans; concentrirte, rauchende Salpetersäure.

59. *Ry.* Acidi nitrici fumant. $\overline{3}\beta$
 Syrupi sacchari $\overline{3}j$
 Decocti avenae $\mathfrak{8}j$.

M. S. Aller 1 — 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen syphilitische Halsgeschwüre schlimmer Art.

Fricke.

60. *Ry.* Acidi nitrici fumant. $\overline{3}j$
 Mixtur. camphoratae $\overline{3}viij$
 Tinct. opü gutt. xj.

M. S. Auf viermal alle 3 — 4 Stunden zu nehmen.

Anwend. Bei Ruhr, Durchfall, Cholera.

H o p e.

Acidum phosphoricum ex ossibus, Phosphorsäure aus Knochen.

(*Acidum phosph. depuratum, siccum, vitrificatum, Liquor acidus phosphoricus ex ossibus; trockene, verglaste Phosphorsäure.**)

Form u. Gabe. In Mixturen, Pillen, Bissen zu 10 — 30 Tropfen, täglich einigemal, innerlich; äusserlich zu Mund-, Zahn-Wässern, Einspritzungen, Verbandwässern und Salben.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Erden, kohlensauren Salzen, Borax, Tart. ammoniat., boraxat., natronat., Kali tart., Kali, Natron, Ammon., Plumbum acet., Liq. ammon. succin, Hydrargyr. oxydul. nitric. acetic.

61. *Ry.* Acidi phosphori pur. ʒj
Aquae destillatae ʒj
Syrupi cerasor. ʒij.

M. S. Alle Viertelstunden 10 — 20 Tropfen in Wasser zu nehmen.

Anwend. Gegen secundäre Syphilis, Rhachitis, nächtliche Knochenschmerzen u. s. w.

Hufeland.

62. *Ry.* Acidi phosphori pur. ʒij
Syrup. rubi idaei ʒij.

M. S. Aller 2 Stunden einen Theelöffel.

Anwend. In Fällen, wie das vorige.

63. *Ry.* Acidi phosphor. puri ʒj
Tinct. cinnamomi ʒij.

M. S. Stündlich 30 Tropfen in Wasser zu nehmen.

Anwend. Gegen atonische Mutterblutflüsse.

Burdach

*) *Acidum phosphoricum purum; reine Phosphorsäure.*

Die aus Knochen bereitete Phosphorsäure enthält stets mehr oder weniger schwefelsaures und saures phosphorsaures Calciumoxyd, und eignet sich desshalb nicht zur innerlichen Anwendung.

64. *Ry.* Acidi phosphorici sicci
Asae foetidae
Pulv. radic. althaeae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij.

M. f. c. aq. dest. pil. gr. ij. Consp. lycop. D. in vitro. S. Täglich 3mal 6 — 10 Stück.

Anwend. Gegen Caries.

Rust.

65. *Ry.* Acidi phosphor. sicci
Pulv. cort. peruv. fusci
Extr. cascarill. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j
Conch. praepar. gr. xv
Ferri pulverat. gr. XLV.

M. f. c. paux. mucil. g. mimos. pil. CLX. Consp. cinnam. D. in vitro S. Täglich 3mal 10 Stück.

Anwend. Gegen Schwäche von Samenverschwendung. Milchspeisen dabei zu vermeiden und jeden dritten Tag aussetzen, um zu starke Reizung der Brustorgane zu verhüten.

Wurzer.

66. *Ry.* Rad. Calami arom.
Fol. Sabinæ $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ iß
Aquae bullient. q. s.
Colat. $\mathfrak{L}$ ij adde
Acidi phosphorici diluti $\bar{3}$ ij
Syrupi cort. aurant. $\bar{3}$ ij.

M. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Beinfrass.

Augustin.

67. *Ry.* Acidi phosphor. sicci $\bar{3}$ ß
Pulv. carb. tiliae alcohol.
,, rad. calami arom. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ß
Myrrhae
Olei bergamott.
,, caryophyll. $\bar{a}\bar{a}$ gutt. iv.

M. exact. f. pulv. tenuis. D. S. Zahnpulver.

Siemerling.

68. *Ry.* Herb. rutae
 „ scordii
 Cort. salic. āā 3β.
 F. decoct. col. 3vj.
 Adde
 Acidi phosphor. diluti
 „ pyro-lignosi āā 3vj

M. S. Zum Einspritzen in die Kanäle von Knochengeschwüren.

V o g t.

69. *Ry.* Acidi phosphorici 3j
 Decoct. chamomill. 3viij.

M. S. Zum Einspritzen bei Fisteln und gegen Knochenfrass.

Augustin

70. *Ry.* Acidi phosphorici 3j
 Adip. suilli 3j.

M. f. unguent. D. S. Bei gichtischen Gelenkschmerzen und Knochengeschwülsten Rhachitischer einzureiben.

Swediaur.

Acidum pyro - lignosum crudum s. ligneum. Rohe, brenzliche
 Holzsäure (Holzessig).

Form u. Gabe. Selten innerlich zu 10 — 20 Tropfen; äusserlich pur oder verdünnt zu Einspritzungen, Waschungen, Umschlägen.

Man vermeide Verbindungen mit Salzen, namentlich Metallsalzen, concentrirten Säuren und Licht.

71. *Ry.* Acidi pyro-lignosi crudi

Spirit. sulph. aeth.

Olei terebinth. rectif. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}$ j.

M. D. in vitro charta nigra involuto.

S. Abends vor Schlafengehen 2 Tropfen in den Gehörgang zu tröpfeln.

Anwend. Bei Taubheit aus Mangel an Ohrenschmalz. Dazu giebt man innerlich jedesmal eine Dosis von Vinum Colchici.

Buchanan.

72. *Ry.* Acidi pyro-lignosi crudi $\mathfrak{z}\beta$

Aquae destill. $\mathfrak{z}$ vj.

M. S. Augewasser.

Anwend. Bei chronischer Entzündung der Augenlidränder.

Pharmacop. med. chir.

73. *Ry.* Acidi pyro-lignosi crudi $\mathfrak{z}\beta$

Mellis rosati $\mathfrak{z}$ j.

M. S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen Wasserkrebs.

H e i m.

74. *Ry.* Farinae sem. lini $\mathfrak{z}$ j

Furfurum $\mathfrak{z}\beta$

Acidi pyro-lignosi crudi q. s. ut f. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Bei scrophulösen Geschwüren und leprösen Hautleiden.

75. *Ry.* Acidi pyro-lignosi crudi

Carbon. tiliae alcol. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}$ j

Tinct. cinnamomi $\mathfrak{z}$ ij

Mellis rosati $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Zum Bepinseln des Zahnfleisches.

Anwend. Gegen atonische, übelriechende Geschwüre.

76. *Rx.* Acidi pyro-lignosi crudi $\mathfrak{z}\text{j}$
 Ammon. carbonic. q. s. ad saturationem.

M. S. Zum Bepinseln.

Anwend. Gegen syphilitische und gonorrhoeische Excrescenzen und Warzen.

E. Wilkinson.

Acidum pyro-lignosum rectificatum. Gereinigte, rectificirte Holzsäure.

Form u. Gabe. Innerlich zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\beta$ täglich in einem wässerigen Vehikel, versüsst. Aeusserlich selten.

77. *Rx.* Acidi pyro-lignosi rectific. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Aquae flor. aurant. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Syrup. amygdal. $\mathfrak{z}\text{j}$.
M. D. in vitro charta nigra invol.

S. Stündlich einen grossen Theelöffel.

Anwend. Gegen gallertartige Erweichung des Magens und Darmkanals bei einem halbjährigen Kinde. Das Nahrungsmittel war versüsster Gerstenschleim, das Getränk Zuckerwasser und Fenchelthee.

Pitschaft.

78. *Rx.* Acidi pyro-lignosi rectific. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Tinct. calami $\mathfrak{z}\text{ijj}$
 Aquae menth. crisp. $\mathfrak{z}\text{iv}$
 Syrupi simpl. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
M. D. in vitro charta nigra invol.

S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Bei Magenerweichung.

Pitschaft.

79. *Ry.* Acidi pyro-lignosi rectific. $\mathfrak{z}\beta$
 Aquae destill. $\mathfrak{z}\nu$
 Syrup. moror. $\mathfrak{z}j$.

M. S. Mund- und Gurgelwasser.

Anwend. Gegen brandige Bräune im Scharlach.

Barth.

80. *Ry.* Extr. myrrhae pulv. $\mathfrak{z}j$
 Ol. cass. cinnam. gutt. ij
 Balsam. peruvian. gutt. iv
 Acidi pyro-lignosi rectific. $\mathfrak{z}ij$
 Carbonis tiliae alcohol. q. s. ut f. electuarius.

D. S. Täglich einigemal auf das Zahnfleisch mit den Fingern anzuwenden.

Acidum succinicum crudum. Rohe Bernsteinsäure.

(Sal Succini volatile, Sal Carabe; flüchtiges Bernsteinsalz, Agtstein-, Carabe-Salz.)

Acidum succinicum depuratum. Gereinigte Bernsteinsäure.

(Sal Succini depuratum.)

Form u. Gabe. In Pulver- oder Pillenform, in wässeriger oder weiniger Auflösung, zu 5—15 Gran, täglich einigemal, innerlich; äusserlich selten, in Salben.

Man vermeide Verbindungen mit starken Säuren, Alkalien Eisensalzen, Erden, kohlensauren Salzen.

81. *Ry.* Acidi succinici dep 3j — 3ij.

Solve in

Aq. cinnamom. simpl. 3vj

Syrup. cinnamom. 3ß.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen halben bis einen ganzen Esslöffel.

Anwend. Bei allgemeiner Nervenschwäche, Lähmung, Apoplexie.

Luxmore.

82. *Ry.* Acidi succinici dep. gr. v

Moschi gr. viij

Sacchari albi 3ß.

M. f. pulv. D. in chart. cerat. tal. dos. iv.

S. Aller 3 Stunden ein Stück zu geben.

Anwend. Beim kalten Brand.

Lentin.

83. *Ry.* Acidi succinici 3ß

Castorei 3j

Extr. valerian. q. s. ut. f. pil. No. xx.

D. S. Früh und Abends 3 Stück.

Anwend. Bei krampfhaften Mutterbeschwerden.

Sydenham.

Acidum sulphuricum depuratum. Gereinigte Schwefelsäure.

(*Acidum s. Oleum vitrioli rectificatum s. purissimum, gereinigtes Vitriolöl.*)

Form u. Gabe. Innerlich mit Wasser oder Saft verdünnt, zu 2—6 Tropfen, täglich mehrmals. Aeusser-

lich pur als Aetzmittel, verdünnt zu Augen-, Gurgel-, Mundwässern, Salben und Bädern.

Man vermeide Basen, die meisten Salze, Metalle, Seifen und Schwefellebern.

84. *Ry.* Acidi sulphur. dep. ʒj
 Aquae destill. ʒxx
 Oxymell. simpl. ʒiv.
M. S. Alle Stunden eine Tasse voll.
Anwend. In fauligen Fiebern.

Selle

85. *Ry.* Acidi sulphur. dep. ʒj.
 Aquae destill. ℥iij
 Alcoh. ʒij
 Essent. citri gutt. xv — xx.
M. S. Täglich 3mal ein Glas von 5 Unzen voll zu nehmen.
Anwend. Gegen Bleikolik.

Gendrin.

86. *Ry.* Acidi sulphur. dep. ʒj
 Aquae destill. ℥ij
 Vini alb. ℥j.
M. S. Wie das Vorige.
Anwend. Gegen Bleikolik.

Gendrin.

87. *Ry.* Terebinth. venet. ʒiij
 Acidi sulphur. dep. ʒv.
M. in vitro aperto et adde success.
 Spirit. vini rectificatiss. ʒiij.
M. S. Alle Stunden 15 — 30 Tropfen zu nehmen.
Anwend. Gegen Blutflüsse mit dem Charakter der Paralyse.

Hecker.

88. Rx. Acidi sulphur. depur. 3j
Croc pulv. gr. viij
M. f. pasta. D. in vitro bene clauso.

S. Mittelst eines Hölzchens den kranken Theil damit zu betupfen.

Anwend. Bei Entropium auf die äussere Augenlidplatte, bei hartnäckigen Wucherungen der Conjunctiva palpebrarum, bei fungösen Geschwüren, Warzen u. s. w.

Helling. Rust.

89. Rx. Acidi sulphur. depur. 3ß—j
Axung. porc. 3ij.
M. exact. f. unguent.

D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Auftreibung der Gelenke von einem verdickten Zustande des Zellgewebes.

Colbatch u. Smith.

90. Rx. Acidi sulphur. dep. 3j
Olei terebinth. 3ij
Olei olivar. 3ij

M. l. a. D. S. Umgeschüttelt einzureiben.

Anwend. Zur Erzeugung eines künstlichen Exanthems.

Pearson.

Acidum sulphuricum dilutum. Verdünnte Schwefelsäure.

(Spiritus Vitrioli, Acid. Vitr. tenue, Spirit. Sulphuris, Vitriolgeist.)

Form u. Gabe. Wie das vorhergehende Mittel, jedoch zu 6—30 Tropfen täglich einigemal.

91. *Rx.* Acidi sulphur. dil. $\bar{3}$ ij
 Syrup. cerasor. $\bar{3}$ ij
 Aquae rubi idaei $\bar{3}$ v.

M. S. Zweistündlich 1 Esslöffel in Haferschleim.

Anwend. Gegen Bluthusten.

T o d e.

92. *Rx.* Acidi sulphur. dil. $\bar{3}$ ijj
 Tinct. opii simpl. $\bar{3}$ j
 Syr. violar. $\bar{3}$ ijj.

M. D. S. Täglich 2mal $\frac{1}{2}$ Esslöffel in Haferschleim besonders Abends zu nehmen.

Anwend. Gegen hektische Schweisse.

G. A. Richter.

93. *Rx.* Acidi sulph. dil. gutt. xx
 Mellis rosar. $\bar{3}$ ij
 Decoct. hordei $\bar{3}$ vj.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Bei Angina gangraenosa mit Hautabschuppung, oder wo es erforderlich ist die Ulcerationen aufzureizen.

Hôtel Dieu.

94. *Rx.* Acidi sulphur. dil.
 Spirit. cochlear. $\bar{a}\bar{a}$ gutt. xxx
 Mellis rosar. $\bar{3}$ j
 Decoct. hordei $\&$ ij.

M. D. S. Mundwasser.

Anwend. Bei Ulcerationen in der Mundhöhle.

J. Hosp.

Elixir acidum Halleri. Haller's Sauer.

(*Mixtura sulphurico-acida nach der preuss. Pharmac.; nach der sächs. dagegen sind in dem Haller'schen Elixir gleiche Theile Schwefelsäure und Alcohol, in der Mixt. sulph. ac. dagegen 1 Theil Schwefelsäure auf 4 Theile Alcohol, also beinahe wie Aq. Rabelii.*)

Form dieselbe, Gabe zu 5—20 Tropfen, täglich mehrmals.

95. Rx. Elix. acidi Hall.

Syrup. rubi idaei $\overline{\text{aa}}$ $\overline{\text{3j}}$.

M. S. Einen Theelöffel voll in ein Pfund Wasser.
(Täglich zu verbrauchen.)

Anwend. Bei Faulfieber, Petechien.

J a h n.

96. Rx. Elix. acidi Hall. $\overline{\text{3j}}$

Tinct. opii croc. $\overline{\text{3j}}$

„ cinnamom. $\overline{\text{3ij}}$.

M. D. S. Stündlich 20 Tropfen zu nehmen in versüßtem Haferschleim.

Anwend. Gegen starke Metrorrhagie.

G. A. Richter.

97. Rx. Elix. acidi Hall. $\overline{\text{3ß}}$

Decoct. salep $\overline{\text{3v}}$

Syr. rubi idaei $\overline{\text{3j-iß}}$.

M. S. Alle halbe Stunden $\frac{1}{2}$ Esslöffel voll während des Anfalls zu nehmen.

Anwend. Gegen Pyrosis.

S e i l e r.

98. *Ry.* Elix. acidi Hall. $\text{℥}\beta$
 Decoct. salep $\text{℥}\text{vj}$
 Syr. rubi idaei $\text{℥}\text{j}$.

M. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Bei durch krankhafte Reizbarkeit bedingtem Nach-
 tripper.

Wendt.

99. *Ry.* Elix. acidi Hall. $\text{℥}\text{j}-\text{ij}$
 Spirit. nitri dulc. $\text{℥}\text{iv}$
 Aquae rosar. $\text{℥}\text{iv}$
 Syrup. rosar. $\text{℥}\beta$.

M. S. Alle halben Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen nicht entzündliche Wechselfieber.
 (Eine unchemische Mischung.)

Hildebrandt. Jahn.

Elixir Vitrioli Mynsichti. Mynsicht's
 saures Elixir.

*(Tinctura aromatico-acida, saure Gewürztink-
 tur nach der preuss. Pharm.)*

Form u. Gabe. In Tropfen und Mischungen zu
 30—50 Tropfen, mehrmals täglich.

100. *Ry.* Elix. vitriol. Myns. $\text{℥}\text{j}$
 Tinctur. opii simpl. gutt. xx
 Aquae cinnamom. $\text{℥}\text{is}$.

M. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Doemling.

Aqua vulneraria Thedenii. Theden's
Schuss- oder Wundwasser.

(Mixtura vulneraria acida).

Form u. Gabe. *Aeusserlich mit Wasser verdünnt, Charpie oder Leinwand damit getränkt.*

Acidum tartaricum. Weinsteinsäure.

(Sal essentielle tartari, wesentliches Weinsteinsalz).

Form u. Gabe. *In Pulver, Tropfen, Lösung, Saft, Plätzchen. zu 5—10 Gr., öfters täglich.*

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Erden, Metalloxyden, Seifen, Schwefellebern u. s. w.

101. **Ry.** Acidi tartarici ʒij
Elaeosacch. citri ʒiij.
M. f. pulvis.

D. S. *Limonadenpulver, mit Wasser bis zur angenehmen Säure gemischt.*

Anwend. In Fiebern und gegen Erhitzung im Sommer.

Behrends.

102. **Ry.** Acidi tartarici ʒj-ij
Elaeosacch. millefol. ʒj.
M. f. pulv. Div. in vj part.

S. *Täglich 3—4 mal ein Pulver.*

Anwend. Gegen zu heftigen Hämorrhoidalfluss.

Selle.

103. *Ry.* Sacchari lactis $\mathfrak{Z}\text{vj}$
 Kali nitrici l. sulphurici $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Acidi tartarici $\mathfrak{Z}\beta$
 Pulv. rad. ipecac. gr. ijj .
 M. f. pulvis.

S. Täglich 2—3 mal eine Messerspitze voll bis einen Kaffeelöffel.

Anwend. Gegen Blutflüsse, Kopf-, Ohren-Weh, Verstopfung, Gelbsucht u. s. w.

Vogler.

104. *Ry.* Acidi tartarici $\mathfrak{Z}\text{ij}$.
 Solve in
 Aquae destill. $\mathfrak{Z}\text{j}$.
 Adde
 Syrupi papav. rhoead. $\mathfrak{Z}\text{ijj}$.

M. D. S. Unter das Getränk zu mischen.

Anwend. Wie das vorige.

Beil.

105. *Ry.* Acid. tartarici $\mathfrak{Z}\text{j}$.
 Solve in
 Aquae rubi idaei $\mathfrak{Z}\text{v}$.
 Adde
 Syrupi rubi idaei $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. D. S. Umgeschüttelt aller 2 Stunden einen Esslöffel voll.

106. *Ry.* Sacchari albi $\mathfrak{Z}\text{iv}$.
 Coque cum aq. font. q. s. ad consist. tabul. dein
 adde
 Acidi tartarici pulv. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Olei cort. citri gutt. xij .
 F. morsuli xxij . D. in scatula.

S. Zuweilen $\frac{1}{2}$ —1 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Durst oder Erhitzung.

Phöbus.

Aconitum. Eisenhut, Sturmhut.*(Aconitum Napellus, A. variabile Hayne.)*

Form u. Gabe. Die Blätter, selten die Wurzel, in Pulver, Bissen, Pillen, Plätzchen zu gr. i—v einigemal täglich; das Extrakt zu gr. β—v; geistige oder ätherische Tinktur zu 10—30 Tropfen; Essenz zu 10—20 Tropfen täglich mehrmals.

Man vermeide besonders Metallsalze und Gerbestoff.

107. **Rx.** Herbae aconiti gr. viij
Sulph. praecip. ʒij
Cremor. tartari ʒβ
Sacchari albi ʒij.

M. f. pulvis.

D. S. Aller 2 Stunden einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Hüft- und Lendenweh, wo es zugleich um Oeffnung zu thun ist.

Jahn.

108. **Rx.** Extr. aconiti
Sulph. stibiati aurantiaci
Calomel. āā gr. ij
Pulv. stipit. dulcamarae
Sacchari albi āā ʒj.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. No. viij.

S. Morgens und Abends ein Pulver.

Anwend. Gegen chronische Gicht.

G. A. Richter.

109. **Rx.** Extr. aconiti ʒβ-j
Vini stibiati ʒj.

M. D. S. Täglich 3mal 15—25 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Gegen chronischen Rheumatismus.

G. A. Richter.

110. *Ry.* Extr. aconiti $\mathfrak{z}\beta$ - $\mathfrak{3}\beta$
 Vini sem. colchici $\mathfrak{3}\beta$.

M. S. Täglich 4 mal 15—20 Tropfen.

Anwend. Bei acutem und chronischem Rheumatismus.

Weber.

111. *Ry.* Extr. aconiti gr. vj-xij.

Solve in

Infus. valerianae (ex $\mathfrak{3}\beta$ par.) $\mathfrak{3}\text{vj}$.

Adde

Liq. ammon. acet. $\mathfrak{3}\text{j}$

Syrupi croci $\mathfrak{3}\beta$.

M. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei nervöser Gicht.

G. A. Richter.

112. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. vij.

Solve in

Spirit. vini rectific. q. s.

Extr. aconiti $\mathfrak{z}\text{vij}$

Opii pulv. gr. vij

Pulv. rad. althaeae q. s. ut f. pil. No. LXXXIV.

Consp. pulv. alth.

S. Aller 2 Stunden 2 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen gichtische Schmerzen mit syphilitischer Grundlage. Dabei jeden Abend ein Absud von $\mathfrak{3}\text{j}$ Sarsaparille, schmale Diät und Meidung der freien Luft.

Kopp.

113. *Ry.* Extr. aconiti spir. $\mathfrak{z}\text{j}$

Rad. liquirit. pulv. $\mathfrak{3}\text{j}$

Roob sambuci q. s.

M. f. pil. No. LX. Consperg. lycop.

S. Aller 2 Stunden eine Pille.

Anwend. Gegen hitzigen Rheumatismus der Gelenke. Man steigt nach und nach auf 6—9 Pillen p. d.

Lombard.

114. *Ry.* Extr. aconiti gr. vj
 Pulv. Doveri gr. xij.
 M. f. c. melle despum. boli vj.

S. Aller 2 Stunden 1 Stück.

Anwend. Gegen nächtliche Knochenschmerzen.

Brera.

115. *Ry.* Extr. aconiti
 Sulph. antim. aurati āā 3β
 Asae foetidae 3j
 Extr. taraxaci q. s. ut f. pil. gr. ij. Con-
 sparg. lycop.

S. Täglich 3 mal 3 Pillen.

Anwend. Gegen rheumatische Gelenkschmerzen.

v. Hildenbrand.

116. *Ry.* Extr. aconiti 3j
 Resin. guajaci nat. 3iij
 Stibii sulph. nigr. laevig. 3vj
 Mucilag. gummi tragacanth. q. s. ut f. rotulae
 No. xx.

D. S. Viermal täglich ein Stück.

Anwend. Gegen Drüsengeschwülste und Kropf.

Weickard.

117. *Ry.* Extr. aconiti 3j
 „ dulcamarae
 „ fl. arnicae
 Resin. guajaci nat. pulv. āā 3ij
 Sulph. stibiat. aurant.
 Calomel. āā 3β
 M. f. pil. gr. ij. Consperg. pulv. rad. calam.

D. S. Täglich 3 mal 5—8 Stück.

Anwend. Gegen atonische Gicht.

Rust.

118. R_y. Tinct. aconiti aether. $\bar{z}\beta$.

D. S. Täglich 4mal 50 Tropfen.

Anwend. Gegen Gesichtsschmerz.

Hufeland.

119. R_y. Tinct. aconiti aeth.

„ caryophyll. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}j$

„ guajac. ammoniat. $\bar{z}iij$.

M. S. Morgens und Abends 15—30 Tropfen.

Anwend. Bei sehr schmerzender und nervöser Gicht.

Stark.

120. R_y. Extr. aconiti $\bar{z}\beta$.

Solve in

Aquae fl. chamomill. $\bar{z}iij$.

D. S. Lauwarm über's Auge zu schlagen.

Anwend. Gegen arthritische Augenentzündung.

Löffler.

Aconitinum. Aconitin.

Form u. Gabe. In Auflösung und Pillen zu gr.
 $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{10}$ aller 3 Stunden. — Salbe.

121. R_y. Aconitini gr. j

Pulv. rad. liquirit. gr. xvj

Syrupi comm. q. s. ut f. pil. No. xvj. Consp.
lycop.

D. S. Aller 3 Stunden 1 Stück.

Anwend. Gegen Rheumatismus, Gicht, Iritis und Amaurose.

Turnbull.

122. *Rx.* Aconitini gr. xvij
Olei olivar. $\mathfrak{3}\beta$
Axung. porc. $\mathfrak{3}j$.
M. f. linimentum.
S. 2—3 mal täglich in die schmerzhaften Stellen
einzureiben.
Anwend. Gegen heftige Neuralgien.

Turnbull.

123. *Rx.* Aconitini gr. ix
Alcohol rectific. $\mathfrak{3}ij$.
M. S. Zum Einreiben.
Anwend. In gleichen Fällen.

Turnbull.

Aether muriaticus. Salzäther.

(*Naphtha muriatica; Salznaphtha.*)

Form u. Gabe. In Tropfen auf Zucker oder in
Mixturen, Säften u. s. w., zu 2—20 Tropfen täglich
mehrmals.

124. *Rx.* Aquae menthae pip. $\mathfrak{3}ij$
Aether. muriat. $\mathfrak{3}\beta$
Syrup. cort. aurantior. $\mathfrak{3}j$.
M. S. Esslöffelweise zu nehmen.
Anwend. Gegen Sinken der Reaction des Körpers.

Brera.

125. *Rx.* Extr. myrrhae
Aether. muriat. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3}ij$
Mellis rosati $\mathfrak{3}ij$.
M. f. electuarium.
Anwend. Um das Zahnfleisch zu stärken.

Aether nitricus. Salpeteräther.

Form u. Gabe. Innerlich in einem passenden Vehikel zu 10—30 Tropfen. Aeusserlich als Zusatz zu Gurgelwässern, Einreibungen u. s. w.

126. Rx. Aether. nitrici ℥j
Decoct. hordei ℥xxiv
Syrup. citri ℥ij.

M. S. In kleinen Tassen zu nehmen.

D. Hosp.

127. Rx. Infus. radic. (℥j) colomb. ℥vj
Aquae cinnam. ℥j
Tinct. absinth. ℥ij
Aether. nitrici ℥j
Elix. stomach. Whytt. ℥ij
Extr. chamomill. ℥j.

M. D. in vase clauso.

S. Löffelweise zu nehmen.

Anwend. Bei Trägheit der ersten Wege, Gastrodynie, Krampfkolik und heftigen Durchfällen in der Genesungsperiode.

Brera.

128. Rx. Aether. nitrici ℥β
Decoct. althaeae ℥ij
Syrup. althaeae ℥j.

M. S. Zum Gurgeln.

D. Hosp.

Aether phosphoratus. Gephosphorter Aether.

(*Aether sulphuricus phosphoratus.*)

Form u. Gabe. Innerlich in einem schleimigen Vehikel zu 8—20 Tropfen alle 2 Stunden.

129. *Ry.* Aether. phosphorati 3j
 Olei animal aeth. ʒj
 M. D. in vitro charta nigra invol.
*S. Aller 2 Stunden 10—20 Tropfen in starkem
 Haferschleime zu nehmen.*

Phöbus.

130. *Ry.* Aether. phosphor. ʒij
 Olei cantharid. infus. gutt. viij
 Olei cajeputi 3ß
 M. D. in vitro chart nigr. invol.
*S. Viermal täglich 10—12 Tropfen in starkem
 Haferschleim.*

Anwend. Bei Lähmungen torpider Subjekte.

Phöbus.**Aether sulphuricus.** Schwefeläther.

(*Naphtha s. Aether Vitrioli, Oleum Vitrioli
 dulce, Liquor aethereus Vitrioli; Vitriolnaphtha.*)

Form u. Gabe. In Tropfen und Mixturen, auf Zucker zu 10—20 und mehr Tropfen alle 2 Stunden innerlich; äusserlich als Riech- und Reizmittel, zu Einreibungen, zum Auftröpfeln, Einathmen, Einspritzen, Verdunsten und zu Klystieren.

Man vermeide coucentr. Salpeter- und Schwefelsäure, kaustische Alkalien und Chlor.

131. *Ry.* Aether. sulphur. 3j
 Aquae cinnamomi vin. ʒiij.
M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Als kräftiges Erregungs- und Schweissmittel.

Radius.

132. *Rx.* Aether sulphur. $\bar{3}j$
 Extr. chinae fusc. frigid. par. $\bar{3}ij$
 Aquae fl. aurantior. $\bar{3}x$

M. l. a. D. S. Theelöffelweise.

Anwend. Als Analepticum.

Berends.

133. *Rx.* Aether. sulphur. $\bar{3}j$
 Moschi gr. $\bar{ij}$.

M. S. Auf einmal in warmem Wasser.

Anwend. Gegen reine Krampf- oder Nervenkolik, auch solche, die von wandernder Gicht herrührt.

Jahn.

134. *Rx.* Aether. sulphur.
 Liq. ammon. carbon. pyr - oleos. $\bar{aa} \bar{3}j$
 Aquae menthae $\bar{3}vj$
 Tinct. opii crocat. $\bar{3}j$.

M. D. S. Jede Stunde $\frac{1}{2}$ Unze zu nehmen.

Anwend. Als Stärkungsmittel nach überstandenen Delirium ebriositatis.

J. Frank.

135. *Rx.* Flor. arnicae mont. $\bar{3}ij$.
 Infunde aquae font. s. q. ferv.
 Col. $\bar{3}vj$ adde
 Aether. sulphuric. $\bar{3}ij$.

M. S. Esslöffelweise.

Anwend. Zur Beförderung der Transpiration bei Nervenkrankheiten.

Brera.

136. *Rx.* Aether. sulphur. $\bar{3}\beta$
 Olei terebinth. rectific. $\bar{3}ij$.

M. D. S. Jeden Morgen 1 Quentchen mit Molken, bis ein Pfund verbraucht worden. (Passender 15—30 Tropfen täglich einigemal in Zuckerwasser.)

Anwend. Gegen Gallensteine und davon herrührende Kolik.

Durande. Brera.

137. *Ry.* Aether. sulphur. 3ij
Olei ricini 3j.

M. S. Mehrmals täglich einen kleinen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Alibert.

- 138 *Ry.* Aether. sulphur. 3ij
Tinct. opii 3j.

M. S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Bei drohender Lungenlähmung und bei beginnendem Sticfluss, gegen nervöses Asthma. Man schüttelt einen Theelöffel voll in ein Porzellangefäss oder mischt sie auch mit heissem Wasser und lässt einathmen.

Ebers.

139. *Ry.* Camphorae ʒß
Olei caryophyll. gutt. vj
Aether. sulphuric. 3ij.

M. S. Damit befeuchtete Leinwand über die Augen zu legen.

Anwend. Zur Verhütung der Pockenbildung in den Augen, nicht allein in der Periode des Ausbruchs, sondern auch selbst im lymphatischen Stadium, wenn sich bereits rothe Pünktchen auf der Conjunctiva oder dunkle Stellen auf der Cornea zeigen.

Neumann.

140. *Ry.* Olei menthae ʒij
Liquor. ammon. caust. 3ij
Aether. sulphur. ʒj.

M. S. Einreibung in der Umgegend des Auges, und als Augendampfbad bei rein paralytischer Amblyopie und Amaurose.

v. Gräfe.

141. Rx. Aether. sulphuric.
Tinct. opii simpl. āā 3β
Olei caryophyll. 3j.

M. S. Einige Tropfen mit Baumwolle in den hohlen Zahn zu bringen.

Anwend. Bei Schmerzen cariöser Zähne, wenn kein entzündliches Leiden dabei ist.

Rust.

142. Rx. Aether. sulphur.
Tinct. opii simpl. āā 3iij.

M. S. Einen kleinen Theelöffel voll zuweilen in die Backe der leidenden Seite einzureiben.

Anwend. Wie das vorige.

Rust.

143. Rx. Olei anisi gutt. xv
Aether. sulphur. 3j.

M. D. S. Den Kamm damit zu befeuchten und die Haare öfters durchzukämmen.

Anwend. Bei Ungeziefer als — unterhaltender — Ursache von Kopfgrind.

Wenzel.

144. Rx. Aether. sulphuric. 3iij.

S. Aufzutropfen.

Anwend. Bei eingeklemmten Brüchen auf den Unterleib.

Agaricus muscarius. Fliegenpilz.

(Amanita muscaria. Fliegen-, Mückenschwamm.)

Form u. Gabe. In Pulverform zu gr. v—x täglich einigemal; Tinktur 10—20 Tropfen, mehrmals.

145. *Rx.* Agarici muscar. gr. v
 Sacch. albi ʒj.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. No. xij.
S. Anfangs 3, dann 4 Pulver in Wasser zu nehmen.
Anwend. — Gegen Lähmungen aller Art.

Schneider.

146. *Rx.* Agarici muscar. rec. mundat. et conc. ʒij.
 Infunde
 Spirit. vini ʒv.
 Digere leni calore per triduum, filtra cum ex-
 pressionem. Residuum iterum Spirit. vini rect.
 ʒiij immitte, post digestionem duorum dierum
 filtra et primae colaturae adde. Restent ʒvj.

**M. S. Tinctura agarici muscarii
 Schneideri.**

147. *Rx.* Tinct. agarici musc.
 „ aurantior. āā ʒj.
*M. S. Aller 2 Stunden 20 Tropfen in einem Ess-
 löffel Wasser zu nehmen.*
Anwend. Gegen Lähmungen.

Schneider.

148. *Rx.* Agarici muscar. sicci ʒij
 Amygdal. excortic. ʒiβ
 Sacch. albi ʒiij.
 Saccharo et agarico contusis commisce pulverem
 cum amygdalis et adde sufficientem syrupi amygd-
 alarum quantitatem.
S. Zweimal täglich 1—2 Kaffelöffel voll.
Anwend. Bei Epilepsie und Lähmung.

Swediaur.

Allium Cepa. Gemeine Zwiebel.

Form u. Gabe. Selten innerlich als ausgepresster
 Saft mit Zucker als Diureticum bei Wassersucht. Aeusser-
 lich zu Umschlägen, Salben, Klystieren.

149. *Ry.* Sapon. nigri $\bar{3}$ ijj
 Aquae fervid. $\bar{3}$ ij.
 Ebulliant, adde
 Cepar. cinere assatarum et bene contus. $\bar{3}$ ijj
 Farinae sinapeos $\bar{3}\beta$.
 Ebulliat massa denuo per breve temporis spatium saepius agitando.

S. Umschlag.

Anwend. Um syphilitische Drüsengeschwülste in Eiterung zu setzen. Man streicht den Umschlag 1 Zoll dick auf Leinwand, legt ihn unmittelbar auf die Geschwulst und bedeckt ihn mit einem heissen Breiumschlage.

Kernöl.

150. *Ry.* Cepar. assatar.
 Cerae flavae
 Picis $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij β
 Sapon. domestic. $\bar{3}$ vj
 Semin. foenu graeci $\bar{3}$ ijj
 Olei olivar. $\bar{3}$ j.
 M. f. l. a. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Karbunkeln.

Bücking.

151. *Ry.* Succu cepar. alb. express.
 Balsam. tranquill. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j
 „ peruviani $\bar{3}$ iv.

M. S. Täglich 2 — 3 mal einige Tropfen in den Gehörgang zu tröpfeln und damit getränkte Baumwolle einzulegen.

Anwend. Bei zufälliger und aus katarrhalischer Ursache entstandener Taubheit.

Allium sativum. Knoblauch, Zwiebel.

Form u. Gabe. Innerlich selten, in Substanz zu $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{ij}$ oder im Aufguss $\mathfrak{3j}$ zu $\mathfrak{8j}$ mit Milch oder Fleischbrühe, oder als Presssaft mit Zucker oder Molken. Aeusserlich als gelindes Epispasticum, zu Katalpasmen, zu Klystieren $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{iv}$ auf $\mathfrak{3iv}$ — $\mathfrak{3viiij}$ Milch- oder Wasser, und zu Umschlägen.

152. *Ry.* Allii sativ. bulbi $\mathfrak{3ij}$

Lactis tenuis $\mathfrak{3vj}$.

Leniter ebulliant.

Col. S. Zum Klystier.

Anwend. Gegen Madenwürmer.

153. *Ry.* Bulbos allii sativ. incis. No. 3 — 4

Spirit. vini gall. $\mathfrak{3xxvij}$.

Macera per xxxvj horas; liquori decantato adde

Decoct. rad. bardanae ($\mathfrak{3j}$) $\mathfrak{3viiij}$.

M. D. S. Haarmittel.

Anwend. Gegen das Ausfallen der Kopshaare, namentlich bei Damen vielfach erprobt. Man tränkt einen Schwamm damit, befeuchtet mit diesem jeden Abend das Haar und besonders die Kopfhaut, bedeckt den Kopf mit einem Tuche, einer Nachtmütze, salbt am Morgen das Haar ein wenig mit Klauenfett und kämmt es dann mit einem nicht zu engen Kamme.

Phöbus.

Aloe succotrina. Aloe.

(*Aloë lucida* von *Aloe spicata* Decand. oder nach Sprengel von *Aloe arborescens* Dec.).

Form u. Gabe. In Pillen, Pulver, Bissen zu gr. $\mathfrak{ß}$ — $\mathfrak{v}$, selten — $\mathfrak{x}$ einigemal täglich; wässeriges Ex-

trakt eben so; Tinktur zu 10—20 Tropfen. Aeusserlich als Einstreupulver, Augenpulver, Augensalbe, Augenwasser, Salbe und Klystier.

Man *vermeide* Verbindungen mit concentrirten Mineralsäuren, besonders Salpetersäure, kaustischen Alkalien, mehreren Metallsalzen.

154. **Ry.** Aloes lucidae 3ß
 Mass. pil. sapon. 3iijß
 M. f. pil. gr. jj. Consp. lycop.
S. Abends, oder Morgens und Abends 1—3 Stück.
Anwend. Um die Thätigkeit der Leber und des Darmes zu erhöhen, oder auch in vermehrter Dosis abzuführen.

Radius.

155. **Ry.** Aloes lucidae 3j—ij
 Sapon. med. 3j
 M. f. pil. gr. jj. Consp. lycop.
S. Täglich 2—3mal 1—2 Pillen.
Anwend. Gegen Unterdrückung der Gallenausscheidung, des Hämorrhoidal- und Menstrualflusses, trägen Stuhlgang.

Reil.

156. **Ry.** Extr. Aloes aquos.
 Sapon. jalap. āā 3j.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.
S. 1—6 Stück zu nehmen.
Anwend. Gewöhnliche Purgirpillen.

157. **Ry.** Extr. aloes acid. sulph. correct. 3j
 Castor. pulv.
 Gummi mimos. pulv. āā gr. v.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.
S. Morgens und Abends 1—2 Stück.
Anwend. Für Hypochondristen und Hysterische zum Abführen.

Heim.

158. **Ry.** Aloes lucid. pulv. ʒj
 Rad. rhei
 Sapon. med. āā ʒj
 Extr. taraxaci q. s.
 ut f. pil. No. Lx. Consp. pulv. rad. irid. flor.
S. Morgens und Abends 6—8 Stück.
Anwend. Um gelind abzuführen.

Phöbus.

159. **Ry.** Aloes succotr. ʒβ -j
 Ferri pulverat. ʒij
 Rad. rhei pulv. ʒj
 Mucil. gummi. tragac. q. s.
 ut f. pil. gr. iij. Consp. pulv. cinnam.
S. Täglich 2mal 2—3 Stück.
Anwend. Gegen Chlorose, Auftreibung und Stockung in den Unterleibseingeweiden, Amenorrhoe.

Radius.

160. **Ry.** Aloes lucid. pulv. ʒj
 Extr. panchymag. (rhei comp.) ʒβ
 Ferri pulv. gr. xv
 Mucil. gumm. mimos. q. s.
 ut f. pil. No. xx. Consp. pulv. cinnam.
D. S. Abends 1—3 Stück

Pilulae aperientes s. resolventes Stahl.

Anwend. Bei Leibesverstopfung.

161. **Ry.** Aloes lucidae
 Gummi ammoniac. āā ʒij
 Myrrhae elect. ʒj
 M. f. c. spir. vin. ten. q. s. pil. gr. jj. Consp. lycop.
S. Morgens und Abends 1—2 Stück zu nehmen.

Pilulae Ruffii.

Anwend. Zur Beförderung des Hämorrhoidal- und Menstrualflusses bei Torpor des Unterleibes.

162. *Ry.* Extr. aloes aquos.
Calomel.
Sapon. med. āā ʒj.
M. f. pil. gr. jj. Consp. lycop.
S. Abends 2—3 Stück,
Anwend. Als auflösend - abführendes Mittel.

Burdach.

163. *Ry.* Aloes
Sapon. venet. āā 3ß
Pulv. rad. rhei 3j
Calomel. gr. x - xx.
M. f. c. tinct. rhei pil. gr. ij.
Consp. lycop.
S. Einen Tag um den andern 5—10 Stück.
Anwend. Als Abführmittel bei tragem Stuhlgang.

Jahn.

164. *Ry.* Extr. aloes aquos.
Chinin. sulphur āā ʒss
M. f. pil. No. xx. Consp. ycop.
S. Vor dem Schlafengehen zuweilen eine Pille.
Anwend. Bei Trägheit und Lahmheit der dicken Gedärme und bei mangelnder Gallenabsonderung als leichtes und sicheres Eröffnungsmittel.

165. *Ry.* Aquae foeniculi 3vj
Extr. aloes aquos. gr. vj - x
Extr. taraxaci 3ij
Aquae amygd. amar. concentr. 3ß - j.
*M. S. Stündlich einen Esslöffel voll für Er-
wachsene.*

Anwend. Bei wahrer Gelbsucht. Dabei Zuckerwasser und schleimige Nahrungsmittel nebst vielem weich gesottenen Eigelb, zu geniessen.

Pitschaft.

166. *Rx.* Extr. aloes
 „ myrrhae āā 3j
 Crem. tartari 3β
 Aquae menth. pip. 3vj.
M. S. Morgens und Abends einen Löffel voll.
Anwend. Zur Hervorrufung des Hämorrhoidalflusses.

Augustin.

167. *Rx.* Aloes soccotrin. gr. vj
 Magnes. muriat. 3j.
 M. f. pulv. Div. in part. vj.
S. Nach Umständen 1—3 Pulver im Tage.
Anwend. Bei habitueller Verstopfung.

C. J. Meyer.

168. *Rx.* Aloes soccotr. 3j
 Ferri pulver. ʒij
 Sulphur. antim. aurat. 3β
 Calomel. ʒj
 Olei Sabinae gutt. xx
 Syrup. cort. aurant. q. s. ut f. pil. gr. iij.
 Consp. pulv. cinnam.
S. Täglich 2—5 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen Chlorose von Kopp sehr empfohlen.

Weickard.

169. *Rx.* Extr. aloes aquos. ʒj
 „ myrrhae
 „ croci āā 3j
 Ammon. muriat. ferrugin. ʒij
 Galbani 3iij
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cass. lign. pulv.
S. Früh und Abends 5 Stück.
Anwend. Gegen Amenorrhoe, doch mit vieler Vorsicht anzuwenden.

Clarus.

170. *Rx.* Pulv. aloes compos.
 Cort. aurantior $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$.
 Pulv. rad. rhei $\overline{3j}$
 Spirit. vini gall. $\overline{8ij}$.
 Macerentur per septem dies et destillentur.
S. Einen Theelöffel voll mit 2—3 Esslöffel voll
 Wasser gemischt Morgens und Abends zu
 nehmen.
Anwend. Gegen Dyspepsie und Flatulenz in der Gicht
 sehr gerühmt.

Graves.

171. *Rx.* Tinct. aloes
 „ castorei $\overline{aa3\beta}$
 „ cort. aurantior. $\overline{3j}$
M. D. S. Täglich 3mal 15 Tropfen.
Anwend. Bei chronischem Erbrechen.

Hufeland.

172. *Rx.* Aloes soccotr. gr. $\overline{vj}$
 Sacchari albi $\overline{3j}$.
 M. f. pulv. subtiliss.
S. In das Auge zu blasen.
Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Boerhaave.

173. *Rx.* Extr. aloes.
 „ opii $\overline{aa}$ gr. $\overline{xij}$
 Boracis
 Sacchari albi $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.
 Solve in
 Aquae rosarum $\overline{3iv}$.
M. S. Augewasser.
Anwend. Gegen Verdunkelung der Hornhaut.

G. A. Richter.

174. **R.** Aloes lucidae
Myrrhae āā 3j
Carbon. ppt. 3jß.
M. f. pulvis.

D. S. Täglich 1—2mal einzustreuen und vor der Wiederholung des Einstreuens mit lauem Wasser abzuspülen.

Anwend. Gegen stinkende und atonische Geschwüre.

Vogt.

175. **R.** Aloes lucidae pulv. 3j
Fell. tauri inspiss.
Petrolei āā 3jß
Adipis suilli 3jß.
M. f. unguent.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel voll in die Nabelgegend einzureiben.

Anwend. Gegen Eingeweidewürmer und besonders durch sie erregte Kolikschmerzen.

Pharm. Bat.

176. **R.** Aloes 3j.
Solve in
Decoct. avenae 3x.

S. Klystier

Anwend. Gegen Askariden.

Clarck.

177. **R.** Aloes 3j
Magnes. sulphur. 3j
Olei olivar. 3ijj
Decoct. hordei 3x.

M. S. Klystier.

178. R_y. Aloes soccotr. ʒß
 Sal. commun. ʒiij
 Farinae ʒij
 Mellis q. s. ut f. l. a. suppositorium.

Anwend. Gegen Askariden.

Elixir proprietatis acidum s. Paracelsi. Saures Aloeelixir.

179. R_y. Spirit. vin. rectific. part. xij
 Acid. sulphur. dilut. part. i.
 Adde
 Aloes lucidae
 Myrrhae electae cont. āā part. i.
 Croci part. ½
 Digerantur per quatrimum et filtra.

Form u. Gabe. Rein oder in Mixturen zu 10—40 Tropfen einigemal täglich.

Althaea. Eibisch.

(*Althaea officinalis* L.)

Herba s. folia et radix althaeae.

Eibischblätter und Wurzel.

Form u. Gabe. Selten in Pulver zu ʒj-ʒj, in Abkochung zu ʒij — jv auf ʒvj — viij; als Zusatz zu Tisane, Brustspecies, Gurgelwässern, Einspritzungen, Bähungen, Umschlägen, Klystieren; Paste; Syrup; Salbe.

180. R_y. Rad. althaeae ʒj
 „ liquirit. ʒß
 Semin. gossypii
 „ papav. albi

Semin. portulaccae āā 3ij
 „ hordei
 Boli armen. praep. aa 3ß
 Gummi arabici
 „ tragacanth. āā 3j
 Sacchari albi 3ß.

M. f. pulvis.

D. S. *Einen Theelöffel voll täglich einigemal zu nehmen.*

Anwend. Gegen Harnbeschwerden.

Wepfer.

181. R. Rad. althaeae conc. 3ij.
 Coque c. aq. font. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor.
 Col. 3iv adde
 Kali nitrici gr. xij
 Extr. dulcamar. gr. vj
 Syrupi diacodii 3j.

M. S. *Stündlich einen Esslöffel voll.*

Anwend. Im Krampfhusten oder bei starkem Husten der Kinder überhaupt.

Goelis.

182. R. Decoct. rad. althaeae 3vj
 Syrup. mellis 3ij

M. S. *Zum Gurgeln.*

Anwend. Bei entzündlichen Bräunen.

183. R. Herb. et rad. althaeae 3iij
 „ „ polygal. vulg. 3j
 Flor. verbasci
 „ rhoead. āā 3ß
 Semin. anisi stellat. 3ij.
 Conc. cont.

M. S. *Brustthee.*

Meyer.

184. *Rx.* Rad. althaeae
 Summitat. galeops. grandifl.
 Rad. liquirit. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.
 Conc. M. f. species.
D. S. Den vierten Theil mit $\frac{3}{4}$ Quart Wasser gekocht zum Trank.

Anwend. In Brustkrankheiten mit vielem Husten.

Vogt.

185. *Rx.* Syrup. de althaea
 „ opiat
 Olei amygd. rec. express. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.
 M. f. Linctus.
S. Theelöffelweise.

Anwend. Bei heftigem, trockenem Husten.

Hôp. des Enf.

186. *Rx.* Rad. althaeae $\overline{3j}$
 Aquae commun. $\&\beta$.
 Coque et cola.
D. S. Lauwarm überzuschlagen.
Anwend. Bei akuten Augenentzündungen.

187. *Rx.* Folior. althaeae $\overline{3ij}$
 „ hyoscyami $\overline{3j}$.
 Ruditer pulverata concoquantur in lacte in formam cataplasmatidis, cui mica panis albi pro debita spissitudine addetur.
S. Warm aufzulegen und aller 3—4 Stunden zu erneuern.

Anwend. Als erweichender und schmerzstillender Breiumschlag.

J. A. Schmidt.

188. *Rx.* Rad. althaeae
 Fol. malvae
 Herbae melilot.
 Flor. chamomill.
 Semin. lini āā ʒj.
 Conc. cont. M. f. species.
D. S. Mit hinreichender Milch zur Consistenz
 eines Breies zu kochen und als Umschlag zu
 gebrauchen.
Anwend. Wie das vorhergehende.

189. *Rx.* Fol. althaeae
 Flor. chamomill. vulg.
 Semin. lini āā ʒj.
 Conc. cont.
M. S. Zu einem Klystier mit Milch zu kochen.

Species pectorales et Species pro in-
 fuso pectorali; Brustthee und
 Brustkräuter.

Form u. Gabe. Leichte Abkochung oder Aufguss
 ʒij—iv auf ʒviij—xij täglich.

Alumen. Alaun.

(Alumen crudum, Alumina kalico-sulphurica,
 Sulphas kalico-aluminicus; gemeiner
 Kali-Alaun.)

Form u. Gabe. Innerlich in Pulverform, Pillen,
 Bissen, Plätzchen, Lösung zu 2—10 Gr. täglich mehr-
 mals; äusserlich als Streu-, Schnupfpulver, aufgelöst zu
 Einspritzungen, Augen-, Mund-, Gurgelwässern zu ʒß—j
 auf ʒiij—v, zu Bädern zu ʒij—v, als Salbe zu ʒß—j
 auf ʒj.

Man *vermeide* Verbindungen mit Alkalien, Erden, Aqua calc., Calcar. muriat., Acet. saturn., Plumb., Hydrargyr. acet., nitr., muriat. corr., phosphor., Kali nitr., muriat., acet., tartaric., Tart. natron., ammoniat., borax., Ammon. muriat., succin., Baryta muriat., mit Abkochungen gerbestoffhaltiger Rinden.

190. *Rx.* Alumin. crudi 3j
 Gumm. mimos. pulv. 3ß.
 M. f. pulv. Div. in x part. aequal.
S. Aller 3 Stunden ein Pulver.
Anwend. Gegen atonische Blutflüsse.

P. Frank.

191. *Rx.* Opii gr. iv
 Pulv. cort. cinnamomi ʒj
 Alumin. crudi 3j.
 M. f. pulv. Div. in x part. aequal.
D. S. Aller 4 Stunden 1 Pulver.
Anwend. Gegen atonische Metrorrhagieen.

Jahn.

192. *Rx.* Alumin. crudi gr. v
 Sacch. lactis ʒß
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.
S. Stündlich ein Pulver.
Anwend. In der Entwicklungsperiode des Abdominaltyphus.

Dobler u. Skoda.

193. *Rx.* Alumin. crudi
 Camphorae aa gr. ij—iij
 Sacchari albi ʒj.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. x.
S. Einige Pulver des Tages.

Anwend. Gegen habituelle Mandelbräune; bei der leisesten Spur und auch noch an dem folgenden Tage.

L. W. Sachs.

194. *Ry.* Alumin. crudi ʒij
 Kino gr. xxiv
 Opii puri gr. iij
 Sacch. lactis ʒj.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.
S. Aller 3 Stunden 1 Pulver in Wasser zu nehmen.

Anwend. Gegen atonische Mutterblutflüsse.

Vogel.

195. *Ry.* Extr. cort. peruvian. ʒβ
 Alumin. crudi ʒij—iv
 Syrup. cydonior. ʒj
 Aquae cort. cinnamomi ʒviiij.
M. D. S. Stündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In Faulfiebern.

Vogel. Schröder. Jahn.

196. *Ry.* Alumin. crudi ʒij
 Aquae destill. ʒiv
 Acidi sulphur.
 Essent. citri āā gr. x
 Syrup. citri ʒij.
M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Bleikolik.

Gendrin.

197. *Ry.* Alumin. crudi ʒij
 Catechu
 Gumm. tragacanth. āā ʒj
 Vini rhenani ʒiv
 Aquae menthae pip. ʒviiij.
M. D. S. Stündlich 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Bleikolik.

Grashuis.

198. *Ry.* Alumin. crudi ʒß
 Mucilag. gumm. mimosae ʒiij
 Vini rhenani ʒj.

S. S. Zweistündlich einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen atonische Blutflüsse.

H e r z.

199. *Ry.* Alumin. crudi gr. xv.
 Solve in
 Aquae menthae crisp. ʒiv.
 Adde
 Tinct. cinnam.
 Syrup. papav. āā ʒj.

D. S. Alle 1/4 — 1 Stunde 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen habituelle Metrorrhagieen.

R u s t.

200. *Ry.* Alumin. crudi ʒj
 Seri lactis clarificat. ʒj.
*M. S. Innerhalb 24 Stunden zu ʒj — ij zu ver-
 brauchen.*

Anwend. Bei passiven Hämorrhagieen, chronischen Durch-
 fällen u. s. w.

Edwards et Vavasseur.

201. *Ry.* Alumin. crudi ʒj
 Conserv. rosar. q. s.
 ut f. pil. No. xxxvj. Consp. cinnam.
S. Morgens und Abends 2, später 4 Stück.

Anwend. Gegen Gebärmutterhalskrebs.

Fuster.

202. *Ry.* Alumin. crudi ʒj — jß
 Extr. cicut. gr. x

Syrup. papav. rhoead. ℥ij
 Aquae foeniculi ℥iij.

M. D. S. Kindern von 2—3 Jahren alle 6 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Keuchhusten, wenn die bronchitische Periode vorüber ist, als ein mächtiges Mittel empfohlen von

Golding Bird.

203. *Rx.* Alumin. dep. ℥j — ij
 Gumm. arabici ℥ß.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Streupulver.

Anwend. Gegen wunde Brustwarzen, nachdem man sie vorher mit Brantwein abgewaschen hat. Vor dem Anlegen des Kindes abzuwaschen.

V o g t.

204. *Rx.* Alumin. dep. gr. iv — vj
 Aquae foenicul. s. rosar. ℥jß.

S. S. Täglich 4—6 mal einige Tropfen ins Auge zu lassen.

Anwend. Gegen Augenentzündungen Neugeborener und bei leichten katarrhalischen Augenentzündungen.

Radius.

205. *Rx.* Alumin. crud. gr. xij
 Aquae destill. ℥iv
 Tinct. opii croc. ℥j.

M. S. Augewasser.

Anwend. Gegen Auflockerung der Augenhäute nach Augenentzündung.

Andreae.

206. *Rx.* Sanguin. dracon. $\text{℥}\beta$
 Alumin. crudi
 Boli armen. $\bar{\text{āā}}$ ℥j
 Ferri oxydat. rubri ℥ij .
M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Schnupfpulver.

Anwend. Gegen Nasenbluten.

Griffith.

207. *Rx.* Alumin. crudi ℥j
 Extr. ratanhiaie exotic.
 Cort. querc. $\bar{\text{āā}}$ ℥j .
M. f. pulv. subt.

D. S. Schnupfpulver.

Anwend. Gegen Auflockerung der Nasenschleimhaut aus reiner Atonie.

Vogt.

208. *Rx.* Alumin. crud. $\text{℥}\beta$ — j
 Infus. salviae ($\text{℥}\beta$) ℥vj
 Mell. rosati ℥j .

M. S. Zum Ausspülen des Mundes.

Anwend. Bei schwammigem Zahnfleische.

Vogt.

209. *Rx.* Alumin. crud. subtiliss. pulv. ℥j
 Extr. lign. campech. pulv. $\text{℥}\beta$
 Bals. peruvian. gutt. vj
 Aquae salviae q. s.
ut f. electuarium.

D. S. Zahnfleischlattwerge.

Anwend. Wie das vorhergehende.

Phöbus.

210. *Ry.* Alumin. crudi 3j
 Infus. fl. rosar. rubr. 3x
 Mellis rosati 3j.

M. D. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei lymphatischer Anschwellung des Gaumensegels,
 Zäpfchens u. s. w.

B r e r a.

211. *Ry.* Alumin. gr. x
 Mellis rosati 3jβ
 Tinct. catechu 3jβ.

M. S. Pinselsaft.

Anwend. Bei Mundfäule.

R a d i u s.

212. *Ry.* Camphorae rasae ʒj.
 Solve in
 Spirit. serpylli q. s.
 Aquae menthae pip. 3viii
 Aluminis 3j
 Mellis rosar. 3j.

S. M. S. Mundwasser.

Anwend. Gegen Speichelfluss.

F u c h s.

213. *Ry.* Aluminis 3j
 Aquae salviae 3vj
 Tinct. pimpinell. 3β
 Syr. mororum 3vj.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Bei atonischer Bräune.

V o g t.

214. *Ry.* Aluminis ℥j — ij .

Solve in

Decoct. sem. hordei excort. ℥x .

Adde

Syrup. capit. papav. ℥β .

M. D. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen Heiserkeit, namentlich der Sänger.

Bennati.

215. *Ry.* Aluminis crudi ℥j

Aquae rosarum ℥ij .

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Nachtripper.

Hunter.

216. *Ry.* Aluminis crudi gr. xv

Aquae rosarum ℥iv

Opii puri ℥β

Mucilag. gumm. mimosae ℥β .

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen torpide Blennorrhoe der Harnröhre.

Rust.

217. *Ry.* Aluminis depur.

Ferri sulphur. crystall. āā . gr. xij — ℥j .

Solve in

Decoct. hordei ℥v

Mellis rosat. ℥j .

D. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei atonischer Blennorrhoe der Harnröhre.

Vogt.

218. *Ry.* Decoct. cort. querc. (℥j) ℥ix

Aluminis depur. ℥ij .

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Erschlaffung der Mutterscheide und des Mastdarmes.

Cooper.

219. **Ry.** Infus. herb. hyoscyami $\mathfrak{Z}\text{vj}$
Aluminis crudi $\mathfrak{Z}\beta$.

S. S. Kalt überzuschlagen.

Anwend. Gegen Phimose.

Simon.

220. **Ry.** Aluminis crudi $\mathfrak{Z}\text{j}$
Butyr. rec. insuls. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.
M. f. unguent.

S. Auf Charpie oder Leinwand gestrichen einmal täglich frisch aufzulegen.

Anwend. Gegen schmerzhaft und nässende Hämorrhoidal-knoten.

J. A. Schmidt.

221. **Ry.** Alumin. pulv. $\mathfrak{Z}\text{ij}\beta$
Opil pulv. $\mathfrak{Z}\beta$
Unguent. plumb. $\mathfrak{Z}\beta$.
M. f. unguent.

D. S. Auf Leinwand gestrichen aufzulegen.

Anwend. Zur Erleichterung der Reposition eingeklemmter Hämorrhoidalknoten nach vorgängiger Anwendung von Blutegehn.

Rust.

222. **Ry.** Aluminis $\mathfrak{Z}\text{ij}\beta$
Camphorae
Opil puri $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{Z}\text{j}$ — $\mathfrak{Z}\beta$
Bals. peruvian. $\mathfrak{Z}\text{j}$
Unguent. saturn. $\mathfrak{Z}\beta$.
M. f. ungt.

S. Salbe.

Anwend. Gegen erfrorene Theile.

Rust.

223. *Rx.* Aluminis 3ij — iij
 Aquae font. ℥ij
 Aceti vini ℥ß.

S. S. Zum Bad.

Anwend. Gegen erfrorene Theile. Die Bäder müssen mehrmals täglich und schon im beginnenden Herbste gemacht werden.

L. W. Sachs.

224. *Rx.* Aluminis 3j.
 Solve in
 Aquae rosarum
 „ sambuci āā 3j.
 Adde
 Spirit. vini rectific. 3ß
 Album. ovi j.

M. D. S. Umgeschüttelt Leinwand damit befeuchtet überzuschlagen.

Anwend. Gegen Excoriationen von langem Liegen.

Niemann.

Alumen ustum; gebrannter Alaun.

(*Al. calcinatum, Sulphas aluminico-kalicus.*)

Form u. Gabe. Aeusserlich als Pulver zu gr. j—3j.

225. *Rx.* Aluminis usti
 Zinci sulphurici
 Boracis āā ʒj
 Sacch. albi ʒij.
M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Augenpulver.

Anwend. Gegen Verdunkelungen der Hornhaut.

Beer.

226. *Ry.* Alumin. usti gr. iij
 Croci orient. gr. j
 Sacch. albi 3j.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Augenpulver.

Anwend. Zu gleichem Zwecke wie das vorhergehende.

Mauchard.

227. *Ry.* Alumin. usti gr. xv
 Ferri sulphur. cryst. gr. iv
 Sacch. albi 3ij.
 M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Gegen schwammige, unreine Geschwüre.

Le Febure.

228. *Ry.* Alumin. usti 3ij
 Camphor. trit. 3ß.
 M. f. pulvis.

S. Täglich zweimal in die Geschwüre zu streuen.

Anwend. Wie das vorhergehende.

C. J. Meyer.

229. *Ry.* Alumin. usti
 Natri subboracici aa 3ß
 Medullae bovin. 3j
 Olei bergamottae gutt. vj.
 M. f. ungt.

S. Haarpomade. Früh und Abends 1/2 Theelöffel voll einzureiben.

Anwend. Gegen Abschuppungen, das sogenannte Abschilfern der Kopfhaut, wenn nicht, wie oft, eine rheumatische Dyskrasie zum Grunde liegt.

Fricke.

230. *Ry.* Alumin. usti
 Aerug. virid.
 Pulv. herb. Sabinae $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.
 M. f. pulvis.

S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Gegen Condylome.

Robington.

231. *Ry.* Alumin. usti
 Hydrargyri praec. rubri $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$
 Pulv. herb. Sabinae $\overline{3ij}$.
 M. f. pulvis.

S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Gegen Condylome,

Gardiner.

232. *Ry.* Amygdal. amar. excort. $\overline{3iv}$
 Mellis albi $\overline{3iij}$
 Alumin. usti
 Olibani $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Sinapis
 Camphor. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$
 Vitell. ij.
 M. f. l. a. pasta.

D. S. Man verdünnt diesen Teig mit etwas Wasser und reibt Morgens und Abends Hände und Füße, warauf man sie mit nicht ganz lauwar-
 mem Wasser abwäscht und mit Leinwand ge-
 hörig abtrocknet.

Anwend. Gegen Frostbeulen.

Cadet.

Alumina depurata; gereinigte
Alaunerde.

(*Argilla, Terra argillacea, Aluminis;
Thonerde.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Schüttelmixtur, zu gr. v-x
täglich einigemal.

Man vermeide Säuren.

233. R_y. Argillae depur. ʒβ
Syrup. diacodii ʒiij
„ emulsivi
Aquae anisi āā ʒvj.

M. D. S. Alle 1/2 Stunden einen Kaffeelöffel voll
zu geben.

Anwend. Für einen Säugling bei sehr acutem Brechdurchfall.

Riecke.

234. R_y. Semin. papav. ʒβ.
Fiat cum.

Aquae font. ʒv l. a. emuls., cui filtratae adde
Argillae depur. ʒj
Laud. liqu. Syd. ʒij
Syrup. althaeae ʒj.

M. D. S. Alle Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Anwend. Für einen Erwachsenen bei Ruhr mit Säurebildung.

Riecke.

Ambra grisea. Grauer Amber.

(*Von Physeter macrocephalus.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Trochisken,
Emulsion, zu gr. ii—xx täglich mehrmals; als äther.
Tinktur zu 20—30 Tropfen.

- 235 Rx. Tinct. ambrae et moschi ʒij
Aquae fl. aurant. ʒjß
Syr. diacod. ʒß.

M. S. Alle 1/2 Stunden 1 Esslöffel,

Anwend. Gegen Trismus neugeborener Kinder.

Schneider.

236. Rx. Ambrae gris. ʒß
Sacch. albi ʒjß.

M. f. pulv. Div. in vj part. aeq. D. ad chart. cerat.

S. Aller 2 Stunden ein Stück zu nehmen.

Anwend. Bei einem hohen Grade von Reizlosigkeit und Nervenschwäche.

237. Rx. Ambrae gris. ʒß
Pulv. rad. zingib.

„ „ irid. flor.

„ catechu āā ʒj

Sacch. albi ʒj.

Contere exactiss., adde

Mucil. gumm. tragacanth. q. s. ut f. l. a.
trochisci pulv. rad. irid. fl. consperg., leviss.
modo exsiccandi No. C.

D. S. Bei üblem Mundgeruch.

Henschel.

238. Rx. Ambrae griseae
Extr. cort. aurant.
„ chinae āā ʒj
Opil puri gr. ij.
M. f. pil. gr. ij.

D. S. Aller 3 Stunden 5—10 Stück.

Anwend. Als kräftiges Aphrodisiacum.

Augustin.

239. *Ry.* Tinct. ambrae 3j
 „ aromat. acid. 3ij.

M. S. Täglich 3—4 mal 20 Tropfen in Hafer-
 schleim.

Anwend. In Verbindung mit einem aromat. Magenpflaster ge-
 gen Erbrechen Schwangerer.

Heller u. Waitz.

240. *Ry.* Rad. irid. flor.
 Gumm. arab. āā 3iij
 Mic. pan. alb. 3iijß
 Mucil. gumm. arab. q. s. ad massam pilul.

Adde

Olei neroli 3ß
 „ caryophyll. arom. 3ij
 „ bergamottae
 Tinct. ambr. moschat. āā 3j
 Moschi tunquin. gr. vj
 Bals. peruvian. 3jß.

M. S. Die weiche Masse in eine kleine Kugelform
 zu drücken, und die Kügelchen an eine Schnur
 gereihet um den Hals zu tragen.

Anwend. Als Amulet gegen habituelle Halsentzündungen und
 Rheumatismen.

Anmerk. Die Tinct. ambr. moschata besteht nach
 der Pharmac. Brandenb. von 1781 aus:

Ry. Ambrae gris. 3j
 Moschi gr. xv
 Spirit. rosar.
 „ vin. rectificatiss. āā 3iij.
 Dig. per viij dies. Filtra.

Clarus u. Radius.

Ammoniacum depuratum. Gereinigtes Ammoniakgummi.

(*Gummi ammoniac. dep. von Ferula orientalis oder F. ferulago L.*)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, (unvollkommener) Auflösung, Emulsion, Lattwerge, Saft, zu gr. v — xv — xxx einigemal täglich. Aeusserlich als Pflaster.

241. R_y. Ammoniac. dep. ʒij.
Solve in
Spirit. Minder. ʒiij.
Adde
Vini stibiatı ʒj
Oxymell. simpl. ʒj
Infus. fl. sambuc. ʒiij.

D. S. Umgeschüttelt zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen chronischen Lungenkatarrh.

P. Frank.

242. R_y. Gumm. ammoniac. ʒj
Pulv. scillae ʒj.
M. f. l. a. pil. No. XLVIII.

D. S. Vier bis fünf Stück zu nehmen.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfs bei chronischem Lungenkatarrh. In noch stärkeren Gaben wirken diese Pillen abführend.

Hôp. St. Ant.

243. *Ry.* Ammoniac. dep.
Extr. helenii $\bar{a}\bar{a}$. $\bar{3}ij$
Pulv. rad. glycyrrh. q. s. ut f. pil. No. cxx.
Consp. pulv. rad. irid. flor.

D. S. Dreimal täglich 5—8 Stück zu nehmen.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfes.

Phöbus.

244. *Ry.* Gumm. ammoniaci $\bar{3}ij$
Extr. absinth. $\bar{3}j$
Pulv. rad. scillae gr. xij
Olei bacc. junip. gutt. xx.
M. f. l. a. pil. gr. ij. Consp. pulv. rad. liquirit.

D. S. Täglich 2mal 5—7 Stück zu nehmen.

Anwend. In der Wassersucht.

C. J. Meyer.

245. *Ry.* Gumm. ammoniac. dep.
„ galbani dep.
Extr. conii macul.
Sapon. med. pulv. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
Herb. belladonn. pulv. $\bar{3}\beta$
Tart. stibiat. $\bar{3}\beta$.
M. f. l. a. pil. gr. ij. Consp. pulv. stipit. dulcam.

D. S. Täglich 3mal 9 Stück und allmählig gestiegen.

Anwend. Mit Erfolg gegen knotige Lungensucht.

Bichter.

246. *Ry.* Gumm. ammon. dep.
Sapon. medic. pulv.
Rad. rhei pulv. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$.
M. f. pil. gr. iij. Consp. pulv. rad. irid. flor.

D. S. Täglich 3mal 6—8 Stück.

Anwend. Gegen torpide Unterleibsstockungen, zumal im Pfortader- und Lebersysteme, Wassersucht u. s. w.

Tissot.

247. *Ry.* Gumm. ammoniaci dep.
 Kali sulphuric. dep. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Sapon. medic. pulv. $\overline{3ij}$
 Hydrargyr. muriat. mit. $\overline{3j}$
 Syrup. cort. aur. q. s. ut f. pil. gr. j.
 Consp. pulv. cass. cinnam.

D. S. Morgens und Abends 3 Stück.

Anwend. In 3 Fällen von Gebärmutterkrebs mit Erfolg angewandt.

P. Schneider.

248. *Ry.* Gumm. ammoniaci
 Ammon. muriat. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$.
 Solve in
 Oxymell. scillit. $\overline{3j}$.
 Adde
 Vini stibiat. $\overline{3ij}$
 Syrup. althaeae $\overline{3iv}$.

M. D. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Zur Beförderung der Expectoration.

Selle.

249. *Ry.* Gumm. ammoniaci dep. $\overline{3j} - ij$
 Oxymell. scill. $\overline{3ij}$
 Tere in mortario sensim affundendo
 Aquae font. $\overline{3vj}$
 „ menthae pip. $\overline{3\beta}$.

Col. S. Umgeschüttelt alle 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. In hartnäckigen Lungenkatarrhen.

Hôt. Dieu.

250. *Ry.* Rad. polygal. seneg. ʒij.

Infunde cum

Aquae bullient. ʒvj.

Colat. sensim tritur. adde

Gumm. ammoniaci ʒj

Syrup. bals. tolut. ʒj.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Löffel voll.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfes bei nicht entzündlichen Lungenkatarrhen.

Hôt. Dieu.

251. *Ry.* Gumm. ammoniac. ʒij

Vitell. ovi q. s.

Aquae foenicul. ʒv

Liqu. ammon. anis. ʒiij

Vini stibiat. ʒij

Syrup. althaeae ʒß.

M. f. l. a. mixtura.

S. Umgeschüttelt aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Atonie der Lungen, stockenden Auswurf, Asthma, beginnenden Stickfluss.

Berends.

252. *Ry.* Gummi ammoniac. ʒj.

Subige cum

Syrup. liquirit. ʒjß.

Adde

Pulv. anisi stellati ʒiij

Ammon. muriat. dep. ʒij.

F. electuarium.

D. S. Täglich 4—6 mal einen kleinen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Atonie der Schleimhäute der Bronchien und daher rührenden Schleimhusten.

V o g t.

253. *Ry.* Gummi myrrhae
 „ ammoniaci āā 3j.

Subige cnm

Syrup. althaeae 3ij.

Adde

Pulv. rad. senegae 3iij

Succi liqnirit. dep. 3ij.

M. f. electuarium.

D. S. Täglich 4 mal einen grossen Theelöffel.

Anwend. In gleichen Fällen wie das vorhergehende.

Vogt.

254. *Ry.* Gummi ammoniaci 3j
 Sulph. antim. aur. gr. vj
 Syrup. althaeae 3iij.
 M. f. linctus.

D. S. Umgeschüttelt aller zwei Stunden einen grossen Theelöffel.

Anwend. Als Expectorans, wo kein Fieber zugegen ist.

J. A. Schmidt.

255. *Ry.* Syrup. gumm. ammoniaci
 „ althaeae āā 3β
 Vini stibiat. 3iv.

M. D. S. Stündlich einen Theelöffel.

Anwend. Gegen stockenden Auswurf bei chronischen Katarrhen.

Schubarth.

256. *Ry.* Gummi ammoniaci 3j
 Acet. scillitic. q. s. ad emolliendum.
 Extend. supra alutam.

S. Zum Bedecken des geschwollenen Theiles.

Anwend. Gegen chronische Auflockerungen (Spongiosis chronica), kalte Geschwülste, atonische Rheumatismen u. s. w.

v. Hildenbrand.

257. *Rx.* Ammoniaci ℞β
 Asae foetid. ℥ij
 Sapon. venet. pulv. ℥j.
 M. leni igne emoll., intere sensim spirit. vini rectific.
 pax. f. per inspiss. emplastr.
S. Auf Leder zu streichen.

Emplastr. resolvers Schmuckeri.

Anwend. Zur Zertheilung von Stockungen, drüsigen Verhärtungen, Geschwülsten und zur Hervorrufung unterdrückter Fusschweisse.

258. *Rx.* Gummi ammoniaci ℥v
 Asae foetid. ℥ij
 Sapon. pur. rasi ℥j
 Olei olivar. ℥β.
 Coque ex aquae font. q. s. leni igni ad empl.
 spissitud.

Anwend. Zur Zertheilung drüsiger Verhärtungen.

J. A. Schmidt.

259. *Rx.* Ungt. althaeae ℥jβ
 Cerae flavae ℥iv
 Colophon. ℥j.
 Liquefact. leni igne et per lint. traject. addetur
 Empl. melilot. ℥j
 Radic. irid. flor. pulv.
 Semin. foenu graec. pulv. āā ℥ix
 Gummi ammoniac. pulv. ℥ij.
 M. Mal. f. Empl.

Emplastrum ammoniaci.

Anwend. Zur Zertheilung von Stockungen, Geschwülsten, drüsigen Verhärtungen, chronischen Exsudaten u. s. w.

260. *Rx.* Cerae flavae ℥iij
 Colophonii ℥j.
 Liquetur et colet., refrig. adde

Terebinthin. clar.

Bdellii āā 3j

Ammoniaci 3β

Galbani

Sandaracae āā 3ij

Succini citrini 3vj

Thuris electi

Mastichis āā 3j.

M. f. l. a. emplastrum.

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.

Anwend. Zur Linderung rheumatischer Schmerzen und zur Zertheilung rheumatischer Gelenkgeschwülste.

Bernstein.

Ammonium. Ammonium.

(*Sal alcali volatile, Ammonium causticum, Ammoniacum; Ammoniak, flüchtiges Alkali, Aetzammonium, Hydrogenazot.*)

A. Ammonii acetici Liquor; essigsaure Ammoniumflüssigkeit.

(*Liquor s. Spiritus Mindereri, Acetas ammonii solutus, Aqua s. Liquor acetatis ammoniacae. Minderer's Geist, flüssiges essigsaures Ammonium.*)

Form u. Gabe. Rein oder in Mixtur zu 3j—iv täglich mehrmals; äusserlich als Gurgel-, Wasch-Wasser, Einreibung, Umschlag.

Man vermeide Verbindungen mit reinen und kohlensauren Alkalien, Säuren und sauren Salzen.

261. *Rx.* Liqu. ammon. acet.
 Oxymell. simpl. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}vj$
 Aquae fl. sambuc. $\bar{3}iv$.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Ein sehr mildes Mittel, welches in fieberhaften Krankheiten zur Beförderung der Absonderungen, besonders der Haut und Nieren, mit Nutzen gereicht wird.

Radius.

262. *Rx.* Vini stibiat. $\bar{3}ij$
 Liqu. ammon. acet. $\bar{3}j$
 Succ. samb. insp. dep. $\bar{3}\beta$
 Aquae sambuc. $\bar{3}j\beta$.

M. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. In rheumatisch-katarhalischen Fiebern und frisch entstandenen Rheumatismen.

Phöbus. Sobernheim.

263. *Rx.* Liqu. ammon. acet. $\bar{3}j$
 Aquae sambuc. $\bar{3}v$
 Ammon. muriat. $\bar{3}i\beta$
 Tart. stibiat. gr. ij
 Syrup. althaeae $\bar{3}vj$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen leichte Nerven- und Faulfieber.

F. Jahn.

264. *Rx.* Aquae sambuc. $\bar{3}ij$
 Liqu. ammon. acet. $\bar{3}j$
 Aether. acet. $\bar{3}j$
 Syrup. aurant. $\bar{3}iij$.

M S. Alle Stunden einen Esslöffel.

Anwend. In ähnlichen Fällen bei schleichend nervösem Zustande.

F. Jahn.

365. *Rx.* Liqu. ammon. acet. $\bar{3}j$
Vini stibiat. $\bar{3}j$.

M. S. Aller 2 Stunden 40 — 80 Tropfen.

Anwend. Zur Beförderung des Hervortretens hitziger Hautausschläge.

Stark, Jahn.

266. *Rx.* Liqu. ammon. acet. $\mathfrak{v}ij - \bar{3}j$
Vini stibiat. gutt. xvij — xxiv
Aquae menthae crisp. $\bar{3}vj$
Syrup. rubi idaei $\bar{3}j$.

M. S. Aller $1\frac{1}{2}$ Stunden einen Theelöffel voll.

Anwend. Bei rheumatischem Fieber für ein 6 monatliches Kind.

Vogt.

267. *Rx.* Liqu. ammonii acet.
„ Kali acet.
Oxymell. scill. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j\beta$.

M. S. Aller 2 — 3 Stunden 1 — 2 Löffel voll.

Anwend. Gegen Wassersucht nach Scharlach.

Jahn.

268. *Rx.* Infus. flor. samb. $\bar{3}viij$
Liqu. ammon. acet.
Mellis rosati $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

M. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei Halsentzündung im Scharlach, wenn Geschwüre vorhanden sind.

Wendt.

269. *Ry.* Liqu. Mindereri $\bar{3}vj$
 Ammon. muriat. dep. $\bar{3}j$
 Mellis rosati $\bar{3}j$.

M. D. S. Aller $\frac{1}{2}$ Stunden eine kleine Spritze voll erwärmt in den Hals zu spritzen.

Anwend. Bei stark ausgebildeter Angina im Scharlach sehr wirksam.

Fischer.

270. *Ry.* Liqu. Mindereri
 Alcohol.
 Aquae destill. $\bar{aa}$ $\bar{3}iv$.

M. S Zum Ueberschlagen.

Anwend. Zur Beförderung der Aufsaugung bei Hydrocele, lymphatischen Exsudationen in den Gelenken u. s. w.

271. *Ry.* Liqu ammon. acetici
 „ digestiv. $\bar{aa}$ $\bar{3}iv$.

M. D. S. Lauwarm mit Tüchern überzuschlagen.

Anwend. Bei Hydrocele.

Vogt.

272. *Ry.* Olei amygd. dulc.
 Liqu. ammon. acet. $\bar{aa}$ $\bar{3}j$
 Ammon. muriat. pulv.
 Laud. liqu. Sydenh. $\bar{aa}$ $\bar{3}j$.
M. f. liniment.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen schmerzhaftes Anschwellungen.

Löffler.

B. Ammonium arsenicicum; arseniksaures Ammoniak.

Form u. Gabe. Lösung 1 Gran auf $\mathfrak{z}$ j. Mit $\frac{1}{24}$ Gran zu beginnen und vorsichtig auf $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{8}$ Gran zu steigen. Längere Anwendung ist nur bei den schwächeren Gaben erlaubt.

273. R_x. Ammon. arsenicici gr. viij
Aqua destill. $\mathfrak{z}$ viiij.
Solut. adde
Spirit. angelicae $\mathfrak{z}\beta$.

S. Täglich 20 — 30 Gran in schleimigem Getränk.

Anwend. Gegen chronische Hautausschläge, besonders Eczema chronicum.

Biett. Rayer.

C. Ammonium carbonicum; kohlensaures Ammonium.

(*Amm. subcarbonicum, aëratum, mite, Alkali volatile siccum, Carbonas ammoniae solidus; flüchtiges, trocknes, basisches Laugensalz.*)

Form u. Gabe. Nicht gern in Pulverform, eher in Pillen oder Bissen, am zweckmässigsten in Auflösungen, Mixturen, zu gr. iii — x täglich mehrmals. Aeusserlich als Riechmittel.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, Alkalien und Salzen, welche Magnesia, Kalk, Baryt und Metalloxyde enthalten.

274. *Ry.* Ammon. carbon. dep. $\bar{3}j$
 Aquae rutae $\bar{3}viii$
 Syrup. diacod. $\bar{3}ij$.

M. S. Alle 10 Minuten einen Esslöffel voll zu nehmen.

Mixtura antimiastica Swietenii.

Anwend. Bei Anfällen convulsivischen Asthmas.

van Swieten.

275. *Ry.* Ammon. carbon. dep. gr. xxiv.
 Aquae menthae pip. $\bar{3}ij$
 Syr. rosar. rubr. $\bar{3}ij$.

M. S. Auf zweimal.

Anwend. Bei chronischem Durchfall.

Hamilton.

276. *Ry.* Ammon. carbon. dep. $\gamma\beta$
 Aquae cinnam. simpl. $\bar{3}j$
 Tinct. capsici 3β
 Syr. croci $\bar{3}\beta$.

M. S. Vor Schlafengehen auf einmal.

Anwend. Gegen Alpdrücken.

Waller.

277. *Ry.* Ammon. carbon. $\bar{3}j$ — ij .

Solve in

Aquae destill. $\bar{3}vj$.

Adde

Syr. althaeae $\bar{3}j$.

M. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunden bei dringender Gefahr, bei abnehmender aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Als Specificum gegen Scharlach in allen Formen und in allen Zeiträumen, selbst da, wo Blutentziehungen und entzündungswidrige Mittel nöthig scheinen.

**Wilkinson, Peart, Withering,
 v. Heinsberg, L. W. Sachs,
 Strahl.**

278. *Ry.* Ammon. carbon. dep. $\mathfrak{3j}$.
 Solve in
 Aquae cerasor. nigr. $\mathfrak{3v}$.
 Adde
 Syrup. cerasor. nigr. $\mathfrak{3j}$.
M. S. Umgeschüttelt stündlich 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Marcus.

279. *Ry.* Ammon. carbon. dep. $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{ij}$
 Acidi nitrici q. s. ad perfectam saturat.
 Aquae destill. $\mathfrak{3iij}$ — $\mathfrak{iv}$
 Syrup. althaeae $\mathfrak{3j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Als ein feines, schwächendes und temperirendes Mittel in Reizfebern, exanthematischen, rheumatischen, leicht entzündlichen Fiebern und in erethischen Wassersuchten.

Berends.

280. *Ry.* Ammon. carbon. pur. $\mathfrak{3j}$
 Acidi benzoici pur. $\mathfrak{3ij}$ et gr. xij
 Aquae comm. dest. $\mathfrak{3ij}$.
M. accurate et filtra.

D. S. 25 — 30 Tropfen in gehöriger Verdünnung.
 Liqueur ammonii benzoici Harlessii.

Anwend. In asthenischen, katarrhalischen und asthmatischen Affectionen, welche mit Krampf der kleinsten Bronchialzweige und Beengung der Brust verbunden sind; im Keuchhusten; bei hysterischen und hypochondrischen Unterleibskrämpfen, bei unterdrückten Schweissen, im Oedema rheumatico-arthriticum und selbst im Anfange von Brustwassersucht.

Harless.

281. *Ry.* Ammon. carbon. sicc. $\mathfrak{3j}$
 Spirit. vini rectific. $\mathfrak{3ij}$

Decoct. hordei $\bar{3}$ xij.

M. D. S. Gurgelwasser.

Anwend. Bei atonischer Angina.

de Montmahou.

282. *Ry.* Flor. arnicae $\bar{3}\beta$

Acet. vini q. s

Digere per hor. In Colat. $\bar{3}$ vj solve

Ammon. carbon. crud. $\bar{3}$ ij.

M. S. Erwärmt überzuschlagen.

Anwend. Gegen Oedema Scroti, wo nasse Umschläge nicht vertragen werden.

Neumann.

283. *Ry.* Ammon. carbon. crud. $\bar{3}\beta$

Olei menthae pip.

„ cajeput. $\bar{a}\bar{a}$ gutt. xij.

M. f. pulv. *D.* in vitro bene obturato.

S. Riechpulver.

Anwend. Bei Ohnmachten. Als Reizmittel für die Augen.

284. *Ry.* Ammon. carbon. $\bar{3}$ j

Unguent. rosat. $\bar{3}$ j

Olei jasmini gutt. iv.

M. f. ungt.

D. S. Täglich 3—4mal einzureiben.

Anwend. Bei Knoten in den Brüsten.

Augustin.

285. *Ry.* Sapon. albi

Fellis tauri $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ijj

Camphorae $\bar{3}$ j

Ammon. carbon. $\bar{3}\beta$.

Tritis adde

Unguent. althaeae $\bar{3}$ j

Olei petrae rect. ℥ij .

M. f. ungt.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei Scrofelgeschwülsten.

Swediaur.

Ammonii carbonici Liquor; wässeriger
Salmiakgeist.

(*Spiritus Salis ammoniaci aquosus, Liquor
subcarbonatis Ammoniae.*)

Form u. Gabe. In Mixturen oder mit Wasser zu
20—60 Tropfen, mehrmals täglich.

286. Rx. Liqu. ammon. carbon. ℥ij
Syr. chamomill. āā ℥vj
Aquaе chamomill. ℥iij .

M. D. S. Halbstündlich einen Esslöffel voll zu
nehmen.

Anwend. Gegen Cardialgie von Erkältung.

Richter.

287. Rx. Liqu. ammon. carbon. ℥j
Infus. rad. valerian. (℥ij) ℥vj
Syr. althaeae ℥β .

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll zu
nehmen.

Anwend. Gegen hysterische Krämpfe, Alpdrücken.

Schubarth.

288. *Ry.* Lign. ammon. carbon.
Tinct. cantharid. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}\beta$
Spirit. serpylli $\bar{z}$ ij.

M. S. Zum Waschen des Rückgrathes.

Anwend. Als Belebungsmittel.

Richter.

289. *Ry.* Ammon. carbon. liqu. $\bar{z}\beta$
Spirit. camphor. $\bar{z}$ i β .

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Bei Ecchymosen und als Rubefaciens.

Augustin.

D. Ammonium carbonicum pyro-oleosum; brenzlich-öliges kohlensaures Ammonium.

(*Amm. carb. empyreumaticum, Sal volatile Cornu Cervi; flüchtiges Hirschhornsalz.*)

Form u. Gabe. Am häufigsten und zweckmässigsten in Auflösungen, selten in Pillen, Bissen, Pulvern zu gr. ij—x, mehrmals täglich. Aeusserlich zu Riech-, Schnupf-Pulvern, Augentropfwassern, Salben, Linimenten, Pflastern.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei dem Ammon. carbonicum.

290. *Ry.* Ammon. carb. pyro-oleos. gr. viij
Camphorae gr. v
Mucilag. gumm. mimosae

150 AMMONIUM CARBONICUM PYRO - OLEOSUM.

Syrup. althaeae āā 3j
Aquae. fl. sambuc. 3iij.
M. f. emulsio.

S. Stündlich einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen veraltete Katarrhe, nervöse Rheumatismen,
torpide Nervenfieber.

Richter.

291. *Rx.* Ammon. carbon. pyro - oleos. 3j.
Solve in
Infus. fl. sambuci (3ß) 3v.
Adde
Liqu. ammon. acet. 3j
Sacchari albi 3vj.

M. D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei nervösen zurückgetretenen Exanthemen.

Sobernheim.

292. *Rx.* Moschi orient gr. j
Extr. hyoscyami gr. ß
Ammon. carb. pyro - oleos. gr. iv
Elaeosacch. valerian. 3j.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.

S. Stündlich ein Stück mit Wasser.

Anwend. Gegen kalten Brand, Krampfe.

Bemer.

293. *Rx.* Ammon. carbon. pyro - oleos.
Flor. benzoës āā gr. iv
Sulphur. stibiat. rubr. gr. ß
Sacchari albi 3ß.
M. f. pulv. Dent. tal. dos x.

S. Aller 1 — 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Pneumonia notha, besonders wenn die
Angst und Dyspnöe immer grösser, der Puls kleiner und
unregelmässiger wird, der Auswurf stockt und Erstickung
einzutreten droht.

Toel.

294. *Ry.* Opii puri gr. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$
 Ammon. carb. pyro-oleos. gr. iv — vj
 Piperis nigri gr. iv
 Elaeosacch. menthae pip. gr. x.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver mit warmem Wein.

Anwend. Gegen Gangraena senilis ex erethismo.

Vogt.

295. *Ry.* Moschi genuini gr. xij
 Ammon. carb. pyro-oleos gr. ix
 Extr. cort. peruviani ʒij.
 M. f. boli quatuor.

D. S. Dreistündlich einen Bissen zu geben.

Berends.

296. *Ry.* Ammon. carb. pyro-oleos.
 Sulph. stibiat. aurant. āā 3β
 Rad. scillae
 Extr. cascarill. āā 3ij
 Olei anisi gutt. vj
 Succ. liquirit. dep. s. q. ut f. pil. gr. ij.
 Consp. pulv. rad. irid. fl. D. in vitro.

S. Täglich 2 mal 8 Stück.

Anwend. Gegen Schleimasthma.

Richter.

297. *Ry.* Ammon. carbon. pyro-oleos. gr. v
 Extr conii maculati
 Fellis tauri inspiss. āā 3β
 Aquae destill. 3ij.

M. S. Ins Auge zu tröpfeln.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Maitre-Jean.

152 AMMONIUM CARBONICUM PYRO - OLEOSUM.

298. *Ry.* Ammon. carbon. pyro - oleos. gr. xij
Fellis tauri inspiss. $\mathfrak{3j}$
Mellis despum. $\mathfrak{3iij}$.

M. S. Mit einem Pinsel täglich mehreremale auf den verdunkelten Fleck zu bringen.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Richter.

299. *Ry.* Ammon. carbon. pyro - oleos. $\mathfrak{3\beta}$
Fellis tauri rec.
Aquaе destill. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3ij}$
Spir. vini saponat. $\mathfrak{3iij}$.

S. S. Täglich 3 mal warm in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei atrophischen Kindern.

Vogt.

300. *Ry.* Ungt. althaeae $\mathfrak{3\beta}$
Fellis tauri rec.
Sapon. medic. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3j\beta}$
Petrolei
Ammon. carbon. pyro - oleos. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3j}$
Camphorae $\mathfrak{3\beta}$.
M. f. unguentum.

S. Dreistündlich einen Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Gegen Mesenterialschmerzen.

Hufeland.

301. *Ry.* Emplast. de galbano - crocat. $\mathfrak{3j}$
Camphorae
Ammon. carbon. pyro - oleos. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3\beta}$
Olei cajeput. gutt. xl.
M. f. emplastr.

S. Auf Leder gestrichen über die ganze Magen-
gegend zu legen.

Anwend. Gegen krampfhaftes Erbrechen, Seekrankheit u. s. w.

Sundelin.

Ammonii carbonici pyro-oleosi Liquor; brenzlich-ölige kohlensaure Ammoniumflüssigkeit.

(*Spiritus s. Liquor Cornu Cervi rectificatus; rectificirter Hirschhornggeist.*)

Form u. Gabe. *Rein in Thee oder in Mixturen zu 20—40 Tropfen, mehrmals täglich.*

302. *Ry.* Camphorae trit. gr. xij
Gummi mimos. pulv. $\mathfrak{z}$ ij.

Terendo misce sensim cum

Syrup. menthae $\mathfrak{z}$ j

Aquae menthae pip. $\mathfrak{z}$ v.

F. emuls., cui adde

Liqu. ammon. carb. pyro-oleos. $\mathfrak{z}$ ij—iv.

M. D. S. Umgeschüttelt zweistündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Krämpfen und Lähmung, hysterischen und hypochondrischen Beschwerden.

Phöbus.

303. *Ry.* Liqu. ammon. carb. pyro-oleos. $\mathfrak{z}\beta$

Aquae chamomill $\mathfrak{z}$ ij

Syrup. fl. aurant. $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Stündlich einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Krämpfe der Säuglinge.

Wendt.

304. *Ry.* Liqu. ammon. carb. pyro-oleos. $\mathfrak{z}$ j

Acet. scillit. $\mathfrak{z}$ iβ

Syr. mannae $\mathfrak{z}\text{ij}$

Laud. liqu. Syd. gutt. ijj .

M. S. Aller 2—3 Stunden 15—20 Tropfen.

Anwend. Gegen krampfhafte Urinverhaltung kleiner Kinder.

Henke.

E. Ammonii caustici Liquor; Aetzammoniumflüssigkeit.

(*Amm. liquid. causticum, Spiritus Salis ammoniaci causticus, Sal alcali fluor; ätzender Salmiakgeist.*)

Form u. Gabe. In schleimigen Vehikeln rein oder in Mixturen zu 5—10 Tropfen, mehrmals täglich. Aeusserlich als Riechmittel, zu Einspritzungen, Waschungen, Einreibungen, Salben, Aetzmittel.

Man vermeide Verbindungen mit allen Säuren, sauren, besonders Metallsalzen, alkaloidischen Vegetabilien, namentlich Opium und narkotischen Tinkturen.

305. *Ry.* Liqu. ammon. caust. gutt. vj—vii
Aquae menthae crisp. $\mathfrak{z}\beta$
„ destill. $\mathfrak{z}\text{v}$.

M. S. Auf ein- oder zweimal zu nehmen.

Anwend. Gegen saures Aufstossen während der Verdauung.

Chevallier.

306. *Ry.* Liqu. ammon. caust. $\mathfrak{z}\text{j}$
Aquae chamomill. $\mathfrak{z}\text{iv}$
Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Durchfälle und Ruhren.

Keck.

307. *Ry.* Liqu. ammon. caust.
 Aether. sulphur. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij
 Aquae menthae pip. vin. $\bar{3}$ iv
 Syrup. cinnamom. $\bar{3}$ j.

M. S. Stündlich einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Vipernbiss.

Remer.

308. *Ry.* Liqu. ammon. caust. gutt. xx.
 Aquae commun. $\bar{3}$ iv.

M. S. Alle halbe Stunden 2—3 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen höhere Grade von Trunkenheit.

Piazza.

309. *Ry.* Liqu. ammon. caust. gutt. xx—xxx
 Aquae tiliae $\bar{3}$ ijß
 Syrup. althaeae $\bar{3}$ ß.

M. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen Epilepsie. Solche Kranke sollen diese Mischung bei sich tragen und, so wie sich die Aura einstellt, sie schnell austrinken, wodurch der Anfall oft noch beseitigt oder verzögert, und hierdurch auch radikal geheilt werden kann.

Martinet.

310. *Ry.* Sapon. hispan. albi gr. iij.

Solve in

Spirit. vini alcoholis. $\bar{3}$ j.

Filtra et adde

Acid. succin. rectific. $\bar{3}$ ß

Liqu. ammon. caust. $\bar{3}$ ij.

Perpetua agitatione misceantur, usque dum colorem lacteum acquisiverint.

D. S. Täglich 5—20 Tropfen in Wasser oder Thee zu nehmen; äusserlich als Riechmittel.

Aqua Luciae (Eau de Luce).

Anwend. Gegen Schlangenbiss, giftigen Insekten- und Vipernstich, Schwindel, Hysteriasis. Mit Weingeist verdünnt gegen Sommersprossen, Mitesser als Waschwasser.

311. *Ry.* Liqu. ammon. caust. $\mathfrak{Zij}$
 Olei menthae pip $\mathfrak{Zij}$
 Aether. sulphur. $\mathfrak{Zj}$.
M. S. In die Umgegend des Auges tropfenweise
 einzureiben, oder auch auf der Hand gegen das
 Auge verdunsten zu lassen.
Anwend. Gegen asthenische Amblyopie, Amaurose und Au-
 genliderlähmung.

v. Gräfe.

312. *Ry.* Olei Sabinae $\mathfrak{Zj}$
 Tinct. opii croc. $\mathfrak{3\beta}$
 Liqu. ammon. caust. $\mathfrak{3iij}$.
M. S. Umgeschüttelt einen Theelöffel voll vor
 dem Schmerzanfall in die Augenbraunengegend
 einzureiben.
Anwend. Bei arthritischer Irltis.

Fischer & Weller.

313. *Ry.* Liqu. ammon. caust. gutt. x
 Olei nucum jugland. $\mathfrak{3\beta}$.
M. S. Mit einem Pinsel auf die verdunkelten Stel-
 len aufzustreichen.
Anwend. Gegen Hornhautflecke. Man vermehrt die Menge
 des Ammonium nach Verhältniss als das Auge reizloser
 wird.

v. Gräfe.

314. *Ry.* Olei amygdal. $\mathfrak{3j}$
 Liqu. ammon. caust. gutt. vj
 Tinct. opii simpl. gutt. x.
M. S. Umgeschüttelt einen Theelöffel voll in das
 zuvor durch Injektion von Seifenwasser gereinigte
 Ohr zu giessen.
Anwend. Bei Otorrhoe, deren Ursache unbekannt, als empiri-
 sches Mittel.

Rust.

315. *Rx.* Caric. siccāt.
 Rad. althaeae āā 3vj
 Lact. vaccin. 3xvj.
 Coque ad reman. 3xij. Adde
 Ammon. liquidi 3β—3vj.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Bei hartnäckiger Bräune.

Pringle.

316. *Rx.* Liqu. ammon. caust. 3iv
 Lact. vaccin. 3iv.

M. S. Dreimal täglich in die Mutterscheide zu spritzen.

Anwend. Gegen unterdrückten Monatsfluss.

Lavagna.

317. *Rx.* Spirit. sal. ammon. 3j
 „ camphor. 3iij
 Petrolei 3jβ.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Frostbeulen.

Spielmann.

318. *Rx.* Ammon. liquidi 3ij
 Olei olivar. 3ij
 Camphorae 3j
 Aquae theriacalis. 3j.

M. D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei chronischen Rheumatismen und erst entstandenen Milchknoten.

Fuller.

319. *Ry.* Liqu. ammon. caust. $\bar{3}j$
 Spirit. frument. $\bar{3}ij$.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei rheumatischen Affektionen der Gelenke, bei Schwäche der Muskeln und Bänder in Folge starker Ausdehnung oder Quetschung derselben.

Walther.

320. *Ry.* Ammon. liquid. $\bar{3}j$
 Alcohol. $\bar{3}j$
 Essent. terebinth. $\bar{3}ij$.

M. agitando.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei Oedem.

Werthof.

321. *Ry.* Liqu. ammon. caust.
 Olei animal. foetid. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Ungt. hydrargyr. ciner. $\bar{3}ij$.

M. S. Zum Einreiben längs des Samenstranges oder auf dem Testikel.

Anwend. Bei chronisch verhärtetem Testikel.

G. A. Richter.

322. *Ry.* Ungt. resin. pini burg. $\bar{3}j$
 Camphorae. trit.
 Petrolei
 Olei terebinth. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 „ rorismarini $\bar{3}j$
 „ bergam. gutt. xij
 Liqu. ammon. caust $\bar{3}ij$.

M. D. S. Zum Einreiben.

Unguentum [nervinum Pharm. paup. Berol.

323. *Ry.* Axung. porc. $\bar{3}j$
Sevi ovilli gr. vj .
M. exacte, adde
Ammon. liquidi $\bar{3}j$.

M. S. Trousseau's Ammoniaksalbe.

Anwend. Ein- bis zweimalige Anwendung dieser Salbe entfernt in Verlauf von 8–10 Minuten die Oberhaut zum Auflegen endermischer Mittel.

324. *Ry.* Sevi ovilli
Olei olivarum $\bar{a}a$ part. j
Leni calore liquefacta in lagenam vitream effunde
et admisce
Ammon. liquid. part. ij .
Agita donec mixtura concreverit.

D. S. Auf die Haut zu streichen und mit einem Pflaster zu bedecken.

Pomatum s. Causticum ammoniacale Gondreti.

Anwend. Um eine schnelle und starke Ableitung zu machen und die Oberhaut zu entfernen, namentlich bei grauen und schwarzen Staaren, Taubheit, Gehirnaffektionen u. s. w. Als Reiz- oder Zertheilungsmittel reibt man die Salbe ein, als hautröthendes Mittel streicht man sie 1–2''' dick auf Leinwand und lässt sie 8 Minuten liegen, als blasenziehendes Mittel lässt man sie aber ohngefähr 30 Minuten liegen.

325. *Ry.* Liqu. ammon. caustici $\bar{3}j$
Olei papaver. $\bar{3}ij$.
M. exacte, donec coierint in massam unguinosam.

D. S. Zum Einreiben.

Linimentum volatile s. ammoniatum;
flüchtige Salbe.

Anwend. Bei Rheumatismen.

326. *Rx.* Sapon. commun. $\mathfrak{z}\beta$
 Aquae commun. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 Spirit. frument. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Liqu. ammon. caust. $\mathfrak{z}\text{xx}$.

M. S. Zum Einreiben.

Linimentum saponato-ammoniatum; seifenhaltiges Ammoniakliniment.

Eben so billig und reinlicher als die flüchtige Salbe.

Ammonii Liquor anisatus; anishaltiger Salmiakgeist.

(*Spirit. Sal. ammon. anis.; anishaltige Ammoniakflüssigkeit.*)

Form u. Gabe. Mit einem schleimigen Syrup oder in Mixturen zu 5—30 Tropfen, mehrmals täglich. Aeusserlich zu Injektionen, Einreibungen, Salben.

327. *Rx.* Rad. senegae $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Cort. cascarill. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.
 Coque c. aquae comm. $\mathfrak{z}\text{x}$ ad col. $\mathfrak{z}\text{vj}$. Adde
 Gummi mimos. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Liqu. ammon. anis. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 Syrup. balsam. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Atonie und atonische Verschleimung der Lungen.

Sundelin.

328. *Rx.* Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\text{j}$
 Liqu. ammon. anis. $\mathfrak{z}\text{j}$ — $\mathfrak{z}\text{j}$
 Extr. hyoscyam. $\mathfrak{z}\beta$ — j .

M. S. Täglich 3 mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Brustsaft bei nervösen Fiebern mit Brustleiden, bei

chronischem Lungenkatarrh, bei Pneumonie und Bronchitis nach gehobener Entzündung, bei Asthma, atonischer Flatulenz, Tympanitis, Stickfluss, Scrofeln u. s. w.

L. W. Sachs.

329. Rx. Liqu. ammon. anis.
Vini stibiat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
Decoct. rad. althaeae $\bar{3}\nu$
Syrup. opiat. $\bar{3}j$.

M. S. Alle Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Schubarth.

330. Rx. Extr. helenii $\bar{3}ij$
„ liquirit. $\bar{3}j$.

Solve in

Aquae foeniculi $\bar{3}iv$.

Adde

Liqu. ammon. anis. $\bar{3}ij$.

M. D. S. Umgeschüttelt 4mal täglich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei chronischem Lungenkatarrh.

Phöbus,

331. Rx. Decoct. althaeae $\bar{3}ij$
Olei amygdal. dulc.
Pulv. gumm. mimos. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
Liqu. ammon. anis. gutt. xxv
Sachari cand. $\bar{3}j$.

M. S. Stündlich oder 2stündlich 2 Theelöffel voll.

Anwend. In allen Krankheiten der Schleimhäute der Kinder von einigen Monaten bis zu 2 Jahren, die von gestörter Hautverrichtung entstehen, als Koliken, Diarrhöen, Stuhlzwang u. s. w. Ist dabei heftiges Fieber, statt des Liqu. amm. anis., Natri nitric. $\bar{3}\beta$; ist der Durchfall sehr wässerig, so wird 1 gr. Pulv. rad. ipecac. zugesetzt.

Fricke.

332. R_y. Liqu. ammon. anis. 3j
Spirit. lavendul. 3ij.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen anhaltendes Schluchzen der Kinder.

v. Siebold.

333. R_y. Liqu. ammon. anis. 3j
Ungt. nervin. 3ß.

M. exacte.

S. Morgens und Abends einer Haselnuss gross in
Brust oder Unterleib einzureiben.

Anwend. Als krampfstillendes, beruhigendes, karminatives Mit-
tel in nicht fieberhaften Zuständen der Kinder.

Tortual.

Ammonii Liquor vinosus; weiniger
Salmiakgeist.

(*Spirit. Sal. ammoniaci vinosus, Alcohol am-
moniatum; weinige, geistige Ammonium-
flüssigkeit.*)

Form u. Gabe. In Auflösungen zu 10 — 30 Tro-
pfen. Häufiger äusserlich nach Quetschungen, bei kalten
Geschwülsten, Kontrakturen, Blutergüssen u. s. w., nament-
lich von Dzondi empfohlen.

F. Ammonium muriaticum; salzsaures
Ammonium.

(*Sal ammoniacum, Hydrochloras ammonicus;
Salmiak.*)

Form u. Gabe. Selten in Pulver, zweckmässiger
in Auflösungen, Pillen, Bissen, Lattwergen zu gr. v—xx,

mehrmals täglich. Aeusserlich zu Mund- und Gurgelwässern, Waschungen, Fomentationen, Injektionen, Salben, Bädern u. s. w.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Kali, Kalk, Magnesia, alkalischen und metallischen Salzen, Schwefelsäure, Salpetersäure und derartigen erdigen und Metallsalsalzen, Metalloxyde, Schwefellebern, Seifen u. s. w.

334. *Ry.* Ammon. muriat.
 Kali nitrici $\overline{aa}$ $\text{℥}\beta$ — $\text{℥}ij$
 Syrup. sacch. $\text{℥}\beta$
 Aquae amygdal. amar. dil. $\text{℥}iv$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen akute sowohl, als chronische Katarrhe sehr hilfreich.

Radius.

335. *Ry.* Ammon. muriat. $\text{℥}ij$
 Kali nitrici $\text{℥}iv$
 Aquae rubi idaei $\text{℥}vj$
 Syrup. fl. naphae $\text{℥}iiij$.

M. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

Potio temperans.

Anwend. Im ersten Zeitraume rheumatischer, katarrhalischer und exanthematischer Fieber, zur Mässigung der Fieberbewegungen und Beförderung einer allgemeinen mässigen Hautausdünstung.

Clarus.

336. *Ry.* Ammon. muriat. gr. v — $\text{℥}j$.
 Solve in
 Aquae foeniculi $\text{℥}j$.
 Adde
 Syrup. amygdal. $\text{℥}\beta$.

M. S. Umgeschüttelt zweistündlich 1 Theelöffel.

Anwend. Für Säuglinge bei Husten, Röcheln, Durchfall.

Mufeland.

337. *Ry.* Ammon. muriat. dep.
 Succ. liquirit. dep. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij.
 Solve in
 Aquae fl. tiliae $\bar{3}$ vj.
M. D. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.*
Anwend. Im Katarrhalfieber.

Richter.

338. *Ry.* Ammon. muriat. dep.
 Vini stibiat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j
 Aquae fl. chamomill. $\bar{3}$ x
 Oxymell. simpl. $\bar{3}$ ij.
M. D. S. *Stündlich eine Tasse voll.*
Anwend. In katarrhalischen Brustaffektionen.

Selle.

339. *Ry.* Amygdal. dulc. excort. $\bar{3}$ j
 Aquae rubi idaei $\bar{3}$ x.
 F. l. a. emuls., in qua solve
 Ammon. muriat. dep. $\bar{3}$ ij
 Sacchari q. s. ad grat. saporem.
M. D. S. *Alle 2 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.*
Anwend. in ähnlichen Fällen.

Vogel.

340. *Ry.* Ammon. muriat. dep. $\bar{3}$ j
 Tart. stibiat. gr. j.
 Solve in
 Aquae chamomill. $\bar{3}$ vj.
 Adde
 Oxymell. simpl. $\bar{3}$ j.
M. D. S. *Aller 2—3 Stunden 2 Esslöffel.*
Anwend. Bei Verschleimungen.

Berends.

341. *Ry.* Ammon. muriat. dep.
 Succ. liquirit. āā ʒj
 Extr. taraxaci vel cent. min. q. s. ut f. bolus.
 Dent. tal. doses q. v.

S. Aller 2—4 Stunden 1 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Skirrhus der Vorsteherdrüse, der Häute der Blase, des Mastdarms, der Speiseröhre u. s. w.

Fischer.

342. *Ry.* Ammon. muriat. dep. ʒβ
 Extr. fumariae ʒvj.
 Solve in
 Aquae petroselini ʒvj
 Spirit. nitrico-aeth. ʒij
 Syr. cort. aurant. ʒvj.

M. D. S. Aller 3—4 Stunden einen Löffel voll.

Anwend. Gegen Blasenkrankheiten.

Vogt.

343. *Ry.* Ammon. muriat. dep. ʒiij
 Succ. liquirit. ʒvj.
 Solve in
 Decoct. hordei ʒvj.
 Adde
 Vini stibiati ʒij
 Aquae laurocerasi ʒβ
 Syrup. althaeae ʒvj.

M. D. S. Aller 2—3 Stunden einen Löffel voll.

Anwend. Bei entzündlichen Affektionen der Schleimhäute, namentlich bei Angina rheumatica, Catarrhus inflammatorius, sog. Pneumonia rheumatica, selbst auch Bronchitis und ähnlichen Formen unter leicht einzusehenden Verhältnissen, bei Dysenteria inflammatoria, Urethritis und Elythritus u. s. w.

Vogt.

344. *Rx.* Ammon. muriat. 3ij
 Asae foetidae
 Aloes āā 3j
 Extr. liquirit. 3ijß.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnam. D. ad vitr.
S. Täglich 3mal 6—10 Stück.

Anwend. Bei hartnäckiger Verstopfung des Unterleibes von Infarkten, Auftreibungen der parenchymat. Eingeweide von stockendem Blute u. s. w.

Radius.

345. *Rx.* Sulphur. dep. gr. v
 Ammon. muriat. dep. 3ß
 Extr. dulcamar. q. s. ut f. bolus.
 Consp. pulv. croci. Disp. tal. dos. xij.
D. S. Zweistündlich 1 Stück.

Anwend. Bei katarrhalischen Brustaffektionen u. s. w.

Phöbus.

346. *Rx.* Ammoniaci dep. 3j
 Ammon. muriat. dep.
 Sem. anisi stell. āā 3ij
 Extr. liquirit. q. s. ut. f. boli xij.
 Consp. sem. lycop.
D. S. 4—6 mal täglich ein Stück.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Phöbus.

347. *Rx.* Ammon. muriat. dep.
 Pulv. rad. liquirit. āā 3iij.
 M. f. pulv. Div. in ix part. aequ. D. in charta cerata.
S. Dreistündlich ein Pulver.

Anwend. Gegen chronische Schleimflüsse und Verdickung der Schleimhäute, besonders in den Harnwerkzeugen.

Büttner.

348. *Ry.* Ammon. muriat. dep. 3ij
Camphorae gr. vj
Flor. arnicae 3ß
Sacchari albi 3vj.

M. f. pulv. D. in vitro.

S. Drei- bis viermal täglich einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Als Expectorans und Emmenagogum.

Berends.

- 349 *Ry.* Ammon. muriat. dep. 3j
Flor. sulphur. 3ß
Extr. opii aquos. gr. ij
Pulv. gummos. 3vj
Elaeosacch. foeniculi 3ij.

M. f. pulvis.

D. S. Täglich 3mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfs.

Richter.

350. *Ry.* Cort. peruviani fusc. alcohol. 3vj
Ammon. muriat. dep. 3ij
Pulv. cort. cinnam. 3j
Syrup. cort. aurant. 3iij.

M f. electuarium.

D. S. Täglich viermal einen grossen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend Bei Wechselfiebern.

Vogt.

351. *Ry.* Ammon. muriat. 3j
Cacariae ustae 3ij.

Seorsim pulverata misce et immitte statim in vitrum obturamento vitreo claudendum.

S. Riechpulver.

Anwend. Bei Ohnmachten.

Vogt.

Dasselbe empfiehlt vor Schlafengehen in den Strumpf zu streuen gegen unterdrückte Fusschweisse.

Rüte.

352. *Ry.* Ammon. muriat. $\mathfrak{z}$ j
Aquaе font. $\mathfrak{z}$ xij
Oxymell. simpl. $\mathfrak{z}$ j.

M. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei leichten Entzündungen der inneren Wände des Mundes und des Rachens.

Foj.

353. *Ry.* Ammon. muriat. gr. xij
Camphorae gr. xx
Decoct. chinae $\mathfrak{z}$ vj.

M. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei Angina gangraenosa.

Hôt. Dieu.

354. *Ry.* Ammon. muriat. dep.
Sacch. alb. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$.
Solve in
Aquaе menthae pip. $\mathfrak{z}\beta$.
Filtr.

D. Augewasser, Anfangs aufzupinseln, später einzutröpfeln.

Anwend. Bei adynamischen Hornhauttrübungen.

Jingken.

355. *Ry.* Ammon. muriat. dep. 3ß.

Solve in

Aquae font 3v.

S. Mehrmals täglich in die Augen zu tröpfeln.

Anwend. Gegen Hornhautverdunkelungen.

B. Bell.

356. *Ry.* Aquae calcis 3j

Ammon. muriat. dep. gr. v

Aerugin. gr. ß.

M. S. Anfangs mit der Hälfte Rosenwasser verdünnt in das Auge zu tröpfeln.

Aqua saphirina Tylori.

Anwend. Gegen chronische, torpide Augenblennorrhöen.

Taylor.

357. *Ry.* Ammon. muriat. dep. gr. xv

Zinci sulphurici 3ß.

Solve in

Aquae destill. 3v.

Adde

Camphorae in 3j Alcoh. p. s. 0,850 solut. gr. ix

Croci minut. conc. gr. ij.

Mixt. dig. l. a. cal. therm. Réaum. + 30—35

saepe agitando ad perf. croci extract. Refr. filtra.

S. Mit gleichen Theilen Wassers verdünnt als Augenwasser.

Collyrium adstringens luteum Fischeri.

Anwend. Gegen hartnäckige Augenkatarre, überhaupt bei grosser reiner Erschlaffung, oder bei heftigem Brennen der Augenlider. Ein vom Grafen Clam Martinitz erkaufte und vom Prof. Fischer in Prag mitgetheilte Gehelmmittel.

358. *Ry.* Ammon. muriat. 3ij—iv

Aquae. font. 3x

Aceti commun. 3vj.

S. S. Zum Befeuchten der Kompressen.

Anwend. Bei Quetschungen, Blutaustretungen u. s. w.

359. *Ry.* Ammon. muriat. ℥ij
Aceti vini ℥vj .

S. S. Zertheilende Bäsung.

Anwend. Gegen Blutaderknoten Schwangerer..

Tode. Richter.

360. *Ry.* Ammon. muriat. ℥β—j
Aceti scillit. ℥ij—iij
Aquae dest. ℥x—xij .

S. S. Zum Umschlagen.

Anwend. Gegen Wasserbruch der Kinder, zur Zertheilung von Ausschwitzungen anderer Art, z. B. Kopfblutgeschwulst Neugeborener.

v. Gräfe.

- 36 . *Ry.* Ammon. muriat. ℥j—ij
Aquae rutae ℥ix
Aceti rutae ℥iv
Tinct. arnicae ℥j—ij .

M. D. Zum Anfeuchten der Kompressen.

Anwend. Etne treffliche antiplhlogistische Fomentation bei Kon-
tusionen, Quetschwunden mit Extravasat, überhaupt da,
wo man einer zerstörenden, entzündlichen Reaktion vor-
beugen will und eine rege Resorption des krankhaft Ergos-
senen oder Exhalirten einzuleiten beabsichtigt, wie z. B.
bei Hydrocele.

Carus.

362. *Ry.* Ammon. muriat. ℥β
Spirit. frument. ℥ij
Aquae font. ℥xvj—xx .

S. S. Mittelst Kompressen die kranken Theile zu
bähen.

Aqua discussoria Vogleri.

Anwend. Zur Zertheilung von Quetschungen, Anschwellun-
gen, Gelenkwassersucht, Lymphgeschwülsten, Hygromen

mehrere Wochen hindurch abwechselnd mit warmen Brei-
umschlägen. — Zur Zertheilung des Oedems der Vorhaut
und der Schamlippen.

Vogler.

363. *Ry.* Ammon. muriat. pulv. $\mathfrak{z}\text{j}$
Tinct. spirit. roris marini $\mathfrak{z}\text{j}$.

S. S. Lauwarm Kompressen damit zu befeuchten.

Fomentum resolvens Brerae.

Anwend. Bei schmerzlosen Milchkongestionen, welche ein skir-
rhöses Ansehen heucheln, sehr empfohlen.

Brera.

364. *Ry.* Ammon. muriat. $\mathfrak{z}\text{ij}$
Aquaе font. $\mathfrak{z}\text{iv}$
Aquaе coloniens. vel Spirit. vini camph. $\mathfrak{z}\text{j}$ — ij .

S. S. Zu Bähungen.

Anwend. Gegen Frostbeulen im ersten und leichten Grade
der Erfrierung.

Rust.

365. *Ry.* Ammon. muriat. $\mathfrak{z}\text{j}$
Opii crudi $\mathfrak{z}\beta$
Farinae secalin. $\mathfrak{z}\text{iv}$
Aceti fervent. dilut. q. s.
ut f. cataplasma.

S. Kalt auf die Stirn zu legen.

Cataplasma cephalicum Vogleri.

Anwend. Gegen gichtischen und rheumatischen Kopfschmerz.

Vogler.

366. *Ry.* Panis triticei sicci contrit. $\bar{3}v$
 Semin. lini cont. $\bar{3}j$
 Ammon. muriat. comm. pulv. $\bar{3}j$
 Aquae bullient. q. s. ut f. cataplasma.

Cataplasma ammoniacale Vogleri.

Anwend. Zur Zertheilung von Drüsen- und andern Geschwülsten in den Brüsten, der Parotis; bei Harnverhaltung auf die Blasengegend.

Vogler.

367. *Ry.* Ammon. muriat.
 Sapon. veneti
 Herb. hyoscyami pulv. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Semin. lini cont. $\bar{3}j\beta$
 Aquae ferv. q. s. ut f. cataplasma.

S. Warm überzulegen.

Anwend. Zur Zertheilung von Milchknoten in den Brüsten.

Vogler.

368. *Ry.* Cataplasma. emollient. $\bar{3}iv$
 Oxyd. plumb. albi $\bar{3}j$
 Ammon. muriat. $\bar{3}\beta$.

M. S. Zum Umschlag.

Anwend. Zur sanften Stimulirung entzündlicher Geschwülste, welche in Verhärtung überzugehen drohen.

Hop. d. Vénér.

G. Ammonium nitricum; salpetersaures Ammonium.

Form u. Gabe. In Auflösung zu gr. $\text{ii}j - x$, täglich mehrmals.

Man vermeide dieselben Verbindungen welche bei Ammonium carbonicum angegeben worden sind.

369. Ry. Ammon. carbon. dep. 3j
Acidi nitric. q. s. ad. neutralisationem.

Adde

Aquae destill. 3iij

Syrup. althaeae 3j .

M. D. S. Zweistündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Als temperirendes Mittel in verschiedenen Reiz- und Ausschlagsfiebern, als harntreibendes Mittel in erethistischen Wassersuchten.

Berends.

H. Ammonii succinici Liquor; bernsteinsaure Ammoniumflüssigkeit.

(Liqu. ammon. pyro-oleosi succinici, Spiritus s. Liqu. Cornu Cervi succinatus, Liqu. succinatis Ammoniae; bernsteinsaurer Hirschhorngest.)

Form u. Gabe. Allein oder in wässerigen und geistigen Mixturen zu 20 — 60 Tropfen täglich, mehrmals.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, schwefels., salzs., phosphors., salpeters., weinsteins. und Eisensalzen.

370. *Ry.* Liqu. ammon. succin.
 Spirit. sulphur. aether. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 (Olei cajeput. gutt. $\bar{v}j$).

M. D. S. *Aller 3 Stunden 20—30 Tropfen.*

Liquor antarthriticus Elleri.

Anwend. Bei asthenisch-krampfhafter, namentlich retrograder Gicht, sporad. Cholera, Krämpfen u. s. w.

Eller.

371. *Ry.* Tinct. castor. aeth. $\bar{3}j$
 „ valerian.
 Liqu. ammon. succin. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

M. D. S. *Umgeschüttelt aller 1 — 1½ Stunden 20—30 Tropfen.*

Anwend. Bei krampfhaften Anfällen Hysterischer.

Phöbus.

372. *Ry.* Liqu. ammon. succin. $\bar{3}j$
 Elix. pector. Wedelii $\bar{3}ij$
 Syrup. diacodii $\bar{3}ij$
 Aquae foeniculi $\bar{3}ij$.

M. D. S. *Umgeschüttelt 2 stündlich einen Theelöffel.*

Anwend. Gegen veraltete Brustkatarrhe mit Krampfhusten und grosser Spannung.

Bagliv. Jahn.

373. *Ry.* Moschi gr. iv.
 Tere cum

Sacchari albi $\bar{3}j$

Aquae fl. sambuci $\bar{3}v$

Liqu. ammon. succinici $\bar{3}j$

Tinct. opii croc. gutt. xv
Syrup. amygdal. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Umgeschüttelt stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. In nervösen Masern beim Rücktritt des Exanthems und darauf folgenden Krampfszufällen.

Hufeland.

374. *Ry.* Infus. rad. valerian. min. ($\bar{3}$ ij) $\bar{3}$ iv
Liqu. ammon. succin. $\bar{3}$ j
Syr. fl. aurant. $\bar{3}$ j.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen asthenische Blattern.

Wendt.

375. *Ry.* Liqu. ammon. succin. gutt. vj—xij
Aquae foenicul. vel meliss. $\bar{3}$ j
Syrup. althaeae $\bar{3}$ ij.

M. S. Täglich 4—6mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Bei Augenentzündung Neugeborener.

Benedict.

376. *Ry.* Liqu. ammon. succin. $\bar{3}$ j
Aquae fl. tiliae $\bar{3}$ ij
Syrup. fl. aurant. $\bar{3}$ j.

M. S. Alle $\frac{1}{2}$ Stunden 1—2 Theelöffel.

Anwend. Gegen Krämpfe zarter Kinder.

Wendt.

377. *Ry.* Liqu. ammon. succin.
Aether. sulphur.

Laud. liqu. Syd.

Tinct. ipecacuanh. āā 3j.

M. S. Dreimal täglich 24 Tropfen in einem Glase Wasser.

Liquor antarthriticus de St. Marie.

Anwend. Statt der Ellerschen Tropfen, stark schweisstreibend, wenn der Kranke dabei zu viel warmes Getränk trinkt.

378. *Rx.* Liqu. ammon. succin. 3j

Olei camphorat. 3ij.

M. f. liniment.

S. Mittelst eines Stückes Flanell, welches man aller 4—6 Stunden damit tränkt, vorn auf den Hals anzuwenden.

Anwend. Gegen Angina.

Pringle.

379. *Rx.* Olei hyoscyam. infus. 3j

Liqu. ammon. caust.

„ „ succin.

Tinct. opii crocat. āā 3ij.

M. f. liniment.

S. Zweistündlich 1 Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben.

Linimentum antispasmodicum Starkii.

I. Ammonii sulphurati Liquor; Ammonium-Schwefelleber.

(*Liquor Beguini, Liqu. fumans Boylii, Liqu. Amm. hydrothionosi, Hepar Sulphuris volatile; flüssiges hydrothionichtsures Ammoniak, flüchtige Schwefelleber.*)

Form u. Gabe. Verdünnt zu 2—5 Tropfen, täglich 2—4mal; äusserlich zu Einreibungen und Salben.

Man vermeide Säuren, saure Salze, Metalle.

380. Rx. Liqu. ammon. sulphurat. gutt. viij
Aquae melissae $\overline{3}$ iv.

M. S. Täglich 2—4mal 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen Arthritis nodosa, Kontrakturen, Harnruhr.

Hufeland.

381. Rx. Liqu. ammon. sulphurat.
Tinct. opii simpl. $\overline{aa}$ gutt. xxxij
Aquae destill. $\overline{3}$ ij
„ cinnam. $\overline{3}$ j.

M. S. Aller 3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Harnruhr, Gicht u. s. w.

Schubarth.

382. Rx. Olei papaver. alb. $\overline{3}$ j
Liqu. ammon. sulphurat. $\overline{3}$ ij.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Pruritus vulvae.

Phöbus.

383. *Ry.* Cretae albae pulv. ℥j
 Sulphur. dep.
 Adipis suilli
 Resin. pini empyreum. liqu. āā ʒβ
 Liqu. ammon. sulphurat. ℥β.

M. f. unguent. D. in vitro orificio amplo, epistomio clauso.

S. Abends auf eine 1—2 Handbreit grosse Stelle freigebig einzureiben, am zweiten Tage abzuwaschen; wenn sich eine Stelle gereinigt hat, auf eine andere überzugehen.

Anwend. Bei chronischen Exanthemen, besonders Psoriasis, Lepra, Prurigo, selbst Tinea capitis und Porrigo. Zugleich innere Behandlung mit Calomel, Plummerschen Pulvern u. s. w.

Wilkinson.

Amygdālae amarae. Bittere Mandeln.

(Amygdalus communis L. variet. A. amara.)

Form u. Gabe. In Substanz (von der braunen Schale oder Haut durch Abbrühen befreit) oder in Emulsionen zu ℥j—xij täglich; äusserlich in Pulver, Pasten, Waschwässern u. Salben.

384. *Ry.* Amygdal. amar. excort. ʒij
 Aquae font. q. s. ut f. l. a. emuls. ʒj.
 Cui adde
 Extr. centaur. min. ʒβ
 Tinct. opii crocat. ℥j.

M. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen Wechselstieber vor dem Anfalle.

Remer.

385. *Rx.* Amygdal. amar. $\mathfrak{Zij}$
 Aquae commun. $\mathfrak{Ziij}$.
 F. l. a. emuls. In colat. solve
 Extr. gentian. $\mathfrak{3\beta}$
 Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{Zij}$.

M. S. Eine Stunde vor dem Anfalle zu nehmen.

Anwend. Bei einfachen Tertian-, besonders Frühlingsfiebern.

C. J. Meyer.

386. *Rx.* Amygd. amar. excort. $\mathfrak{3j\beta}$
 Aquae tiliae $\mathfrak{Ziv}$
 Syrup. althaeae $\mathfrak{Zj}$.

M. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Wendt.

387. *Rx.* Amygdal. amar. excort. $\mathfrak{Zij}$
 Olei papav. rec. $\mathfrak{Ziij}$.
 Tere cum
 Sacchar. alb. $\mathfrak{Zij}$
 Mucil. gumm. mimos. $\mathfrak{Zj}$.
 Affunde sensim
 Aquae meliss. $\mathfrak{Ziv}$.
 Fiat l. a. emulsio.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Erethismus der Nerven.

Sinogowitz.

388. *Rx.* Amygdal. amar. $\mathfrak{Zij}$
 „ „ dulc. $\mathfrak{Zj}$
 Aquae rosar. $\mathfrak{Zv}$

Flor. benzoës ℥j.
 M. f. l. a. emulsio.
 S. Zum Waschen.

Lac virginum (Lait virginal).

Anwend. Gegen Finnen und Schwiaden.

Dict. des sc. méd.

389. R_y. Amygd. amar. excort. ℥β.

Tere cum

Aquae destill. ℥vii
 ut f. l. a. emulsio.

D. S. Waschwasser.

Anwend. Gegen langwieriges allgemeines Hautjucken mit hartnäckigem Blasenausschlage.

G. A. Richter.

390. R_y. Amygdal. amar. ℥ivβ

Pinearum ℥jβ.

Tere in pulv. subt.; adde
 Vitella ovor. iij.

M. D. S. Zum Waschen.

Anwend. Um die Haut weich zu erhalten und vor Aufspringen zu bewahren.

P. Frank.

391. R_y. Amygdal. amar. excort. ℥iv

Albi ovi j

Spirit. vini rectific.

Aquae rosarum āā q. s.

ut f. contundendo pasta.

S. Zum Waschen.

Anwend. Zu gleichen Zwecken.

392. *Ry.* Amygdal. amar. $\bar{3}\beta$
 Semin. hyoscyam. $\bar{3}j$
 Aquae font. $\bar{3}viiij.$
 M. f. l. a. emulsio.

S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Psyracien und ähnliche schmerzhaftige Haut-
 ausschläge.

Fuchs.

393. *Ry.* Amygdal. amar. excort.
 Oryzae semin. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}viiij$
 Farin. fabar. $\bar{3}xvj$
 Myrrhae $\bar{3}ij$
 Camphorae $\bar{3}\beta$
 Sapon. venet. $\bar{3}xx.$

Contunde et misce, f. pasta cosmetica.

Anwend. Gegen spröde Haut.

Spielmann.

394. *Ry.* Amygdal. amar. excort.
 „ „ dulc. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Camphorae
 Cetacei $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$ } c. spirit. vini trit.
 Vitelli ovi j.
 M. f. unguentum.

S. Pomade.

Anwend. Gegen aufgesprungene und spröde Haut.

Walther.

Aqua amygdalarum amararum concen-
 trata; concentrirtes Bittermandelwasser.

Form u. Gabe. Rein und in Mixturen zu 10—
 50 Tropfen, täglich einigemal; äusserlich $\bar{3}j$.
 Von vielen Aerzten statt Aqua laurocerasi angewendet.

182 AQUA AMYGDALARUM AMARARUM CONCENTRATA.

Man *vermeide* Verbindungen mit Basen, Metallsalzen, namentlich Calomel, Silbersalzen, Wärme, Luft.

395. Rx. Aquae amygdal. amar. ℥ij
„ fl. aurant. ℥iv
Syrup. althaeae ℥j.

M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Im Keuchhusten.

Wendt.

396. Rx. Aquae juniperi ℥iv
Extr. aloes aquos. gr. ij
Aquae amygdal. amar. concentr. ℥j—jß
Syrup. sacch. ℥ß.

M. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Rheumatalgia haemorrhoidalis.

Pitschaft.

397. Rx. Aquae amygdal. amar.
Liqu. ammon. anis. āā ℥ß
Aquae fl. aurant. ℥vj
Mucil. gumm. mimos. ℥j.

M. D. S. Umgeschüttelt stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Cholera.

Gebel.

398. Rx. Kali carbon. dep. ℥j
Succi citri rec. express. q. s.
ad perfect. saturat.
Aquae destill. ℥iv
„ amygdal. amar. ℥ß—℥j
Syrup. fl. aurant. ℥ß.

M. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei fieberhaften Bewegungen der Kinder in Folge von Wurm- und Zahnreiz.

Wendt.

399. *Ry.* Aquae menthae pip. $\bar{z}$ iv
 Extr. aloes aquos. gr. j — ij
 Aquae amygdal. amar. conc. $\bar{z}$ j
 Syrup. sacch. $\bar{z}$ ß.

M. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Bei Rheumatalgia venosa hysterica solcher Frauen, die nahe am Aufhören der Menstruation sind und bei welchen sich Störungen im venösen Kreislaufe leicht einstellen.

Pitschaft.

400. *Ry.* Aquae amygdal. amar. conc. $\bar{z}$ ij
 „ petroselini $\bar{z}$ iv
 Syrup. sacch. $\bar{z}$ j.

M. D. S. Stündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Harnsteinen.

Pitschaft.

401. *Ry.* Boracis $\bar{z}$ j.
 Solve in
 Aquae melissae $\bar{z}$ iv.
 Adde

Aquae amygdal. amar. $\bar{z}$ j.

D. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Bei Menstrualkolik, welche sich vor der Periode und während der ersten Tage der Menstruation bei Frauen, mehr noch bei Mädchen einstellt.

Pitschaft.

402. *Ry.* Opii pulv. gr. j
 Gumm. mimos pulv. $\bar{z}$ j
 Aquae menthae pip. $\bar{z}$ iv.
 F. l. a. emulsio, cui adde
 Aquae amygdal. amar. $\bar{z}$ j

M. S. Lauwarm und umgeschüttelt zum Klystier.

Gebel.

Aqua Amygdalarum amararum diluta;
verdünntes Bittermandelwasser.

Form u. Gabe. Statt der Aqua cerasorum nigro-
rum und wie dieses zu 3ß mehreremale täglich.

Oleum amygdalarum amararum aethe-
reum; aetherisches Bittermandelöl.

Form u. Gabe. In Alkohol, Aether aufgelöst zu
 $\frac{1}{2}$ —3 Tropfen, einigemal täglich; äusserlich zu einigen
Tropfen.

Man vermeide die bei Aqua amygdal. amar. angegebenen
Verbindungen.

403. *Ry. Olei amygdal. amar. gutt. xx*
Spirit. vini rectificatiss. 3iij.

M. S. Täglich 4 mal 10—20 Tropfen.

Anwend. Gegen Neuralgieen, besonders Gesichtsschmerz.

Horn.

404. *Ry. Chinini sulphur. gr. ij—iij*
Pulv. aromat. 3ß
Olei amygdal. amar. aeth. gutt. j
Extr. centaur. min. s. q. ut f. pil. x.
Consp. pulv. cass. cinnam.

D. S. Zwei Stück vor dem Fieberanfalle auf ein-
mal zu nehmen.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Lockstädt.

405. *Ry.* Olei amygdal. dulc. rec. $\bar{3}\beta$
 „ „ amar. aeth. $\bar{3}\beta$.

M. S. 3—4 mal täglich einen Kaffeelöffel voll in die schmerzhaften Stellen einzureiben.

Anwend. Gegen heftige Neuralgien, zumal in Folge von Gicht und Krebsleiden.

Janin.

406. *Ry.* Olei amygdal. amar. $\bar{3}\beta$ — j
 „ „ dulc. $\bar{3}vj$
 Liqu. ammon. succin. $\bar{3}iij$.
M. f. linimentum.

D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Schmerzstillendes Liniment.

Hedenus sen.

Amygdalinum; Amygdalin.

(*Amygdalina; Mandelstoff.*)

Form u. Gabe. *Emulsion.* Nach Liebig u. Wöhler geben 17 Gran in Berührung mit Mandelemulsion genau 1 Gran Blausäure und 8 Gran äther. Bittermandelöl. Diese Quantität entspricht 2 Unzen Aqua amygdal. amar. concentr. Sie schlagen folgende Vorschrift vor:

407. *Ry.* Amygdal. dulc. $\bar{3}ij$
 Aquae font. q. s. ut f. l. a. emuls. $\bar{3}j$.
In colatur. solve
 Amygdalini gr. xvij.

S. Täglich 2—3 mal 10—15 Tropfen.

Anwend. In gleichen Fällen wie das concentr. Bittermandelwasser und in halb so starker Gabe.

Amygdalae dulces. Süsse Mandeln.*(Amygdalus communis L.)*

Form u. Gabe. Innerlich in Emulsion zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\text{ij}$ täglich.

408. Rx. Amygdal. dulc. excort.
 Semin. papav. alb. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$
 Aquae cerasorum $\mathfrak{z}\text{j}$.
 F. l. a. emuls.; in colat. solve
 Pulver. gumm. mimos. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Tassenweise zu gebrauchen.

Anwend. Als einhüllendes und beruhigendes Mittel, besonders in entzündlichen, fieberhaften Krankheitsformen.

Richter.

409. Rx. Amygdal. dulc. excort. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aquae font. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 F. l. a. emuls. Cola et adde
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Mandelmilch. Den Tag über zu verbrauchen.

410. Rx. Amygdal. dulc. excort. $\mathfrak{z}\beta$
 Aquae ceras. nigr. $\mathfrak{z}\text{vj}$.
 F. l. a. emuls., in qua solve
 Kali nitrici $\mathfrak{z}\text{j}$
 Sacchari alb. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Alle 1—2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Entzündungen, besonders der Lungen.

Radius.

411. *Rx.* Amygdal. dulc. excort. $\text{℥}\beta$
 Semin. hyoscyami $\text{℥}j$
 Aquae ceras. nigr. $\text{℥}viii$.
F. l. a. emuls. Colat. admisce
 Sacchari alb. $\text{℥}vj$
 Magnesiae ustae $\text{℥}j$.

D. S. Alle 1—2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Magenkrampf und Vomitationen von zu grosser Reizbarkeit und Säure sehr nützlich.

Pharm. Bavar.

412. *Rx.* Amygdal. dulc. excort. No. ij.
 Tere sensim affundendo
 Aquae bullient. $\text{℥}iv$.
 Lactis $\text{℥}vj$
 Sacchari alb. $\text{℥}j$.

M. S. Zum Getränk.

Lac artificiale Rosensteinii.

Anwend. Als Nahrungsmittel für Kinder, welche früh entwöhnt werden müssen.

Rosenstein.

413. *Rx.* Amygdal. dulc. excort. $\text{℥}vj$
 „ amar. excort. $\text{℥}\beta$
 Bene contus. misce terendo cum
 Pulv. gumm. mimos. elect. $\text{℥}\beta$
 Sacch. alb. pulv. $\text{℥}iij$
 (Ol. fl. aurant. gutt. iij).
F. pasta.

D. S. Täglich den 6. oder 8. Theil mit 4 Tassen Wasser angerührt, zu halben Tassen.

Phöbus.

Amygdalarum Syrupus; Mandelsyrup.

(*Syrupus emulsivus.*)

414. *Rx.* Rad. liquirit. pulv.
 „ iridis flor. pulv.
 „ althaeae pulv. āā gr. xvj
 Gummi mimos. pulv. gr. xxxij
 Syrup. amygdal. ℥ij.

M. D. S. Umgeschüttelt, zweistündlich 1 Theelöffel.

Linctus leniens.

Anwend. Bei heftigem katarrhalischen Husten.

Pharm. Hann.

Oleum amygdalarum dulcium recens expressum; frisches süßes Mandelöl.

Form u. Gabe. Rein, mit Fleischbrühe oder in Emulsion zu ℥j—℥j täglich; äusserlich zu Einreibungen, Pinselsäften, Linimenten und Salben.

415. *Rx.* Olei amygdal. dulc. ℥j
 Gumm. mimos. pulv. ℥β.
F. c. aquae comm. ℥viij l. a. emulsio, in qua solve
 Sacchari alb. ℥β.

D. S. Umgeschüttelt, aller 2—3 Stunden 1—2 Esslöffel.

Emulsio oleosa Pharm. mil.

416. Rx. Olei amygdal. dulc. $\bar{3}\text{j}\beta$
Vitelli ovi j.

Terendo sensim misce cum

Syrup. althaeae

Aquae fl. aurant. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{j}$

„ cerasor. $\bar{3}\text{ij}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, stündlich $\frac{1}{2}$ Esslöffel.

Anwend. Bei Katarrhen.

Pharm. Gall.

417. Rx. Aquae fl. tiliae $\bar{3}\text{ij}$

„ cerasor. nigr.

Olei amygdal. dulc. rec. et frig. expr. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{j}$

Kali carbon. ex tartar. $\bar{3}\text{j}$

Vitelli ovi $\bar{3}\text{ijj}$

Mucil. gumm. mimos. $\bar{3}\text{j}$.

M. S. Alle $\frac{1}{2}$ —1 Stunde 1 Theelöffel voll.

Rosensteins Kindermilch.

Anwend. Gegen Reissen im Leibe bei Kindern.

Rosenstein. L. W. Sachs.

418. Rx. Olei amygdal. dulc. rec. expr. $\bar{3}\beta$

Gummi mimos. $\bar{3}\beta$

Aquae sceniculi $\bar{3}\text{ijj}$

Mannae elect. $\bar{3}\beta$

Syrup. emulsivi $\bar{3}\text{j}$.

M. f. emulsio.

S. Esslöffelweise.

Anwend. Gegen Reissen im Leibe, rheumatische und entzündliche Ruhr.

Hufeland. Jahn.

419. Rx. Olei amygdal. dulc. rec. expr.

Syrup. emulsivi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{vij}$

Gummi mimos. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Aquae cerasor. $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. linctus.

S. *Theelöffelweise.*

Tinctura pectoralis Pharm. Suec., anstatt des alten
Looch sanum et expertum.

Anwend. Gegen katarrhalischen und krampfhaften Husten.

420. Rx. Olei amygdal. dulc. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Mucil. gumm. arab. $\mathfrak{z}\text{vj}$

Misce exacte et adde

Decoct. rad. salep $\mathfrak{z}\text{x}$

Tinct. opii simpl. $\mathfrak{z}\text{j} - \mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. *Stündlich 2 Esslöffel.*

Anwend. Bei erschwerter und schmerzhafter Menstruation.

421. Rx. Olei amygdal. dulc. $\mathfrak{z}\text{vj}$

Aquae foeniculi $\mathfrak{z}\text{iv}$

Ammon. carbon. pyro-oleosi $\mathfrak{z}\text{j}$

Syrup. pectoral. $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. *Umgeschüttelt, Kindern 2 Theelöffel, Er-
wachsenen 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Keuchhusten, Schafhusten, Zusammenschnü-
rung der Brust Hysterischer und Hypochondrischer.

Weickard, Jahn.

422. Rx. Olei amygdal. dulc. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Syrup. violar.

„ fl. aurant. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$

Sacchari cand. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.

M. S. *Theelöffelweise.*

Anwend. Gegen Husten, überhaupt jeden Reizungszustand
der Athmungswerkzeuge.

Sydenham.

423. *Rx.* Olei amygdal. dulc. $\overline{3}\beta$
 Syrup. senegae
 „ fl. aurant. $\overline{aa}$ $\overline{3}j$
 Tinct. croci $\overline{3}j$.
M. f. linctus.

S. Stündlich 2 Theelöffel.

Anwend. Bei katarrhalischem Husten mit grosser Reizbarkeit der Sprachwerkzeuge, zur momentanen Linderung (z. B. bei Sängern).

Fricke.

424. *Rx.* Olei amygdal. dulc.
 Elix. myrrh. $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$
 Syrup. senegae
 „ fl. aurant. $\overline{aa}$ $\overline{3}j$
 Tinct. croci $\overline{3}j$.

M. S. Stündlich 2 Theelöffel.

Anwend. Gegen katarrhalische Zustände, wobei die Schleimhäute der Speiseröhre und der Magen afficirt sind, und die Expektion aus Atonie nicht gehörig zu Stande kommt.

Fricke.

425. *Rx.* Olei amygdal. dulc. $\overline{3}vj$
 Tinct. thebaicae $\overline{3}j$
 Succ. citri $\overline{3}ijj$
 Syrup. diacodii $\overline{3}vj$.

M. S. Täglich 3—4 Theelöffel.

Anwend. Gegen Krampfhusten Schwindsüchtiger.

Jahn.

426. *Rx.* Olei amygdal. dulc. $\overline{3}ijj$
 Syrup. violar.
 „ balsami peruvian. $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$

Sacchari alb. ℥iij.

M. f. linctus.

D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei heftigem Husten.

Marcus.

427. *Rx.* Olei amygdal. dulc. ℥j
Bals. peruvian. gutt. xxx
Syrup. althaeae ℥j
Mucil. gumm. arab. ℥ß
Aqua foeniculi ℥iv.

„ petroselini ℥viii.

M. f. l. a. emulsio.

D. S. Alle halbe Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Schmerzen von Nieren- oder Blasensteinen mit Strangurie.

Kämpf.

428. *Rx.* Gummi mimos. ℥ij
Vitell. ovor. ℥iij
Aquae calc. viv. ℥iij
Tinct. thebaicae ℥j
Olei amygdal. dulc. rec. express.
Syrup. papav. albi āā ℥j.

M. S. Aller 1/2—1 Stunde 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Krankheiten der Urinwege, vorzüglich Ischurie, Strangurie und Steinschmerzen unübertroffen.

Jahn.

429. *Rx.* Olei amygdal. dulc. ℥j
Sacchari alb. ℥ij.
Tritis adde
Syrup. althaeae vel papav. ℥j.
M. f. linctus.

D. S. Theelöffelweise.

Anwend. Gegen Katarrh, trocknen Husten und Raucedo.

Swediamr.

430. *Rx.* Camphorae gr. vj
 Gummi mimos. 3j
 Olei amygdal. dulc.
 Syrup. althaeae aa 3vj
 Tinct. opii simpl. 3ß.

M. S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen Merkurialgeschwüre im Munde.

Berends.

431. *Rx.* Olei amygdal. dulc.
 „ lili aa 3ß
 Morphin. puriss. gr. ij.
 Misce et detur pro minimis injectionibus. identidem in die faciundis.

Anwend. Man macht kleine Einspritzungen, theils in die Ohren, um heftige Ohrenschmerzen zu lindern, theils in die Harnröhre, um starke Reizungen derselben während des entzündlichen Zeitraumes der Blennorrhöe zu mildern, theils auch in den Mastdarm bei Hämorrhoidalkolik mit Durchfall.

Brera.

432. *Rx.* Olei amygdal. dulc. 3ß
 Lact. vaccin. calid. 8j
 Micae panis q. s.

Misce et coque, ut f. cataplasma.

Zuweilen mischt man 3ij Kampher zu.

Anwend. Bei Blennorrhagie.

Swediaur.

433. *Rx.* Olei amygdal. dulc. rec. expr. 3ij
 Cerae albae 3ij.

Misce leni calore et fere refrigerata agita in mortario. *S. Ceratum ophthalmicum.*

Anwend. Zur Aufnahme medikamentöser Stoffe.

Himly. v. Gräfe.

434. Rx. Olei amygdal. dulc. ℥ij.
 Cetacei ℥j
 Cerae albae ℥iij.
 Liquatis et in mortarium marmoreum effusis adde
 Aquae rosar. ℥j
 Bals. de mecca ℥j
 Tinct. benzoës gutt. lx.
 Pulsentur usque pomatum albissimum evaserit.

Unguentum Sultanae.

Anwend. Schönheitsmittel; auch gegen aufgesprungene Lippen, Hände u. s. w.

Amylum. Stärke.

(*Amidon, Faecula; Kraft-, Stärke- oder Satz-Mehl, Hefe.*)

Vornehmlich aus dem Samen des Winterweizens (*Triticum hibernum*).

Form u. Gabe. Selten in Pulver, Trochisken, Auflösung, Gallerte zu ℥j—℥ij, mehrmals täglich; äusserlich zu Streupulver und Klystieren, ℥ß—℥jß auf ℥iij—vj.

Man vermeide Verbindungen mit Jod und Jodmetallen.

435. Rx. Rad. liquirit. ℥j
 Amyli
 Gummi arabici
 „ tragacanthae
 Nucleor. cydonior.
 Semin. papav. albi āā ℥ij
 Amygdal. dulc. excort. ℥ß
 Sacchari crystallis. ℥jß.

M. f. pulvis.

S. Täglich $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ Drachme.

Anwend. Bei Blutspucken, Diarrhöe, Lungenschwindsucht.

Cadet de Gassicourt.

436. *Ry.* Tartari stibiati gr. j
Pulv. amyli ℥i.
M. f. pulvis.

S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Brechmittel.

Hufeland.

437. *Ry.* Pulv. rad. iridis flor. ʒjβ
Amyli ʒijβ
Sacchari albiss. ʒijβ
Mucil. gumm. tragacanth. c. aquae rosar. par. s. q.
ut f. trocisci parvi.

D. S. Nach Bedürfniss bei Husten.

Trocisci bechici albi Pharm. Hann.

438. *Ry.* Amyli ʒij
Aquae communis ʒiv.
Coque ad solutionem.

S. Zu einem Klystier.

Vogler.

439. *Ry.* Amyli ʒj — ij
Subige c. paux. aquae frigid.; dein affunde
Aquae fervid. ʒvj — viij.
Solut. refrigerat. adde
Laudan. liquid. Syd. ʒj — ʒβ.

S. Klystier.

Anwend. Bei wässerigen scharfen Durchfällen, Verschwärungen im Mastdarme.

Radius.

440. Rx. Amyli ʒj
 Extr. opii aquos. gr. iß
 Aquae fervid. ʒiv.
 D. tal. dos. iv.
 S. *Täglich 2mal eine Portion gelind erwärmt zum Klystier.*
 Anwend. Bei Durchfällen, welche man zu stopfen beabsichtigt.
Vogt.

Amylum Marantae. Pfeilwurzelmehl.

(*Arrow-root, Faecula Marantae arundinaceae s. indicae; Arrowmehl, indischer Salep. Von Maranta arundinacea, L.*)

Form u. Gabe. In Substanz, Auflösung mit Milch oder Fleischbrühe, als Gallerte, zu ʒj — ʒß.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie bei Amylum.

441. Rx. Amyli marant.
 Sacchari albi āā ʒß.
 M. f. pulvis.
 D. S. *Theelöffelweise.*
 Pulvis pectoralis demulcens.
 Anwend. Bei Heiserkeit, Reizhusten, heftigen Katarrhen u. s. w.

Schneider

442. Rx. Amyli marantae cochl. maj.
 Lactis dulcis
 Aquae bullient. āā semioctarium.
 Coque per pauca momenta.
 Mit Zucker versüsst eins der besten Nahrungsmittel für Kinder, besonders bei Unterleibsstörungen.

Tortual.

Anethum Foeniculum L. Fenchel.

Wurzel, Kraut, Samen.

Form u. Gabe. Wurzel und Kraut als Abkochung zu $\bar{3}j$ — ij auf $\mathfrak{G}j$ Wasser; Samen als Aufguss zu $\bar{3}j$ auf $\mathfrak{G}j$ Wasser als Thee, oder $\bar{3}j$ auf $\bar{3}ij$ esslöffelweise; Pulver $\mathfrak{D}\beta$ — $\mathfrak{D}j$ einigemal täglich.

443. **Rx.** Radic. foeniculi
Semin foeniculi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$.

C. C. M. S. 2—3 Esslöffel voll mit einer Kanne Wasser (oder Milch bei gutem Magen) einigemal wallen zu lassen.

Anwend. Zur Beförderung der Milchabsonderung.

Radius.

444. **Rx.** Radic. foeniculi $\bar{3}ij$
„ liquirt.
Herb. anethi
„ cerefol. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
Semin. anisi $\bar{3}ij$.

C. C. M. S. Thee. Zwei Esslöffel voll mit 1 Kanne Wasser einigemal aufwallen, dann an einer warmen Stelle $\frac{1}{2}$ Stunde ziehen zu lassen und täglich mit etwas Milch zu verbrauchen.

Anwend. Zur Beförderung der Milchabsonderung.

Radius.

445. **Rx.** Radic. foeniculi
„ liquirit.
„ petroselini $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$

Herb. anethi
 „ cerefol.
 „ foeniculi āā 3ß
 Semin. anethi
 „ foeniculi
 „ anisi āā 3ij.

C. C. M. S. Zum Thee (2—3 Esslöffel auf 8ij Wasser).

Anwend. Zur Beförderung der Milchabsonderung.

Bergius.

446. *Ry.* Aquae foeniculi 3ij
 Magnes. alb. gr. viij
 Mucilag. gumm. arab.
 Syrup. diacod. āā 3ß
 Laudan. liqu. Syd. gutt. ij.

M. D. S. Aller 2 Stunden 2 Theelöffel voll.

Anwend. Beim Durchfall kleiner Kinder.

Goelis.

447. *Ry.* Magnes. carbon. 3ij
 Cort. aurant. 3ß
 Semin. foeniculi
 Sacch. alb. āā 3j.

M. f. pulvis.

D. S. Dreimal täglich 1 Theelöffel.

Pulvis galactopœus Hufelandi.

Anwend. Zur Beförderung der Milchabsonderung.

Hufeland.

448. *Ry.* Magnes. albae 3j
 Pulv. semin. foeniculi
 „ cort. aurant. āā 3ß

Pulv. rad. liquirit.

„ sacchari alb. āā 3ij.

M. D. S. Täglich 4—5 mal 1 Theelöffel.

Pulvis foeniculi compos. s. galactopöeus Ro-
sensteinii.

Anwend. Gegen Säureerzeugung säugender Kinder der Mutter
oder Amme zu geben, so wie zur Vermehrung der Milchab-
sonderung.

Rosenstein.

449. *Rx.* Axung. porc. 3ij
Olei essent. foenicul. gutt. lx.

M. trititando; f. ungt.

D. S. Zum Einreiben.

Unguentum contra pediculos.

Anethum graveolens L. Dill.

Form u. Gabe. Wie bei Fenchel.

450. *Rx.* Olei anethi coct.
„ chamomill. coct. āā 3j.

M. S. Auf den Unterleib einzureiben einen klei-
nen Theelöffel voll.

Anwend. Bei Blähungsbeschwerden, schmerzhaft aufgetriebe-
nem Unterleibe und Durchfällen zarter Kinder.

Angelicae radix. Engelsüsswurzel.

(Angelica Archangelica L.)

*Angelik-, Engel-, Brust-, Luft-, Heili-
gegeistwurzel.*

Form u. Gabe. In Pulvern, Bissen und Lattwer-
gen selten, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{3}\beta$, mehrmals täglich; am häufigsten
im Aufguss zu $\mathfrak{3}\beta$ auf $\mathfrak{3}\text{vj}$; das Extrakt zu gr. v — x ;
die Tinktur zu 40—60 Tropfen.

451. *Ry.* Rad. angelic. $\mathfrak{3}\beta$.

Infunde aquae ferv. q. s. ad colat. $\mathfrak{3}\text{iv}$.

Adde

Syrup. cerasor. $\mathfrak{3}\beta$.

M. S. Alle Stunden 2 Esslöffel voll.

Anwend. In gastrischen, fauligen Nervenfiebern nach Entfer-
nung der Unreinigkeiten.

Jahn.

452. *Ry.* Rad. angelic.

„ valerian. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{3}\beta$.

Infunde aquae ferv. q. s.

Colat. $\mathfrak{3}\text{vj}$ adde

Liqu. ammon. succin.

Spirit. sulph. aether. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{3}\text{ij}$

Syrup. papav. rhoead. $\mathfrak{3}\text{vj}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. In Nervenfiebern und mehreren krampfhaften Be-
schwerden.

Vogt.

453. *Ry.* Rad. angelicae.

„ serpentar.

„ valerian. min. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{3}\beta$.

Infunde aquae bullient. s. q.

Colat. refriger. $\mathfrak{3}\text{vj}$ adde

Aether. sulphur. $\mathfrak{3}\text{j}$

Syrup. fl. aurant. $\mathfrak{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt stündlich 2 Esslöffel.

Anwend. Im Typhus cum torpore.

Jahn.

454. *Ry.* Rad. angelic. $\bar{3}\beta$.

Infunde c. aquae q. s.

Digere per $\frac{1}{4}$ hor. et col. $\bar{3}$ vij refriger. admisce

Extr. cort. peruv. $\bar{3}$ ij

„ scillae $\bar{2}$ j

Liqu. ammon. anis. $\bar{3}$ j.

D. S. Aller 2 Stunden 1—2 Esstöffel.

Anwend. Bei Schleimschwindsucht, feuchtem Asthma.

A. Haase.

455. *Ry.* Extr. angelicae $\bar{3}$ j

Aquae menthae pip. $\bar{3}$ iv

Liqu. anod. min. Hoffm. $\bar{3}\beta$

Syrup. cort. aurant. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. 3—4mal 1 Esstöffel voll.

C. J. Meyer.

456. *Ry.* Rad. angelicae $\bar{3}$ j

Vini gallic. alb. $\bar{8}$ j.

Digere per 24 hor. Colat. adde

Tinct. calami $\bar{3}$ vj.

M. D. S. Zweimal täglich $\frac{1}{2}$ Weinglas.

Anwend. Bei chronischen Krankheiten.

Phöbus.

457. *Ry.* Rad. angelicae

„ zingiberis

Absinthii $\bar{3}\beta$

Caryophyllor. arom. $\bar{3}$ ij.

Conc. cont. infunde

Spirit. vini rectificatiss. $\bar{8}$ ij.

Sepone in vase exacte clauso per j—ij dies.

Cola et serva.

Tinctura prophylactica ad Choleram.

Anwend. 4—6 Loth dieser Tinktur werden mit 1 Quart Küm-

meibranntwein vermischt. Ehe man sich zu einem Kranken begiebt, nimmt man davon je nach der Gewöhnung an geistige Getränke 1—2 Kaffee- oder Esslöffel voll.

Von d. preuss. Behörde verordnet.

Spiritus Angelicae compositus s. theriacalis; zusammengesetzter Angelik-
wurzelgeist.

Form u. Gabe. *Aeusserlich als Waschung, Einreibung zu ʒj—ʒj.*

458. Rx. Spirit. angelicae comp. ʒij
Liqu. ammon. vinos. ʒj.

M. D. S. *Zum Waschen der Stirn und Hände.*

Anwend. Bei Febris nervosa stupida und asthenischen Nervenzufällen.

Vogt.

Angustura cortex. Angusturarinde.

(*Bonplandia trifoliata Willd., Cusparia febrifuga Pharm. Lond.*)

Form u. Gabe. *In Substanz, Lattwerge, Pillen, Aufguss und Abkochung zu ʒß—ʒj, mehrmals täglich; das Extrakt zu gr. ʒv—viij, einigemal.*

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Metallsalzen, Gerbestoff, Salzbildern.

459. Rx. Cort. angusturae ʒß.

Coque ex aquae fontan. ʒxij ad rem. ʒvj; adde

Tinct. aromat. $\mathfrak{3ij}$
 Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{3j}$.

M. S. Aller 3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Als Stärkungsmittel.

Berends.

460. *Ry.* Cort. angusturae gross. pulv.
 Flor. arnicae inc. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3}\beta$
 Aquae commun. ferv. q. s.
 Ebull. semel; in colat. $\mathfrak{3vj}$ solve
 Gumm. mimos. $\mathfrak{3ij}$
 et post. refrigerat. adde
 Tinct. opii simpl. $\mathfrak{3ij}$
 Syrup. cort. aurant.
 Aceti $\overline{aa}$ $\mathfrak{3ij}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, stündlich 2 Esslöffel.

Anwend. In der fauligen Ruhr.

G. A. Richter.

461. *Ry.* Cort. angusturae $\mathfrak{3}\beta$.
 Infunde aquae bull. q. s. digere per $\frac{1}{4}$ hor.
 Colat. $\mathfrak{3vj}$ refrig. adde
 Extract. cort peruviani
 Spirit. sulphurico-aeth. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3ij}$
 Syrup. cinnam. $\mathfrak{3vj}$.

M. S. Aller 2—3 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Nervenkrankheiten mit Erschöpfung.

Schubarth.

462. *Ry.* Cort. angusturae gross. pulv.
 Flav. cort. aurant. inc. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3}\beta$
 Aquae ferv. $\mathfrak{3viiij}$
 Diger. per. $\frac{1}{4}$ hor. Colat. refrig. adde

Tinct. calami arom. 3ij
Syrup. bals. peruvian. 3vj.

M. D. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Atonie des Darmkanals.

Vogel.

Anisum stellatum. Sternanis.

(*Von Illicium stellatum L.*)

Samen (Früchte).

Form u. Gabe. In Pulver (s. No. 346.), zu ʒß—ʒj innerlich; im Aufguss 3ij—3ß auf 3vj.

Anisum vulgare. Gemeiner Anis.

(*Von Pimpinella Anisum L.*)

Samen.

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu ʒß—ʒj mehrmals täglich; im Aufguss zu 3ß—3j auf 3vj. Aeth. Oel zu 2—8 Tropfen, einigemal täglich. Aeusserlich als Streupulver. Das Oel zu Oelzucker und als Einreibung.

463. Rx. Semin. anisi
Rad. liqurit. aa 3ij
„ althaeae 3j.

C. C. inf. c. aquae ferv. ʒij.

Colat. S. Tassenweise zu trinken.

Anwend. Gegen chronischen Katarrh.

Sobernheim.

464. *Ry.* Semin. anisi 3ß.
 Inf. aquae ferv. q. s. ad col. 3iv
 Sacch. alb. 3ij.

S. Theelöffelweise.

Anwend. Bei Flatulenz kleiner Kinder.

Hôp. de Vén.

465. *Ry.* Pulv. rad. imperatoriae
 „ fol. sennae
 „ cort. ligni sassafras
 „ bacc. juniperi āā 3ß
 „ sem. anisi 3ij
 Mellis depur. q. s. ut f. electuar.

S. Drei- bis viermal einen grossen Theelöffel voll.

Electuarius mundificans Himlyi.

Anwend. Gegen chronische Hautkrankheiten.

Himly.

466. *Ry.* Olei anisi aeth. gutt. x
 Spirit. nitrico - aeth. 3j.
M. S. 10—15 Tropfen auf Zucker.

Anwend. Gegen Blähungsbeschwerden.

Sobernheim.

467. *Ry.* Olei anisi 3j
 Bals. nucistae 3ij.

M. S. Auf den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei krampfhaften Darmbeschwerden.

Anthrakokali simplex. Einfaches Anthrakokali.

Form u. Gabe. Pulver, Pillen zu gr. ij — vj,
 täglich einigemal.

468. *Ry.* Anthrakovkali simpl. gr. ij.
 Pulv. rad. liquirit.
 Vel Magnes. carbon. gr. v.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. No. iij.
S. Innerhalb 24 Stunden zu verbrauchen.
Anwend. Gegen einfache Flechte.

Polya.

469. *Ry.* Anthrakovkali simpl. v. sulphurati gr. ij
 Sulphur. dep. gr. iij—v
 Magnes. carbon. vel Pulv. rad. liquirit. gr. ij—iij.
 M. f. pulv. D. tal. dos. No. iij.
S. In 24 Stunden zu verbrauchen.
Anwend. Gegen Flechten, die mit Krätze complicirt sind.

Polya.

470. *Ry.* Anthrakovkali simpl. gr. ij
 Hydrargyr. mur. mit. vel solub. Hahnem. gr. $\frac{1}{6}$
 Pulv. rad. liquirit. gr. iij.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. No. iij.
S. Innerhalb 24 Stunden zu verbrauchen.
Anwend. Gegen syphylitische Flechten.

Polya.

471. *Ry.* Anthrakovkali simpl. v. sulphurati gr. ij
 Sulph. antim. aurati. gr. β.
 (l. Antim. crudi gr. iij)
 Magnes. carbon. vel Pulv. rad. liquir. gr. iij.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. No. iij.
S. Täglich zu verbrauchen.
Anwend. Gegen lepröse Flechten.

Polya.

Anthrakokali sulphuratum; Schwefel-anthrakokali.

Form u. Gabe. Wie beim vorigen.

Antimonium. Spiessglanz.

(*Stibium. Antimon.*)

A. Antimonii chlorati Liquor. Chlorstibiumflüssigkeit.

(*Liqu. Stibii muriatici, Liqu. chloreti Stibii, Butyrum s. Oleum Antimonii, Causticum antimoniale; Spiessglanzbutter.*)

Form u. Gabe. Nur äusserlich als Aetzmittel, rein oder in Salben, zu 1—10 Tropfen auf 3j.

• Man vermeide Verbindungen mit Wasser, Weingeist, kohlensauren Alkalien und Erden, Schwefellebern und starken Säuren.

472. R_x. Pulv. subtiliss. cantharid. ʒß
 „ hydrargyr. muriat. corr. 3ß
 Liqu. stibii muriat. ʒj
 Adipis suilli 3ij.
 M. f. unguentum.

D. S. Auf Leinwandstreifchen gestrichen aufzulegen.

Anwend. Gegen Kondylome.

Horn.

473. *Ry.* Liqu. antimonii chlorat.
 Hydrargyr. muriat. corr. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Pulv. herb. sabinae $\overline{3ij}$
 Axung. porc. $\overline{3vj}$.
 M. f. unguentum.

D. S. Auf Charpie zu streichen.

Anwend. Gegen Feigwarzen.

Neumann.

474. *Ry.* Opii pulv. gr. xv
 Camphorae trit. $\overline{3ij}$
 Liqu. stibii muriat. $\overline{3j\beta}$
 Adipis suill. $\overline{3j}$.
 M. f. unguentum.

S. Zweimal täglich aufzustreichen.

Anwend. Gegen schwammige Auswüchse in Geschwüren.

Conradi.

375. *Ry.* Butyri antimonii
 Hydrargyr. subl. corr. $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$
 Ungt. cantharid. $\overline{3ij}$.
 M. f. unguentum.
S. Aetzsalbe.

Anwend. Um Geschwüre zu erzeugen. Es tödtet die Haut unmittelbar, aber erst nach einem oder ein paar Tagen entsteht Entzündung im Umkreise des abgestorbenen Hautstücks. Dieses wird losgestossen und man hat ein schönes Geschwür, welches auch bei Anwendung der mildesten Salben lange offen bleibt.

B. Antimonium hydrosulphuratum
luteum. Goldschwefel.

(*Sulphur stibiatum aurantiacum, Sulphur Antimonii auratum, Sulphuretum Antimonii; pomeranzenfarbenes Schwefelspiessglanz.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Säften, nicht gern in Morsellen, Trochisken und Schüttelmixturen, zu gr. $\frac{1}{4}$ —ij, täglich einigemal.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, sauren Säften und Salzen, mit reinen und kohlensauren Alkalien und Erden, Eisenpräparaten und Salzen, Gerbestoff, Seifen.

476. Rx. Antimon. hydrosulph. lutei gr. iij
Extract. thebaici gr. ij
Sacchari albi 3ij.

M. f. pulvis. Div. in vj part. aequal.

S. *Früh und Abends ein Pulver.*

Anwend. Gegen Husten, nach vorheriger Beseitigung des heftig entzündlichen Zustandes, bei schwer sich lösendem Auswurfe u. krampfhaftem Hustenreize.

Radius.

477. Rx. Sulphur. stibiat. aurant.
Camphor. tritae aa gr. viij
Sulphur. dep.
Sacchari albi aa 3ij.

M. f. pulvis. Div. in quatuor part. aequal. D. in charta cerata.

S. *2—4 mal täglich $\frac{1}{2}$ Pulver mit Fliederthee.*

Pulvis diaphoreticus Pharm. Paup.

Anwend. Bei katarrhalischen, rheumatischen und gichtischen Leiden.

210 ANTIMONIUM HYDROSULPHURATUM LUTEUM.

478. *Ry.* Sulphur. stibiat. aur.
Hydrargyr. muriat. mit. āā gr. vj
Magnes. carbonic. 3j.
M. f. pulvis. Div. in vj part.

S. Morgens und Abends 1 Stück zu nehmen.

Pulvis alterans Plummeri s. Edinburgensis.

Zuweilen verbindet man auch wohl Extract. oder Pulv. herb. conii maculati u. dergl. damit.

479. *Ry.* Sulphur. antim. aur. gr. viij
Opii puri gr. ij
Pulv. cort. peruviani
„ fl. chamomill. āā 3iv.
M. f. pulvis. Div. in part. viij aequal.

S. Während der fieberfreien Zeit zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Hufeland.

480. *Ry.* Sulphur. antim. aur. gr. ij
Resin. guajaci nat.
Semin. foenicul. āā 3ij.
M. f. pulvis. Div. in viij part. aequal.

S. Früh und Abends 1 Pulver.

Anwend. . Gegen chronische Rheumatismen.

Choulant.

481. *Ry.* Sulphur. antim. aur.
Hydrargyr. muriat. mit.
Extr. aconiti āā gr. ij
Pulv. stipit. dulcamar.
Sacchari albi āā 3j.
M. f. pulvis. Disp. tal. dos. No. viij.

S. Früh und Abends ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen chronische Gicht

Richter.

482. *R_y*. Ammoniac. dep. 3jß
 Rad. scillae pulv. gr. xv
 Sulph. stibiat. aurant. 3ß
 Rad. senegae pulv. 3ij
 Extract. taraxaci liqu. q. s.
 ut f. pil. No. cl. Consp. pulv. rad. irid. fl.
D. S. 3mal täglich 5—6 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Schleimhusten, kräftig auflösend und expectorirend.

Berends.

483. *R_y*. Sulphur. stibiat. aur. gr. vj
 Extract. lactucae viros. ʒj
 Syrup. senegae 3ij.
M. D. S. Umgeschüttelt, 2stündlich 1 Theelöffel.
Anwend. Bei Krampfhusten.

Phöbus.

484. *R_y*. Sulphur. antim. aur. gr. vj
 Kali nitrici 3j
 Camphor. gr. iij
 Opii puri gr. jß.
M. f. pulvis. Div. in vj part. aequal.
S. Täglich 3—4mal 1 Pulver.
Anwend. Gegen Katarrhe bei Aengstlichkeit, Zusammenziehen, Spannen oder Drücken über der Brust.

Jahn.

485. *R_y*. Sulphur. aurat. antim.
 Pulv. rad. ipecac. āā gr. vj
 Camphorae gr. xvij
 Sacchari albi 3iij.
M. f. pulvis. Div. in part. vj aequal.
S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. In der Peripneumonie, wenn der Auswurf unter

Sinken des Pulses, grosser Entkräftung und Röcheln stockt oder ganz aufhört.

Mursinna.

Sapo stibiatus; Spiessglanzseife.

(*Sapo antimonialis, Sulphur Antimonii auratum saponatum.*)

Form u. Gabe. In Pillen und (selten) wässriger Auflösung zu gr. v—x.

Man vermeide Verbindungen mit allen Säuren und Salzen.

486. Ry. Saponis stibiati ℥ij
Extr. gratiolae 3ß
Ammoniaci 3j.

M. f. c. spirit. vini pau. pil. No. LX. D. ad vitrum.

S. Täglich 3mal 5—10 Stück.

Anwend. Gegen hartnäckige Unterleibsstockungen.

Sundelin.

487. Ry. Sapon. antimon.
Gummi ammoniaci āā 3j
Extr. bardanae 3ij.

M. f. pil. gr. ij. Consp. pulv. lycop. D. ad vitrum.

S. Morgens und Abends 12 Stück.

Anwend. Gegen Skrofeln.

F. Jahn.

488. Ry. Sapon. stibiati 3j
Pulv. rad. rhei ℥iv
Ammoniaci 3ij

Extr. Taraxaci q. s.
 ut f. pil. gr. ij. D. ad vitrum.
 S. *Täglich 4mal 6—10 Stück.*

Anwend. Gegen Unterleibsstockungen.

Schubarth.

489. R_y. Saponis stibiati
 Extr. taraxaci aa 3jß.
 Solve in
 Liquor. kali acetici 3j.
 M. D. S. *Aller 3 Stunden 50 Tropfen zu nehmen.*

Anwend. In gleichem Falle.

Kämpf.

Liquor saponis stibiati; Spiessglanz-
 seifenlösung.

(*Sulphur auratum liquidum, Tinctura Antimonii Jacobi*)

Form u. Gabe. *Rein oder in Mixturen zu 10—50 Tropfen.*

490. R_y. Liquor. sapon. stibiat. Pharm. Bor.
 S. *20—50 Tropfen täglich 3—4mal in Wasser oder Hafergrütze.*

Anwend. Bei hartnäckigen Rheumatismen, Flechten und andern Hautkrankheiten sehr wirksam.

Hufeland.

491. R_y. Liquor. sapon. stibiat. 3vj
 Tinct. colocynth. 3ij.
 M. S. *Aller 3 Stunden 20 Tropfen in Wasser.*

Anwend. Gegen Flechten.

Heim.

492. *Ry.* Resin. guajac. $\mathfrak{z}\text{ij}$
Liquor. sapon. stibiati $\mathfrak{z}\beta$.

S. S. Täglich 3mal 20—30 Tropfen in Thee.

Anwend. Gegen chronische, asthenische Gicht.

Augustin.

493. *Ry.* Tinct. asae foetid. $\mathfrak{z}\text{vj}$
Sulphur. aur. liquid. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$
Essent. terebinth. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. D. S. Aller 4 Stunden 30 Tropfen.

Anwend. In der Gelbsucht.

Augustin.

C. Antimonium hydrosulphuratum
rubeum; Mineralkermes.

(*Kermes minerale; Sulphuretum Stibii; Sulphur stibiatum rubrum; braunrother Spiessglanzschwefel.*)

Form u. Gabe. Wie bei dem Goldschwefel, zu $\frac{1}{4}$ —1 gr., täglich einigemal.

Auch sind dieselben Verbindungen zu vermeiden.

494. *Ry.* Sulphur. stibiat. rub. gr. ij
Sacch. lactis
Gumm. mimos. $\bar{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

D. S. Aller 4 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Bei Lungenentzündungen, wenn sich der Auswurf schwer löst und Beklemmung macht.

Radius.

495. *Ry.* Sulph. stibiat. rub. gr. ij — iij
 Sacch. lactis ʒß.
 M. f. pulvis.

D. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Im Anfall des Stickflusses.

Berends.

496. *Ry.* Kermet. miner. gr. ij
 Ipecacuanh. gr. vj
 Sacch. lact. ʒj.
 M. f. pulv. Div. in vj part aequal.

D. S. Aller 4 Stunden 1 Stück zu geben.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Hôp. de Montp.

497. *Ry.* Kermet. miner. gr. vj
 Camphor. trit. gr. iij
 Lapid. cancror. ʒjß.
 M. f. pulv. Div. in part. aequal. vj.

D. S. Alle Stunden 1 Pulver.

Anwend. In der Pleuresie, wenn der Puls schwach und ungleich, oder ein leichtes Geräusch in der Brust verspürt wird; dabei ein erweichendes Dekokt mit Fl. sambuc. und Vesicantien.

Quarin.

498. *Ry.* Kermet. miner. gr. ij—iv
 Gumm. arabici
 „ tragacanth. āā ʒß
 Flor. sulphur. ʒj
 Pulv. rad. liquirit.
 Sacchari alb. āā ʒij.
 M. f. pulvis.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Kaffeelöffel voll.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Quarin.

499. *Ry.* Ammoniac.
 Extr. Taraxaci
 Sapon. med.
 Pulv. rad. rhei āā 3ß
 Sulph. stibiat. rub. gr. vj.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

D. S. Morgens und Abends 3—5 Stück.

Anwend. Bei Unterleibsstockungen und Physkonieen.

500. *Ry.* Kermet. miner. gr. viij
 Pulv. Doveri gr. xij
 Roob. sambuc q. s. ut f. pil. No. vj.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Stück.

Anwend. Bei gichtischen und rheumatischen Schmerzen.

Brera.

501. *Ry.* Sulph. stibiat. rub. ʒj
 Extr. dulcamar. q s.
 ut f. pil. xl. Consp. pulv. rad. irid. fl. D. ad vitrum.
S. Stündlich 1 Stück.

Anwend. Gegen chronische Katarrhe.

Sobernheim.

D. Antimonium oxydatum album; weisses
 Spiessglanzoxyd.

(*Antimonium s. Stibium diaphoreticum ablu-
 tum; Acidum stibiosum et stibicum.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lattwerge,
 Schüttelmixturen u. s. w. zu gr. x—xxx. (Ziemlich
 obsolet.)

502. *Ry.* Emuls. simpl. $\bar{\text{z}}\text{ij}$
 Kali nitrici $\bar{\text{z}}\text{j}\beta$ — ij
 Antimon. oxyd. alb. $\bar{\text{z}}\beta$ — $\text{j}\beta$
 Syrup. commun. $\bar{\text{z}}\text{vj}$.

M. S. Stündlich 1 — 2 Esslöffel.

Anwend. In Entzündungsfiebern nach geschehenen Blutentziehungen.

Jahn.

503. *Ry.* Antimon. diaphoret.
 Kali nitrici
 Testar. ostreae praepar. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{j}$.
 Misce trititando. *S.*

Pulvis resolvens StahlII.

Anwend. Auflösend, schmelzend, wurde ehemals in den meisten schweren Krankheiten verschrieben, allein oder in Verbindung mit anderen Mitteln.

504. *Ry.* Flor. chamomill. zj
 Antimon. diaphoret.
 Kali carbonici $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\text{z}\beta$
M. f. pulvis.

S. Aller 5 — 6 Stunden eine solche Gabe zu nehmen.

Pulvis febrifugus MortonII.

505. *Ry.* Aquae sambuci $\bar{\text{z}}\text{v}$
 Antimon. diaphoret. $\bar{\text{z}}\beta$
 Oxymell. scill. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ Theetasse voll.

Anwend. In rheumatischen und katarrhalischen Fiebern.

Tissot.

506. *Rx.* Cornu cervi usti part. iv
 Stibii oxydat. alb. part. i.

Dosis gr. v—iij.

Pulvis Jacobi febrifugus s. antimonialis.

Dieses einst berühmte James-Powder, James- oder Jakobs-Pulver wurde besonders gegen Wechselfieber und Unterleibstockungen angewandt; es bringt jedoch zuweilen in kleiner Gabe schon heftiges Erbrechen und Durchfall hervor.

Pharm. Lond.

E. Antimonium sulphuratum nigrum;
 schwarzer Spiessglanz.

(Antim. crudum. praep., Sulphuretum Stibii nigrum, Stibium sulphuratum nigrum laevigatum; Schwefelantimon.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Mor-sellen, selten in Abkochungen (unzweckmässig), zu gr. v—xx, täglich einigemal.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, sauren Salzen, ätzenden Alkalien.

507. *Rx.* Antimon. sulphur. nigr. alcohol. 3ß
 Magnes. subcarb. gr. v
 Cinnamom. gr. iv
 Sacchar. alb. 3ß.
M. f. pulvis.

S. Früh und Abends die Hälfte zu nehmen.

Anwend. Gegen Skrofeln, Flechten, Gicht.

Hufeland.

508. *Rx.* Stibii sulphur. nigr. laevig.
 Magnes. carbon. āā 3ij
 Sulphur. depur. 3vj.
 M. f. pulvis. Div. in part. xxx aequal.
D. S. Täglich 3mal 1 Pulver zu nehmen.
Anwend. In gleichen Fällen.

Quarin.

509. *Rx.* Stibii sulphur. nigr. 3ß
 Elaeosacch. flaved. citri 3j
 Cort. cinnamom. 3ß.
 M. f. c. mucil. gumm. tragacanth. trochisci
 No. XLVIII.
Anwend. Gegen Skrofeln, Flechten.

Fleisch.

510. *Rx.* Antimon. sulphur. nigr. alcohol.
 Spongiae combust.
 Sulphur. dep.
 Herb. conii
 Conch. praepar. āā 3ß.
 M. f. pulvis.
S. Früh und Abends einen mässigen Theelöffel voll.
Anwend. Gegen Kropf.

Kortum.

511. *Rx.* Stibii sulphur. nigr. laevig. 3ß
 Magnes. carbon. 3ij
 Cort. aurant. sicca. 3j
 Sacchari albi 3v.
 M. f. pulvis.
D. S. Täglich 2mal 1 Theelöffel voll.

Pulvis antimonialis s. purificans Kämpfii.

Anwend. Bei chronischen Hautkrankheiten, Skrofeln u. s. w.

Kämpf.

512. *Ry.* Antimon. crudi $\text{℥}\beta$
 Sacchari albi $\text{℥}\nu$
 Magnesiae ℥j
 Flor. cassiae $\text{℥}\beta$.

M. f. pulvis.

D. S. Aller 3—4 Stunden 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen Krätze.

F. Jahn.

513. *Ry.* Hydrargyri oxydat. rubr. gr. ij
 Stibii sulphur. nigr. $\text{℥}\text{viii}$
 Sacchari albi ℥ij .
Conter. exact. Div. in xvj part. aequal.

S. Morgens und Abends 1 Pulver.

Anwend. Gegen hartnäckige, eingewurzelte Syphilis. Bei jedesmaliger Wiederholung werden 2 Gran rothes Quecksilberoxyd zugesetzt, bis die ganze Formel 16 Gran desselben enthält.

Berg.

514. *Ry.* Stibii sulphur. nigr. laevig. $\text{℥}\beta$
 Asae foetid. $\text{℥j}\beta$
 Extract. conii macul. ℥j
 „ aconiti $\text{℥}\beta$.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 8 Stück zu nehmen.

Anwend.. In der Gicht.

Stoll.

515. *Ry.* Antimon. sulphur. nigr. laevig. $\text{℥}\beta$
 Resin. guajaci
 Extract. fumar. āā ℥j
 Tinct. rhei aquos. s. q.

ut f. pil. gr. j – ij. Consperg. lycop.

S. Täglich 4mal 10 (5) Stück.

Anwend. Gegen Gicht, chronische Hautausschläge.

Klein.

516. *Rx.* Antim. crud. praep. $\mathfrak{z}\beta$
 Gummi guajac. nat.
 Extr. dulcamar. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}j$
 „ taraxac. q. s. ut f. pil. gr. iij.
 Consp. pulv. cinnam.

S. *Aller 2 Stunden 2 Pillen.*

Anwend. Gegen rheumatische Gelenkschmerzen.

v. Hildenbrand.

517. *Rx.* Amygdal. dulc. excort. $\mathfrak{z}j$
 Sacchari albi $\mathfrak{z}vj$.
 Contunde simul in massam molliorem, dein adde
 Pulv. cardamom. min. $\mathfrak{z}\beta$
 „ cinnamom. $\mathfrak{z}ij$
 Stibii sulphur. nigr. laevig. $\mathfrak{z}j$
 Conchar. praepar. $\mathfrak{z}j$
 Mucilag. gumm. tragacanth. q. s.
 F. tabell. pond. gr. xxiv.

S. *Täglich mehrere Stück zu verbrauchen.*

Jede Moisselle enthält etwa gr ij Antimonium.

Morsuli antimoniales Kunkelii.

Anwend. Gegen Skrofeln, Flechten u. s. w.

**F. Antimonium tartarisatum; Spiess-
 glanzweinstein.**

*(Tartarus stibiatus s. antimoniatum s. emeticus;
 Brechweinstein.)*

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Auflösung, zu gr. $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{2}$ als Reizmittel; zu gr. $\frac{1}{2}$ —iv als Brechmittel. Aeusserlich zu Waschwässern $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}j$ auf $\mathfrak{z}j$, zu Augewässern gr. i—ij auf $\mathfrak{z}j$, ebenso zu Einspritzungen, zu Pflastern und Salben $\mathfrak{z}j$ —iv auf $\mathfrak{z}j$, zu Klystieren gr. iij—viij auf $\mathfrak{z}xij$.

Man *vermeide* Verbindungen mit Schwefel-, Salpeter-, Salzsäure, mit reinen und kohlensauren Alkalien, schwefel- und salzsauren Salzen, mit Schwefellebern und gerbestoffhaltenden Flüssigkeiten.

518. *Ry.* Tartari stibiat. gr. iij
Aquae destill. simpl. ℥iij.
Solve.

D. S. Brechmittel.

P. Frank.

519. *Ry.* Tartari stibiat. gr. iij
Aquae destill. ℥ijß
Oxymell. scillit. ℥ß.

M. D. S. Die Hälfte auf einmal, dann Esslöffelweise alle $\frac{1}{4}$ Stunden zu nehmen.

Anwend. Als Brechmittel.

Reil.

520. *Ry.* Tartari stibiat. gr. ij
Aquae fontanae ℥j
Oxymell. scillit.
Syrup. simpl. aa ℥ß
Pulv. rad. ipecacuanhae ℥j.

S. M. S. Umgeschüttelt, alle $\frac{1}{4}$ Stunden 1 Esslöffel (Kindern Theelöffel) bis Erbrechen erfolgt.

Linctus emeticus Hufelandi.

Anwend. Das leichteste und wirksamste Brechmittel, indem es auch den Schleim gut auflöst. Tortual empfiehlt es beim Keuchhusten.

Hufeland.

521. *Ry.* Tartari stibiat. gr. ij
Pulv. rad. ipecacuanhae ℥ij

Amyli 3ß.

M. f. pulvis. Div. in part. iij aequal.

S. Von Viertel- zu Viertelstunde ein Pulver, bis Erbrechen folgt.

Anwend. Als Brechmittel.

Radius.

522. Rx. Tartari stibiat. gr. iij

„ depur. ʒj.

M. f. pulvis.

S. Auf einmal zu geben.

Anwend. Als Brechmittel, wenn man gleichzeitig gallige Stoffe im Magen und Zwölffingerdarme ausführen will.

Jahn.

523. Rx. Decoct. hordei ʒij

Tartari emetici gr. ij

Mellis despum. ʒj.

S. S. Während eines Tages zu verbrauchen.

Potio antiphlogistica Brerae.

Anwend. Bei hitzigen Fiebern, wenn den ersten Anzeigen Genüge geleistet ist. Sie bewirkt ein leichteres Vonstatten-gehen der Exkretionen und Krisen.

524. Rx. Tartari stibiat. gr. vj—xij.

Infus. fol. aurant (Aquae chamom.) ʒxij

Syrup. simpl. ʒij.

M. S. Aller 2 Stunden den 6. Theil.

Anwend. Gegen Entzündung der Lungen, der Pleura, der Hirnhaut, hitzigen Rheumatismus, nachdem bei heftiger Entzündung hinreichend Blut entzogen worden ist.

Laennec.

525. *Ry.* Tart. stibiat. gr. vj—xij
 Infus. fl. chamomill. $\bar{3}$ vj—iv
 Syrup. althaeae $\bar{3}$ j.

S. S. Aller 2, bei erfolgtem Erbrechen aller 3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Brustentzündung.

Teallier. Peschier.

526. *Ry.* Tartari stibiat. gr. j—iij
 Infus. flor. arnicae $\bar{3}$ v
 Syrup sacchari $\bar{3}$ j.

S. S. Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Amaurose.

Polidoro.

527. *Ry.* Tartari stibiat. gr. ij
 Magnes. sulphuric. $\bar{3}$ j.
 Solve in
 Aquae destill. $\bar{3}$ vj.

M. D. S. Eine halbe Tasse voll alle Stunden zu nehmen.

P. Frank.

528. *Ry.* Aquae chamomill. $\bar{3}$ vj
 Magnes. sulphuric. $\bar{3}$ j
 Tartari stibiat. gr. j
 Syrup. commun. $\bar{3}$ j.

S. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen gastrische Fieber, wenn die Zunge stark, fest und etwas trocken belegt, Erbrechen oder Neigung dazu vorhanden ist ohne Erleichterung, Appetitlosigkeit, wässerige Diarrhöe, flüchtiger Schweiss u. s. w.

Jahn.

529. *Ry.* Aquae flor. sambuci $\bar{3}v$
 Kali nitric. $\bar{3}\beta$
 Antimon. tartaris. gr. iij
 Syrup. commun. $\bar{3}j$.

S. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen hitzigen oder chronischen Rheumatismus.

Thilenius.

530. *Ry.* Tartari stibiat. gr. vj
 Nitri puri $\bar{3}ij$
 Aquae fl. sambuc. $\bar{3}vj$
 Syrup. simpl. $\bar{3}\beta$.

S. S. *Stündlich unausgesetzt, wenn auch Brechen erfolgt, 1 Esslöffel voll.*

Anwend. Bei entzündlichen Brustaffektionen.

Brosius.

531. *Ry.* Tartari stibiat. gr. vj
 Infus. fl. tiliae $\bar{3}vj$
 Syrup. diacod. $\bar{3}j\beta$.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Veitstanz.

Breschet.

532. *Ry.* Tartari stibiat. gr. j
 Gummi mimos. elect. $\bar{3}\beta$.
 Solve in
 Aquae destill. $\bar{3}viij$.
 Adde
 Aquae fl. aurantior. $\bar{3}\beta$
 Syrup. capit. papaver. $\bar{3}j$.

M. D. S. *Zwischen den Anfällen des Wechsel-
 fiebers (leichter Quartan- und Tertianfieber)
 in der ersten Stunde 1 Esslöffel, in der zwei-*

ten 2, in der dritten 3 u. s. f. bis zum Essen.
Zwei Stunden nach dem Essen wieder mit 1
Esslöffel anzufangen u. s. w.

Peysson's Fiebermittel.

533. *Ry.* Tartari stibiat. gr. xv— $\mathfrak{z}$ j
Natri carbon. dep.
Ammonii muriat. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ j.

Solve in

Decoct. cort. chinae fusc. ($\mathfrak{z}$ j) $\mathfrak{z}$ x.

D. S. Umgeschüttelt, aller 2—1 Stunden 1 Ess-
löffel.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

(Zwar unchemisch, aber durch Erfahrung bewährt.)

Schwartze.

534. *Ry.* Emuls. camphorat. $\mathfrak{z}$ x
Tartari stibiat. gr. v.

D. S. Stündlich 1 Esslöffel voll.

Anwend. Als Diaphoreticum und Alterans.

535. *Ry.* Tartari stibiat. in aqua solut. gr. xviii
Flor. arnicae pulv.
Rad. valerian. pulv.
Sapon. medic. pulv.
Gummi ammoniac.
Asae foetid. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ ij.

M. f. pil. gr. iv.

D. S. 8—10 Stück 3—4mal täglich.

Pilulae resolventes Richter's.

Anwend. Bei angehender Amaurose.

Diesen ähnlich sind die Pilulae resolventes Schmucker's.

536. **Ry.** Gumm. ammoniac.
 Sapon. medic.
 Rad. rhei.
 Extr. valerian. s. arnic. s. taraxaci $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Tartari stibiat. in s. q. aquae sol. gr. $\overline{vj}$ — $\overline{xij}$.
 M. f. pil. gr. $\overline{ij}$. Consp. lycop.

S. *Täglich 2mal 4—8 Stück.*

Anwend. Zur Erregung der Thätigkeit der Gangliennerven, daher bei vielen Fällen von Amaurose nützlich. Bei Stockungen in den parenchymatösen Eingeweiden des Unterleibes, Verschleimungen u. s. w.

Die zusammengesetzten und an Brechweinstein zu reichen Schmucker'schen und Richter'schen Pillen ersetzend.

Radius.

537. **Ry.** Tartari stibiat. gr. $\overline{vj}$
 Castor. moscov.
 Pulv. fol. sennae s. resin.
 „ rad. rhei $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Extr. taraxaci q. s.
 M. f. pil. gr. $\overline{ij}$. Consp. cinnam.

S. *2—3mal täglich 4—8 Stück.*

Anwend. Gegen Abdominalamaurose.

Fr. Jäger.

538. **Ry.** Tartari stibiat. gr. $\overline{xij}$
 Pulv. rad. valerian.
 „ fl. arnicae
 Asae foetid. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$
 Extr. pulsatillae $\overline{3\beta}$.
 M. f. c. aquae q. s. pil. gr. $\overline{ij}$. Consp. lycop.

S. *Täglich 3mal 15 Stück zu nehmen.*

Anwend. In derselben Krankheit.

Rust.

539. *Rx.* Tartari stibiat. $\mathfrak{3ij}$
Solve in
Aquaе destill. $\mathfrak{8j}$.

D. S. Waschwasser.

Anwend. Bei unempfindlicher Haut, chronischem Rheumatismus, chronischen Hautausschlägen u. s. w.

540. *Rx.* Tartari stibiat. $\mathfrak{3ij}$
Hydrargyr. muriat. corr. gr. $\mathfrak{vj}$
Aquaе destill. $\mathfrak{3j\beta}$.

S. S. Die Haut mit erwärmtem Flanell und dann mit dem Wasser zu reiben, welches möglichst warm sein muss.

Anwend. Um schnell und stark die Haut zu reizen; bei chronischem Rheumatismus.

Hannay. Ellis.

541. *Rx.* Tartari stibiat. $\mathfrak{3j}$
Aquaе destill. $\mathfrak{3vij}$.

S. S. Zu Bähungen mittelst Tüchern.

Anwend. Gegen hitzigen Rheumatismus, nebst innerlichem Gebrauch einer starken Lösung des Brechweinsteins.

Delpech.

542. *Rx.* Tartari stibiat. $\mathfrak{3ij}$
Ungt. rosat. s. Axung. porc. $\mathfrak{3vj—iv—ij}$.
M. f. unguentum.
S. Salbe.

Unguentum tartari stibiati Autenriethii.

Anwend. Zur Reizung und Blatterbildung auf der Haut.

Autenrieth.

543. *Ry.* Tartari stibiat. $\bar{3}j$
 Emplastr. adhaesiv. $\bar{3}iij-vj$.
 Malax. exact.

S. Pflaster.

Brechweinsteinpflaster.

Anwend. Um starken Reiz und Pusteln auf der Haut zu erregen.

544. *Ry.* Tartari stibiat. gr. ij
 Aquae destill. $\bar{3}ij$.

S. D. S. Augentropfwasser.

Anwend. Bei Hornhautverdunkelung.

Reil.

545. *Ry.* Tartari stibiat. gr. $ij-v$
 Mellis despumat. $\bar{3}j$

M. S. Augensalbe.

Anwend. Gegen Leukome.

van Goescher.

546. *Ry.* Tartari stibiat.
 Camphor. $\bar{a}\bar{a}$ gr. iv
 Butyr. rec. insuls.
 M. exactiss.

S. Augensalbe.

Anwend. Gegen Leukome.

Fabini.

547. *Rx.* Tartari stibiat. gr. iv
Butyr. rec. insuls.
Olei ricini āā 3j.
M. exact. F. unguentum.

S. Früh und Abends einer Linse gross in's Auge zu bringen.

Anwend. Bei Verdunkelung der Hornhaut. Nach vorherigem gelinden Reiben des obern Augenlides wird das Auge eine Stunde lang mit einem warmen Tuche verbunden. Bei erhöhter Sensibilität des Auges setzt man der Salbe einige Tropfen Tinct. opii zu.

Witzmann.

548. *Rx.* Tartari stibiat. subtiliss. pulv. 3ß
Axung. porc. 3vij
Ungt. hydrargyr. ciner. 3j.
M. f. unguentum.

D. S. Nussgross einzureiben.

Anwend. Bei chronischer Gastritis nach Blutentziehungen und Leibesöffnung auf den Unterleib einzureiben. Man lässt die kleinen Pusteln, die nicht sehr schmerzhaft sind, eintrocknen und wiederholt die Einreibung.

Stockes.

549. *Rx.* Tartari stibiat.
Empl. diachyl. simpl. āā.
Malax.

S. Pflaster.

Anwend. Als kräftiges Reizmittel in der Nähe der Augen und auf das obere Augenlid oder die Augenbraunengegend bei Blepharoptosis paralytica.

Jüngken.

550. *Ry.* Emplastr. conii macul. magnit. volae manus,
cui inspersa sunt
Tartari stibiat. gr. xxiv.

S. Pflaster.

Anwend. Als erregendes Mittel bei indolenten Bubonen.

Ricord.

551. *Ry.* Pulv. tartar. stibiat.
Empl. vesicat.
„ citrin. āā 3j
Hydrargyr. muriat. corr. gr. xiv.
Malax.

D. S. Auf Leder zu streichen.

Anwend. Um schnell und beträchtlich in die unterliegenden organischen Gebilde durch Gegenreiz auf die Haut zu wirken. Anfangs entstehen Blasen, später Pusteln.

Kopp.

552. *Ry.* Resin. pini burg. 3jß
Euphorbii 3ß.
Leni igne liquatis admisce
Tartari stibiat.
Opii pulverat. āā 3j, antea cum, aquae destill.
paux. in pultem trita, et
Terebinth. laric. 3j.
M. f. emplastr.

D. S. Auf Leder gestrichen über den Unterleib zu legen.

Anwend. Bei Durchfällen von unterdrückter Hautthätigkeit oder dergleichen. (Für eine reizbare Haut ist das Pflaster viel zu stark.)

Phöbus.

Vinum stibiatum; Brechwein.

(*Vinum Antimonii s. emeticum, Vinum antimoniatum Huxhami, Aqua benedicta Rulandi; Spiessglanzwein.*)

Form u. Gabe. Rein oder in Mixturen als gelin-
des Reiz- und Auflösungsmittel zu 5—20 Tropfen täg-
lich einigemal, als Brechmittel zu 25—80 Tropfen.

553. *Ry.* Vini stibiat. ȝiij
Tinct. opii crocat. ȝj .

M. D. S. Täglich 2—3mal 30 Tropfen.

Anwend. Gegen rheumatische Ruhr.

Richter.

554. *Ry.* Vini stibiat. $\text{ȝ}\beta$
Oxymell. scillit.
Syrup. althaeae āā ȝiij .

M. S. Aller 4 Stunden 1 Theelöffel bis zur Wir-
kung.

Anwend. Brechmittel für kleine Kinder.

Berends.

555. *Ry.* Vini stibiat. gutt. xx
Elix. succ. liquirit. $\text{ȝ}\beta$
Aquae foenicul. $\text{ȝ}\beta$
Syrup. althaeae ȝj .

M. S. Aller $1\frac{1}{2}$ Stunden 1 Theelöffel.

Anwend. Bei Brustleiden kleiner Kinder.

Vogt.

556. *Ry.* Ammoniacy
 Ammonii muriat. dep. āā 3j
 Oxymell. scillit. 3β
 Vini stibiat. 3j
 Syrup. althaeae 3iv.

S. S. Esslöffelweise.

Syrupus pectoralis resolvens Sellii.

Anwend. Gegen chronischen Husten, Asthma, Schwindsucht.

Selle.

557. *Ry.* Vini stibiat. 3j
 „ scillit. 3iij.

M. S. Aller 2—3 Stunden 50—100 Tropfen.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Lentin.

558. *Ry.* Vini stibiat.
 Liqu. ammon. anis. āā 3ij
 Oxymell. scillit. 3β
 Syrup. althaeae
 Aquae foenicul. āā 3j.

M. D. S. Theelöffelweise.

Anwend. Gegen Husten und Schleimansammlung in den Bronchien.

Schubarth.

Argentum. Silber.

- A. Argentum ammoniato-muriaticum.
 Salzsaures Ammoniaksilber.

(*Chloruretum Argenti et Ammoniaci;*
Silbersalmiak.)

Form u. Gabe. In Pillen zu gr. $\frac{1}{14}$ — $\frac{1}{2}$ täglich
 3mal, *Serre. Ricord* bis gr. xiv täglich.

559. *Rx.* Argenti ammoniat. mur. gr. j
 Pulv. rad. irid. florent. gr. ij
 Conserv. tiliae q. s.
 F. massa perquam spissa. Div. in xiv pil. Consp.

S. Täglich 3—4mal eine Pille.

Anwend. Gegen Syphilis.

Serre.

B. Argentum chloratum. Chlorsilber.

(Arg. muriaticum s. salitum, Chloruretum Argenti; salzsaures Silber, Hornsilber.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. $\frac{1}{3}$ — j, täglich einigemal. Einreibung in die Zunge zu gr. $\frac{1}{8}$.

560. *Rx.* Argenti chlorat. gr. j
 Pulv. irid. flor. bene siccant. gr. ij.
 Trit. in mort. vitr. f. pulv. subtiliss. Div. in viij—x part. aequal.

S. Ein Stück in die Zunge einzureiben.

Anwend. Gegen Syphilis.

Serre.

561. *Rx.* Argenti muriat. gr. j
 Pulv. rad. gentian. amarell. $\mathfrak{z}$ ij—iv.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

M. S. Täglich 3mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen Epilepsie der Kinder.

Werneck.

C. Argentum cyanogenatum. Cyansilber.

(*Argentum hydrocyanicum; blausaures Silber.*)

Form u. Gabe. Wie das vorige.

562. Rx. Argent. cyanogenat. gr. x—xij

Axungiae $\bar{\text{z}}$ j.

M. exacte, f. ungt.

S. Salbe.

Anwend. Zum Verbande von Geschwüren.

Serre.

D. Argentum iodatum; Jodsilber.

(*Argent. oxyd. hydroiodicum.*)

Form u. Gabe. Pulver, Pillen, Einreibung in die Zunge, zu gr. $\frac{1}{14}$ — $\frac{1}{8}$.

563. Rx. Argent. iodat. gr. x—xij

Axungiae $\bar{\text{z}}$ j.

M. exacte. F. ungt.

S. Salbe.

Anwend. Zum Verbande von Geschwüren.

Serre.

E. Argentum nitricum fusum et crystallisatum. Krystallisirtes, salpetersaures Silber.

(*Lapis infernalis, Nitras argenticus fusus; Höllenstein.*)

Form u. Gabe. In Auflösungen und Pillen, zu gr. $\frac{1}{16}$ — ij, täglich 4mal. Aeusserlich in Lösungen zu gr. $\frac{1}{4}$ — xx auf $\mathfrak{z}$ j Wasser, als Salbe zu gr. $\frac{1}{4}$ — vj auf $\mathfrak{z}$ j, als Aetzmittel in Substanz.

Man vermeide Verbindungen mit gemeinem Wasser, Schwefel- und Salzsäure, Schwefellebern, reinen, kohlensauren, salzsauren, hydriods., hydrobroms., hydrothions., phosphors., arsenichts., blausauren Alkalien und den entsprechenden Säuren, essigsaurem Kali, Natrum, Blei u. a. Salzen, Seifen, Gerbestoff, vielen Extrakten, Schleimharzen, Harzen, ätherischen Oelen, Aether, Phosphor, Kohle, Zucker, Süssholz, Gummi u. s. w., Hitze, Luft, Licht. Zinn- oder Bleilöffel zum Einnehmen.

564. Rx. Argenti nitrici cryst. gr. xij
Aquae destill. simpl. $\mathfrak{z}$ j.

S. D. ad vitrum nigrum.

S. *Früh und Abends 20 Tropfen.*

Anwend. Gegen Epilepsie und andere convulsivische Krankheiten.

D. Hosp.

565. Rx. Argenti nitrici fus. gr. xij.
Solve in
Aquae laurocerasi $\mathfrak{z}$ j.

M. D. S. *Morgens und Abends 10—20 Tropfen in einem schleimigen Getränke.*

Anwend. In gleichen Fällen wie das vorige.

Remer.

566. *Ry.* Argenti nitrici cryst. gr. β
Aquae fl. aurantior.
Syrup. cinnam. $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$.

S. S. Stündlich 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen nervöses Erbrechen eines 5 monatlichen Kindes.

Ruef.

567. *Ry.* Argenti nitrici cryst. gr. j .
Solve in
Aquae destill. simpl. $\overline{3}ij$.

Adde

Tinct. opii simpl. $\mathfrak{z}j$

Mucilag. gumm. mimos. $\overline{3}j$.

M. D. in vitro charta nigra obducta.

S. Dreimal täglich 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen epileptische Zufälle.

Sundelin.

568. *Ry.* Argenti nitrici cryst. $\mathfrak{z}\beta$
Opium puri gr. vj
Extr. conii $\overline{3}ij$
Succi liquirit. $\overline{3}j$.

M. f. pil. gr. ij . Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 2—5 Stück.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Heim.

569. *Ry.* Argent. nitrici cryst. paux. aquae solut. gr. x
Extr. hyoscyam. $\mathfrak{z}j$

„ valerian. $\overline{3}j$

Pulv. rad. valerian. q. s.

ut f. pil. No. 90.

O. S. Anfangs täglich 3mal eine Pille.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Löbenstein.

570. *Ry.* Argenti nitrici cryst. ʒß
 Opii crudi gr. v
 Extr. gentian. ʒj
 Succ. liquirit. inspiss. ʒij.
 M. f. pil. gr. j.

S. Morgens und Abends 3 Stück.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Reil.

571. *Ry.* Argenti nitrici fus. gr. vj
 Extr. gummos. opii ʒj
 Moschi ʒij
 Camphor. ʒiv.
 M. f. pil. No. xcvj.

D. S. Anfangs früh und Abends eine Pille u. nach und nach zu steigen.

Anwend. Gegen Epilepsie, nervöses Zittern und Lähmung.

Hôp. de Paris.

572. *Ry.* Argent. nitrici fus. gr. iij
 Extr. valerian. ʒjß
 Pulv. rad. artemis. vulg. q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. cinnam.

S. Früh und Abends 3 Pillen und aller 3 Tage ein Stück mehr.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Fuchs.

573. *Ry.* Argent. nitrici cryst. ʒß
 Rad. iridis flor. ʒj.
 F. c. paux. mucil. gumm. mimos. pil. No. XL.
 Consp irid. flor.

S. Täglich 2 mal 1—3 Pillen.

Anwend. Gegen Magenkrampf, Reizbarkeit des Magens, Epilepsie.

Radius.

574. *Ry.* Argent. nitrici fus. gr. iij.

Solve in

Aquae destill. s. q.

Adde

Pulv. rad. liquirit. ℥iijß.

M. f. pil. No. xxxvj. Obduc. fol. argent.

D. S. *Aller 2 Stunden 1 Pille (6 Stück während des Tages).*

Anwend. Gegen Cardialgia, Singultus, chronisches Erbrechen, Wasserwürgen, Koliken, Nervenzufälle u. s. w.

Kopp.

575. *Ry.* Argent. nitrici fus. gr. $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{12}$

Succolat. gr. viij

Sacch. lactis gr. iv.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

D. S. *Morgens, Nachmittags und Abends oder 4 mal täglich ein Stück mit Wasser zu nehmen.*

Anwend. Wie das vorige.

Kopp.

576. *Ry.* Nitrat. argenti 3ß

Panis biscocti pulv. 3jß.

M. f. pulv. Div. in part. XLV aequal.

D. S. *Täglich 2—6 Stück in Syrup einzunehmen.*

Anwend. Bei Epilepsie, Brustbräune u. in Wurmkrankheiten.

Swediaur.

577. *Ry.* Argent. nitrici fus. gr. iv—x

Aquae destill. 3j.

S. S. *Zum Befeuchten der Charpie.*

Anwend. Zum Verbinden schwammiger und schwieliger Geschwüre.

578. Rx. Argent. nitrici crystall. $\text{3}\beta$ — 3j .

Solve in

Aquae chamomill. 3vj .

Adde

Tinct. opii simpl. 3j — $\text{j}\beta$.

M. D. in vitro chart. nigra invol.

S. Verbandwasser. Umgeschüttelt mittelst Leinwandläppchen aufzuschlagen und Wachstaffet darauf zu legen.

Anwend. Bei qualitativ schlechter Eiterung, oder zum Vernarben eines ganz dazu vorbereiteten, aber nun stehenbleibenden Geschwüres, bei schlaffer und wuchernder Granulation u. s. w.

Kluge. Rust.

579. Rx. Argent. nitrici fus. gr. ij — iiij .

Solve in

Aquae cerasor. nigr. 3vj

Tinct. opii $\text{3}\beta$.

S. S. Mit Charpie aufzulegen.

Anwend. Bei tiefen und übel aussehenden Geschwüren der Brustwarzen.

Mappes.

580. Rx. Argent. nitrici cryst. 3j

Aquae destill. simpl. 3iv .

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei Thränenfistel.

Beer.

581. Rx. Argent. nitrici fus. gr. j — ij

Aquae destill. simpl. 3ij .

Solut. filtr. D. in vitro chart. nigr. obducto.

S. Augentropfwasser.

Anwend. Bei Wucherungen der Augengebilde.

Rust.

582. *Ry.* Argent. nitrici cryst. gr. x
Aquae destill. $\bar{3}j$.

S. S. *Ins Auge zu träufeln.*

Anwend. Bei stark eiternden, torpiden und hartnäckigen Ophthalmoblennorrhöen.

v. Gräfe.

583. *Ry.* Argent. nitrici cryst. gr. j—ij
Aquae destill. simpl. $\bar{3}j$.
Sol. filtr. D. in vitro chart. nigr. obduct.

S. *Augentropfwasser.*

Anwend. Bei Augenblennorrhöen, Staphylom, skrofulösen Augenentzündungen, Hornhautgeschwüren.

Radius.

584. *Ry.* Argent. nitrici cryst. $\bar{3}j$
Aquae destill. simpl. $\bar{3}j$.

S. S. *Zum Auspinseln des Rachens.*

Anwend. Gegen Croup.

Mackenzie.

585. *Ry.* Argent. nitrici fus. gr. iv
Aquae sabinae $\bar{3}vj$
Laudan. liquid. Sydenh. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. *Zum Gurgeln.*

Anwend. Gegen syphilitische Halsbeschwerden, Schmerz beim Schlingen, Röthe an den hinteren Partteen u. s. w.

Kopp.

586. *Ry.* Argent. nitrici cryst. gr. j
Aquae destill. $\bar{3}j$.

S. S. *Lauwarm einzuspritzen.*

Anwend. Bei eiterartigen Otorrhöen und Caries der Gehörknochen.

Buchanan.

587. *Ry.* Argent. nitric. gr. x
Aquae rosarum $\bar{3}j$.

S. S. Morgens und Abends das Ganze in die Harnröhre mittelst einer Spritze von Horn oder Glas einzuspritzen und die Harnröhre $2\frac{1}{2}$ Zoll hinter der Mündung zusammenzudrücken, damit die Einspritzung nicht zu tief eindringe.

Injectio antiblennorrhoeica Burnettii.

Anwend. Beim ersten Auftreten des Trippers.

588. *Ry.* Argent. nitrici cryst. gr. xv
Aquae destill. $\bar{3}j$.

S. S. Mittelst einer gläsernen Spritze in die Harnröhre einzuspritzen, aller 2 Tage einmal.

Anwend. Zur abortiven Behandlung des Trippers an dem ersten Tage nach erfolgter Ansteckung, ehe Entzündung erscheint.

Ricord.

589. *Ry.* Argent. nitrici gr. ij—x
Aquae destill. $\bar{3}viii$.

S. S. In die Harnröhre einzuspritzen, täglich 1—2 mal.

Anwend. Beim chronischen Tripper.

Ricord.

590. *Ry.* Argent. nitrici cryst. gr. ij—iv.

Solve in

Aquae destill. $\bar{3}iv$.

Adde

Tinct. opii simpl. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. In die Harnröhre einzuspritzen.

Anwend. Nach gehobener Entzündung des Trippers, wenn der Ausfluss den gewöhnlichen Mitteln nicht weicht.

Walther.

591. *Ry.* Argent. nitrici cryst. gr. j—vj.

Solve in

Aquae destill. $\bar{3}j$.

S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei Blennorrhoea intestini recti nach Beseitigung der Entzündung.

Ricord.

592. *Rx.* Argent. nitrici gr. j.
Solve in
Aquae destill. simpl. $\bar{3}$ j.

S. Zum Einspritzen.

Anwend. In die weibliche Scheide beim Tripper nach besel-
tigter Entzündung.

Ricord,

593. *Rx.* Argent. nitrici fus. pulv. $\mathfrak{z}\beta$ —j
Bals. peruvian. $\bar{3}$ j
Unguent. zinci $\bar{3}\beta$.
M. f. ungt.

D. S. Zum Verband.

Unguentum nigrum Frickii.

Anwend. Wenn syphilitische Geschwüre bis auf eine kleine
Stelle heil sind, aber die völlige Vernarbung nicht zu
Stande kommen will. Die Salbe bleibt 2—3 Tage ungewech-
selt liegen, bis sie durch den Eiter oder zugleich mit dem
Schorfe abgestossen wird.

Fricke.

594. *Rx.* Argent. nitrici in pulv. subtiliss. triti gr. ij—x
Ungt. cetacei $\bar{3}$ j.
Intime in mort. porphyr. mixtis sensim adde te-
rendo

Liquor. plumb. subacetici gutt. xv.

S. Wie ein Nadelkopf gross zwischen die Augen-
lider zu bringen, die Lider gelind zu reiben und
was aus ihnen hervortritt abzuwischen. Man
kann die Menge der einzubringenden Salbe bis
zur Grösse einer Erbse steigern.

Meistens reicht man aus, wenn man die Salbe nur
jeden dritten Tag anwendet und in der Zwi-
schenzeit ein erweichendes Augenwasser brauchen
lässt.

Unguentum ophthalmicum magicum Guthriei.

Anwend. Gegen akute und chronische Augenliderentzündung,
besonders gegen alte chronische Entzündung mit Geschwü-
ren der Hornhaut.

Guthrie. Radius.

F. Argentum oxydatum; Silberoxyd.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$,
2—3mal täglich. Aeusserlich als Salbe, ℥j auf ℥j.

595. R̄. Argent. oxyd. gr. xx
Axungiae ℥j.
M. exact. f. unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen Syphilis.

Serre.

G. Argentum purum; reines Silber.

Form u. Gabe. Zu feinem Pulver vertheilt als
Einreibung in die Zunge zu gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ gegen Syphilis
von Serre empfohlen, hat sich nicht bewährt. Aeusser-
lich als Pflaster.

596. R̄. Argenti pulverat. ℥j
Zinci pulverat. ℥ij
Laccae in tabulis ℥v
Boracis ℥j.
M. f. in aqua fervida emplastrum supra linteam
tenuiter expandendum.

Emplastrum electricum Harringtoni.

Anwend. Gegen Neuralgieen.

Harrington.

Arnicae flores et radix. Wohlverleih-
blumen und Wurzel.

(Von *Arnica montana* L.; Fallkraut, Engel-
kraut, Mutterwurz.)

A. Flores Arnicae.

Form u. Gabe. Im Aufguss oder leichter Abko-
chung zu $\mathfrak{3}\beta$ — $\mathfrak{3iij}$ auf $\mathfrak{3vj}$, 2stündlich 1 Esslöffel. Nicht
gern in Pulver, eher in Bissen oder Lattwerge zu gr.
v—x, 3—4mal täglich. Die Tinktur zu 10—40 Tropfen
auf Zucker oder in Thee, 3—4mal. Das Extrakt in Pil-
len oder Mixturen zu gr. v—x. Das äther. Oel zu 1—2
Tropfen. Aeusserlich im Aufgusse zu Umschlägen, Bäu-
hungen, Klystieren, als Niese- und Streupulver, und die
Tinktur als Einreibung.

Man vermeide Verbindungen mit Eisenoxydsalzen, ar-
gent. nitric., aurum muriat., plumbum acetic.

597. *Ry.* Flor arnicae $\mathfrak{3ij}$.

Inf. aquae ferv. q. s. ad col. $\mathfrak{3vj}$.

Gumm. mimos. $\mathfrak{3ij}$

Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{3j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen torpide Nerverfieber.

Berends.

598. *Ry.* Flor. arnicae $\mathfrak{3}\beta$.

Inf. c. aquae bull. q. s. ad col. $\mathfrak{3vj}$.

Refrigerat., adde

Liqu. ammon. succin. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Aether. sulphur. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen torpide Nerverfieber.

Horn.

599. *Ry.* Flor. arnicae $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Infund. c. aquae ferv. q. s. Digere per $\frac{1}{2}$ horam.

Colat. $\mathfrak{z}\text{vj}$ refrigr. adde

Camphorae trit. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. f. l. a. Emulsio.

D. S. Umgeschüttelt 2stündlich 1 Esslöffel.

Horn.

600. *Ry.* Flor. arnicae $\mathfrak{z}\beta$.

Inf. aquae fervid. q. s. Colat. refrig. $\mathfrak{z}\text{iiij}$ adde

Syrup. cort. aurantior. $\mathfrak{z}\beta$

Spirit. nitrico - aether. gutt. vj .

M. D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. In den späteren Stadien des Hydrocephalus acutus.

Goelis.

601. *Ry.* Flor. arnicae $\mathfrak{z}\beta$

Herb. melissae $\mathfrak{z}\text{ij}$

Rad. liquirit. $\mathfrak{z}\text{j}$

Sem. anisi stellat. $\mathfrak{z}\text{j}$.

C. C. M. Disp. tal. dos. iv .

S. Eine Portion mit $\mathfrak{z}\text{j}$ Wasser aufzubrühen und auf 4mal den durchgeseihten Aufguss zu verbrauchen.

Aller 4 Tage um gr. x mit der Arnica zu steigen.

Anwend. Gegen Amaurose, Lähmungen der Glieder u. s. w.

Vogt.

602. *Ry.* Flor. arnicae
 „ roris marini
 Rad. valerianae $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.
C. M. f. Species.

S. Zum Thee.

Rust.

603. *Ry.* Flor. arnicae
 Herb. millefol.
 Rad. liquirit. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$
 Flor. chamomill. $\overline{3iv}$
 Sem. anisi stell. $\overline{3j}$.
C. C. M. f. Species.

D. S. Zwei Esstöffel voll mit einem halben Quart kochenden Wassers aufzugießen.

Anwend. Bei veralteten Katarrhen.

Selle.

604. *Ry.* Flor. arnicae $\overline{3\beta}$
 „ verbasci $\overline{3j\beta}$.
C. M. f. Species.

S. Drei Finger voll zu 2 Tassen Thee aufzugießen.

Anwend. In chronischen Krankheiten, besonders der Brust.

Choulant.

605. *Ry.* Infus. flor. arnicae ($\overline{3ij}$) $\overline{3vj}$.
S. Zum Bähnen.

Anwend. Gegen hysterische Verschlussung der Augenlider.

Beer.

606. *Rx.* Flor. arnicae $\bar{3}$ ij
Herb. rutae $\bar{3}$ j.

Infunde

Aquae fervid. q. s. ad colat. $\bar{3}$ xij.

S. Mit Kompressen über das Auge zu schlagen.

Anwend. Gegen Quetschungen und Blutaustretungen im Auge.

v. Gräfe.

607. *Rx.* Flor. arnicae $\bar{3}\beta$.

Infund. acet. q. s. ad colat. $\bar{3}$ vj.

Ammon. carbon. $\bar{3}$ ij.

M. S. Warm zum Umschlage zu verwenden.

Anwend. Gegen Oedema Scroti, wo nasse Umschläge anwendbar sind.

Neumann.

608. *Rx.* Infus. flor. arnicae ($\bar{3}$ j) $\bar{3}$ vj

Gumm. mimos. $\bar{3}\beta$

Olei terebinth. $\bar{3}$ ij

Camphor. trit. $\bar{3}$ ij.

M. D. S. Umgeschüttelt zu Fomentationen.

Anwend. Gegen Brand.

Richter.

609. *Rx.* Flor. arnicae
„ sambuci
Herb. conii macul.

„ abrotani

„ serpylli $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij.

C. M. S. Zwei Hände voll mit 2—3 Kannen kochenden Wassers aufzugießen, worin lauwarm täglich 3—4 mal die Hände oder Füße zu baden.

Anwend. Gegen alte Erfrierungen.

Radus.

610. *Ry.* Flor. arnicae
 „ chamomill.
 Herb. serpylli
 „ roris marini
 „ abrotani āā ̄ij.
C. M. f. Species.

D. S. Eine Hand voll mit 1 Kanne kochenden Wassers aufzugießen, $\frac{1}{2}$ Kanne Essig hinzu zusetzen und lauwarm als Umschlag zu gebrauchen.

Anwend. Nach Quetschungen mit Blutunterlaufungen, besonders da wo kalte Umschläge nicht vertragen werden, z. B. über die Brust bei reizbaren, zu Husten geneigten Personen.

Walther.

611. *Ry.* Flor. arnicae pulv.
 Herb. rutae āā ̄jß
 Cort. chinae ̄ijj.
M. f. Species.

D. S. Mit Gerstenwasser zu Breiumschlägen zu machen.

Anwend. Gegen Phimose und Paraphimose bei Tendenz zum Brand.

Wendt.

612. *Ry.* Camphorae ̄ij.
 Solve in
 Olei terebinth. rectific. ̄ß.
 Adde
 Pulv. gumm. mimos. ̄ß
 ut f. cum
 Infus. flor. arnicae (̄j) ̄vj l. a. emuls.

D. S. Umgeschüttelt überzuschlagen.

Anwend. Bei Sphacelus siccus.

G. A. Bichter.

613. R_y. Flor. arnicae
 „ chamomill.
 Rad. valerian. min. āā 3j.
 Conc. M. f. spec.

D. S. Den vierten Theil mit 2 Tassen Wasser aufgebrüht, durchgeseiht und 2 Esslöffel Leinöl zugesetzt, zum Klystier.

Anwend. Bei Trägheit des Darmkanals, Anschoppungen im Unterleibe, besonders von sitzender Lebensweise.

Walther.

B. Radix Arnicae.

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, Aufguss, Abkochung zu ʒß—3ij, mehrmals täglich.

Man vermeide dieselben Verbindungen, wie bei Flores arnicae angegeben worden ist.

614. R_y. Rad. arnicae
 „ columbo āā 3ij
 Cort. cascarill. 3iij.
 Infund. aquae ferv. q. s. ad col. 3vij.
 Syr. cort. aurant. 3j.

M. S. Aller 3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen atonische Diarrhöe.

Berends.

615. R_y. Rad. arnicae 3ß.
 Infund. c. aquae ferv. q. s. Diger. per 1/4 hor.
 Colat. express. 3vij adde
 Pulv. rad. salep 3j
 Tinct. opii crocat. ʒj
 Syrup. aromat. 3j.

M. S. Stündlich 1—2 Esslöffel.

Anwend. Gegen Ruhr.

Remer.

616. *Ry.* Radic. arnicae

„ polygal. amar. $\overline{\text{aa}}$ $\overline{\text{3}}\beta$.

Coque c. aquae font. $\overline{\text{3xvj}}$ ad rem. $\overline{\text{3viiij}}$.

Sub finem coct. adde

Radic. calami aromat. $\overline{\text{3}}\beta$.

Colat. adde

Extr. cascarill. $\overline{\text{3ij}}$

Tinct. opii simpl. $\overline{\text{3}}\beta$

Spirit. nitrico-aeth. $\overline{\text{3ij}}\beta$

Syrup. cort. aurant. $\overline{\text{3j}}$.

M. D. S. Alle Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Atonie des Unterleibes [mit Durchfall.

Richter.

617. *Ry.* Pulv. radic. arnicae

Elaeosacch. anisi $\overline{\text{aa}}$ $\overline{\text{3}}\beta$.

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

D. S. Aller 3 Stunden 1 Pulver mit Wasser zu nehmen.

Vogel.

C. Extractum Arnicae.

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Lösung zu gr. viij — xv, täglich mehrmals.

Das Extrakt wird sowohl aus den Blumen als aus der Wurzel bereitet.

618. *Ry.* Extr. arnicae $\overline{\text{3ij}}$

Aquae menthae pip. $\overline{\text{3viiij}}$

Syrup. chamomill. $\overline{\text{3ij}}$.

M. D. S. Aller 3 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Magen- und Unterleibsschwäche.

Vogel.

619. *R.* Extr. arnicae 3jß
 „ columb. 3ij
 Aquae menthae crispae 3iv
 Spirit. muriat. aeth. 3ß.

S. S. Täglich 3 mal 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen atonische Schleimflüsse des Unterleibes.

Sundelin.

620. *R.* Extr. flor. arnicae
 „ stipit. dulcamar.
 Gumm. guajac. āā 3ij
 Sulphur. aurat. antim. 3ß
 Calomelan. gr. xv.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Dreimal täglich 5—8 Pillen.

Anwend. Gegen anomale Gicht.

Rust.

621. *R.* Extr. arnicae
 Sapon. venet.
 Gumm. res. galbani āā 3j
 Tartari stibiat. gr. vj.
 M. f. pil. gr. j. Consp. pulv. rad. liquirit.

S. Morgens und Abends 15 Stück.

Anwend. Im schwarzen Staar von unbekannter Ursache. Nebenbei ein Inf. fl. arnic. zu brauchen.

Thilenius.

622. *R.* Extr. arnicae 3j (ij)
 („ cort. peruv. 3j)
 Sulph. aurat. antim. 3j (ij)
 Camphorae gr. xv (3ß)
 Flor. sulphur. 3ij

Mucil. gumm. arab. q. s.
ut f. l. a. pil. gr. iij (iv).

D. S. Morgens und Abends 3 (7) Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Amaurose in Folge unvorsichtig geheilter Krätze.

Die Gaben und Zusätze, welche eingeklammert sind, müssen gereicht werden, nachdem eine Zeit lang die nicht eingeklammerten Mittel und Dosen gegeben worden waren.

Beer.

D. Tinctura Arnicae.

623. *Ry.* Tinct. arnicae
„ guajac. ammoniat. āā 3iij.

M. D. S. Täglich 4 mal 60 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Bei atonischer Gicht.

Schubarth.

624. *Ry.* Tinct. arnicae
„ castorei āā 3ij.

M. D. S. Täglich 4 mal 20 Tropfen zu nehmen.

Horn.

625. *Ry.* Olei sabinae 3ß
Tinct. colocynthid.
„ capsici annui āā 3j
„ arnicae 3ij.

M. D. S. Zu 15 — 20 Tropfen 4 mal täglich, in Schleim oder Wasser oder Wein verdünnt.

Anwend. Gegen Lähmungen.

Horn.

626. *Rx.* Tinct. arnicae $\mathfrak{Z}\text{vj}$
 Spirit. serpyll. $\mathfrak{Z}\text{iiij}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen die Folgen von unblutigen Beschädigungen,
 nach Contusionen, Verrenkungen.

Kopp.

627. *Rx.* Tinct. arnicae $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Spirit. formicarum $\mathfrak{Z}\text{iiij}$.

M. D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Zur Belebung der Muskelthätigkeit nach Quetschun-
 gen und Verrenkungen.

Walther.

E. Oleum Arnicae aethereum.

628. *Rx.* Olei fl. arnicae aeth. gr. iv.
 Solve in
 Spirit. muriat. aether. $\mathfrak{Z}\beta$.

M. D. S. 3—4 mal täglich 4—8—12 Tropfen in
 Wein zu nehmen.

Anwend. Gegen apoplektische Lähmungen der Gliedmaassen,
 bei Verhärtungen im Unterleibe.

Schneider.

Arsenicum. Arsenik.

A. Arsenicum album; weisser Arsenik.

(*Ars. oxydatum alb.*, *Acidum arsenicosum*, *Calx Arsenici*; weisses Arsenikoxyd, Giftmehl, Rattengift, Hüttenrauch, arsenigte Säure.)

Form u. Gabe. Am zweckmässigsten in Auflösung, selten in Pillen, zu gr. $\frac{1}{30}$ — $\frac{1}{4}$ in aqua destill., besser mit Kali oder Natron verbunden, täglich 2 mal. Aeusserlich zu Augewässern gr. j auf $\mathfrak{z}\beta$, Pinselsäften, Waschungen, Umschlägen gr. β —ij auf $\mathfrak{z}j$, Verbandwässern gr. $\frac{1}{6}$ — $\frac{2}{3}$ auf $\mathfrak{z}j$, Streupulvern, Pasten und Salben.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, Basen, Schwefel, Phosphor, schwefelhaltigen Mitteln, Kupfersalzen, Eisen- salzen, salpeters. Quecksilber und Silber, Seifen, Gerbestoff, Kleber, Gallerte, Eiweiss, Milch, Fleischbrühe, Zucker, Stärkemehl, Kohle, Kalkwasser und gemeinem Wasser.

629. *Rx.* Arsenici albi

Kali carbon. dep. $\overline{aa}$ gr. LXIV .

Coqu. in baln. arenae. Solut. refriger. et colat. adde

Spirit. lavand. comp. $\mathfrak{z}\beta$

Aquae destill. q. s. ut liquoris pondus sit $\mathfrak{z}\text{xvj}$.

S. Kindern von 2 Jahren 2 Tropfen, Erwachsenen 8—12—20 Tropfen täglich 2 mal.

Solutio arsenicalis Fowleri.

Fowler's Arseniksolution.

(10 Tropfen dieser Lösung enthalten $\frac{1}{16}$ gr. Arsenik.)

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Fowler.

630. *Ry.* Arsenici alb. pulv.
 Kali carbon. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Aquae destill. simpl. $\mathfrak{R}\beta$.
M. Coque in baln. aren. ad. solut. arsenici.
 Refrigerat. adde
 Spirit. angelic. comp. $\overline{3j}$
 Aquae destill. simpl. q. s. ut tota solutio con-
 stituat $\mathfrak{R}j$.
 Solutio arsenicalis Heimii.
S. Während der Apyrexie aller 2 Stunden 5—10
 —15 Tropfen, Kindern 1—2 Tropfen.
Anwend. Gegen Wechselfieber.

Heim.

631. *Ry.* Arsenici alb. $\overline{3\beta}$
 Aquae destill. $\overline{3vj}$.
 Solutioni adde
 Aquae cinnamomi simpl. $\overline{3ij}$
 Kali subcarbon. $\overline{3\beta}$
 solutam tenentis.
M. S. 6—15 Tropfen in destillirtem Wasser.
 Solutio arsenicalis Brerae.
Anwend. Gegen Wechselfieber.

Brera.

632. *Ry.* Arsenici alb. subt. pulv.
 Kali carbon. dep. $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$.
 Coqu. c. aquae dest. $\overline{3vj}$.
 Solut. filtrat. adde
 Aquae cinnamom. simpl. q. s.
 ut totius liquoris pondus sit $\overline{3viij}$.
S. Zu 6—12 Tropfen.
 Solutio arsenicalis Harlessii.
Anwend. Gegen Wechselfieber.

Harless.

633. *Ry.* Aquae destill. simpl. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 Syrup. balsam. $\mathfrak{z}\beta$
 Solut. arsenical Heimii $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Wechselfieber der Kinder.

Heim.

634. *Ry.* Arsenici alb. gr. j.
 Solve in
 Aquae destill. simpl. $\mathfrak{z}\text{j}$.

D. S. Anfangs $\frac{1}{2}$, dann 1 Esslöffel voll täglich
 mit Milch zu nehmen.

Anwend. Gegen Krebs.

Rust.

Le Febure wendete dieses Mittel zuerst an und zwar liess derselbe gleich Anfangs alle Morgen nüchtern 1 Esslöffel voll nehmen. Bei sehr reizbaren und empfindlichen Subjekten setzt man jeder Gabe 5—10 Tropfen Opiumtinktur zu.

635. *Ry.* Arsenici alb. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Piper. nigr. $\mathfrak{z}\text{vj}$.
 Contusis et super lapidem marmor. in pulverem
 impalpabilem laevigatis adde terendo
 Mucilag. gumm. mimos. $\mathfrak{z}\text{ix}$.
 F. pil. gr. ij. Consp. pulv. canell. alb.

S. Morgens und Abends 1 Stück.

Pilulae asiaticae.

Anwend. Gegen Elephantiasis. — Bielt gegen Flechten.

636. *Ry.* Arsenici alb. gr. ij
 Opii pulv. gr. viij
 Sapon. medic. gr. xxij.
 M. f. pil. No. xxxij.

D. S. 2mal täglich 1 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Wechselfiebern und örtlichen Krankheiten mit intermittirendem Charakter.

Barton. Marcus.

637. *Ry.* Arsenici albi gr. j—ij
 Aquae destill. ℥j.

S. S. Zum Reinigen des Geschwüres.

Anwend. Bei krebsigen Geschwüren.

Richter.

638. *Ry.* Arsenici albi ʒß
 Aquae destill. octarium.
 Solut. adde
 Extr. conii ℥j
 Liqu. plumb. acetic, ℥iij
 Tinct. opii ℥j.

M. D. S. Alle Morgen damit zu waschen.

Anwend. Gegen Krebsgeschwüre.

Le Febure.

639. *Ry.* Cinnabar. fact. ℥ij
 Cinerum solear. ustar. gr. viij
 Sanguin. dracon. gr. xij
 Arsenic. alb. gr. xl.
 M. f. pulv. subtiliss. D. in vitro sub sigillo.

S. Mit Speichel gemischt anzuwenden.

Pulvis Cosmii s. Bernhardi.

Anwend. Gegen Hautkrebs.

Frère Côme.

640. *Ry.* Arsenici albi gr. viij—xij
Hydrargyr. muriat. mit. ℥ij
M. f. pulv. D. in vitro sub sigillo.

S. Mit einem Charpiepinsel $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ Linie dick auf das Geschwür (ist dieses sehr gross, dann nur auf einen Theil desselben) aufzutragen, nachdem etwa vorhandene Krusten durch Kataplasmen abgeweicht worden sind.

Anwend. Gegen Krebsgeschwüre.

Dupuytren.

641. *Ry.* Arsenici albi subtitiss. pulv. gr. iv—vj
Hydrargyr. muriat. mit. $\text{℥j}\beta$
Gumm. mimos. pulv. ℥ij
Aqua destill. q. s. ut f. pasta mollis.
D. in vitro sub sigillo.

S. Mittelst eines Charpiepinsels 1 Linie dick auf die Geschwürsfläche (wenn sie nicht zu gross ist) aufzutragen; Krusten müssen vorher abgeweicht werden. Nach 8—10 Tagen fällt die Paste, wie das vorhergehende Pulver, von selbst ab, und wenn es nöthig ist, erneuert man den Verband. Gewöhnlich reichen 5—6, oft schon 2—3 Applikationen zur Heilung hin.

Anwend. Gegen Krebsgeschwüre.

Dupuytren.

642. a. *Ry.* Cinnabar. fact. $\text{℥}\beta$
Ciner. solear. vetust. gr. iij
Sanguin. dracon. gr. iv
Arsenici albi gr. x.
M. f. pulv. subtiliss.
S. Pulvis arsenicalis.

642. b. R_y. Balsam. indic. nigr.
 Extr. conii macul. āā 3j
 Plumb. acet. ʒj
 Tinct. opii crocat. ʒß
 Ungt. cerei 3j.
 M. f. ungt.

S. Unguentum narcotico - balsamicum.

Von Pulv. arsenic. a. werden gr. ij mit 3j des Unguent. narcot.-bals. b. gemischt, Charpie damit bestrichen und das Geschwür bis 2 Linien über seinen Rand hinaus bedeckt.

Anwend. Gegen Krebsgeschwüre, besonders des Gesichtes.

Hellmund,

643. R_y. Arsenici albi
 Sulphur. depur. āā 3j
 Ungt. cerat. 3j.
 M. f. ungt. D. sub sigillo.

S. *Messerrücken dick auf Charpie zu streichen.*

Anwend. Als Zerstörungsmittel.

Astley Cooper.

644. R_y. Arsenici albi 3j
 Calc. viv. ʒij
 Adipis suilli 3vj.
 M. f. ungt.

S. *Messerrücken dick auf Charpie zu streichen.*

Anwend. Als Zerstörungsmittel.

Werneck.

645. R_y. Cerae flavae gr. XLV
 Butyr. rec. insuls. 3ß.
 Liquefactis et fere refrigeratis adde
 Arsenici albi subt. pulv. gr. iij—v
 Opii pulv. gr. vj—x

antea c. aquae destill. paux. in pulvem trita
Zinci oxydat. 3ß.

M. exacte.

D. S. Gleichmässig auf Leder zu streichen, das Geschwür damit zu bedecken und 24 Stunden liegen zu lassen. Diess wiederholt man aller 4—5 Tage und verbindet in der Zwischenzeit mit Wachs-, Terpenthin- oder Elemisalbe.

Anwend. Gegen schmerzhaftes und nässende Geschwüre im Gesicht, besonders an den Lippen.

Harless.

646. *Ry.* Arsenici albi gr. ij—iv
Hydrargyr. muriat. mit. gr. L
Adipis suilli 3ij.

M. f. ungt.

S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen Lupus-Ulcerationen, bis sich auf denselben ein schmutzig weisser, zäher Aetzschorf gebildet hat, worauf der Verband mit Wachssalbe bis zur Heilung gemacht wird.

Blasius.

647. *Ry.* Cinnabar. 3j
Spong. marin. ust. gr. XLV
Arsenici albi gr. xv
Butyr. rec. insuls. 3x.

M. f. ungt.

S. Zum äusserlichen Gebrauch.

Anwend. Bei bösarligen, fressenden, venerischen und andern Geschwüren, Hautkrankheiten und besonders beim Krebs.

Jahn.

B. Arsenicum sulphuratum flavum.
Gelber Schwefelarsenik.

(*Auripigmentum, Sulphuretum Arsenici flavum;
Operment, Rauschgelb.*)

Form u. Gabe. Innerlich nicht zu empfehlen.
Aeusserlich als Aetzmittel.

648. Rx. Arsenici sulphur. pulv. ℥ij
Cupri acetic.
Myrrhae pulv.
Aloes pulv. āā gr. XLviij
Aquae rosar.
„ plantagin. āā ℥iij
Vini albi gall. ℥j.
Tritur. per long. tempus in mort. vitr.

S. Mittelst eines Charpiepinsels aufzutragen.

Collyrium Lanfrancii.

Anwend. Zum Betupfen venerischer Geschwüre, Wucherungen der Schleimhäute u. s. w.

Lanfranc.

649. Rx. Auripigment. ℥β
Calcis vivae ℥β
Amyli ℥v
Aquae fervid. q. s.
ut f. pasta mollis.

S. Zum Wegätzen der Haare.

Rusma der Türken.

Anwend. Man schneidet die Haare kurz ab, salbt den Theil damit ein, an welchem die Haare ausfallen sollen und wäscht ihn nachher mit Wasser ab, sobald die Masse trocken geworden ist. Die Austragung wiederholt man 2 — 3 mal.

650. *Ry.* Pulv. arsenici sulphur. flav. ʒj—jß
 „ calcis vivae ʒj
 Albumin. ovor.
 Lixiviae āā q. s.
 ut f. pasta.

S. Wie das vorhergehende.

Anwend. In gleichen Fällen.

Baudeloque.

C. Arsenicum iodatum. Jodarsenik.

(*Ioduretum Arsenici; Arsenikjodüre.*)

Form u. Gabe. Selten innerlich, in Pillen, zu gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$, 2mal täglich, von Thomson mit Extr. conii macul. gegen Skirrhus der Brust mit Erfolg angewendet. Aeusserlich als Salbe.

651. *Ry.* Arsenici iodati gr. iij
 Axungiae ʒj.
 M. exacte. F. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen fressende und tuberculöse Flechten.

Biett.

Artemisiae vulgaris radix.

Beifusswurzel.

Form u. Gabe. In Pulver, seltener in Aufguss und Abkochung, zu ʒj—ʒij, ein- selten zweimal täglich. Spirituös. Extrakt in Emulsion und Pillen, zu gr. v — xv, viermal täglich.

652. *Rx.* Pulv. rad. artemis. vulg. ex fibrillis par. $\text{ʒ}\beta$ — $\text{ʒ}\text{ij}$
 Sacchari albi $\text{ʒ}\text{j}$.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. iij.

S. Eine Dosis, wenn es möglich ist, $\frac{1}{2}$ Stunde vor dem Paroxysmus, sonst nach demselben, mit etwas erwärmtem, schwachem Biere einzunehmen. Der Kranke muss im Bett den Schweiss abwarten und das Pulver einen Tag um den andern oder auch täglich einnehmen und in der Dosis steigen.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Burdach.

653. *Rx.* Pulv. rad. artemis. vulg. $\text{ʒ}\beta$
 Sacchari albi $\text{ʒ}\text{j}$.

M. D. S. Täglich 4mal 1 Theelöffel.

Anwend. Bei Epilepsie.

Bressler.

654. *Rx.* Rad. artemis. vulg. pulv. $\text{ʒ}\text{j}$.

S. Einen Abend um den andern 1 Theelöffel voll in Warmbier.

Anwend. Gegen Veitstanz eines 10jährigen Kindes.

Fritsch.

655. *Rx.* Artemis. vulg. $\text{ʒ}\text{j}$
 Conc. coqu. c. aquae font. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor. ad col. $\text{ʒ}\text{j}$.

S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ Tasse.

Anwend. Gegen Epilepsie.

v. Hildenbrand.

656. *Ry.* Artemis. rad. conc. $\bar{3}\beta$.

D. S. Einen Theelöffel voll mit einigen Tassen kochenden Wassers aufgegossen und als Thee getrunken.

Anwend. Bei hysterischen Krämpfen.

Heun.

657. *Ry.* Extr. spirit. artemis. vulg. gr. iv

Gumm. mimos. $\bar{3}j$

Sacchari albi $\bar{3}iij$

Emuls. amygdal. $\bar{3}iij$.

M. S. Alle halbe Stunden 1—2 Kaffeelöffel.

Anwend. Gegen Eklampsie der Kinder.

Kölreuter.

Asa foetida. Stinkender Asant.

(*Gummi-resina Ferulae Asae foetidae L.*;
Stinkasand, Teufelsdreck.)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Emulsionen, selten in Auflösungen, zu gr. v—xx—xxx, täglich einmal; äusserlich zum Klystier $\bar{3}\beta$ — $\bar{3}j$, zu Pflastern und Kataplasmen. — Die flüchtige Tinktur zu 10—20 Tropfen, als Riechmittel bei Ohnmachten Hysterischer.

658. *Ry.* Asae foetid. dep. $\bar{3}j$

Galbani dep.

Myrrhae pulv. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$

Castorei „ gr. xv.

M. f. c. tinct. valerian. q. s. pil. Lxxij. Consp.

D. in vitro.

S. 3mal täglich 3—8 Stück.

Pilulae antihystericae Sydenhami.

Anwend. Bei Hysterie.

Sydenham.

659. *Ry.* Asae foetid. ℥iij
 Extr. lactucae viros. ℥ijß .
F. pil. lxxx. Consp. lycop.

S. *Aller 2 Stunden 2—3 Stück.*

Anwend. Gegen Keuchhusten für Erwachsene.

Kopp.

660. *Ry.* Asae foetid. ℥jß
 Mucilag. gumm. mimos. q. s.
F. pil. xxx. Consp. pulv. irid. flor.

S. *Einzeln in einem Bissen Obstmuss zu geben.*

Anwend. Gegen Keuchhusten bei Kindern. Sechs Stück täglich thaten schon gute Wirkung.

Kopp

661. *Ry.* Asae foetid. ℥ß
 Rad. ipecacuanh. pulv.
 Opii pur. pulv. āā gr. iv
 Olei menthae pip. gutt. viij.
M. f. c. spirit. vini pau. pil. cxx. Consp. cinnam.
D. in vitro.

S. *3mal täglich 10 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen krampfartige Harnbeschwerden nach Tripper.

Conradi.

662. *Ry.* Asae foetid. dep.
 Fellis taur. inspiss. āā ℥ij
 Pulv. rad. rhei ℥ß .

M. f. pil. gr. ij. Consp. pulv. croci.

D. S. *3mal täglich 10—12 Stück.*

Anwend. Gegen Hypochondrie.

Richter.

663. *Ry.* Asae foetid. dep. ʒiij
 Ferri pulverat.
 Castorei pulv. āā ʒij
 Extr. lign. quassiae q. s.
 ut f. pil. cl. - Consp. pulv. vanill. D. in vitro.
S. Zweistündlich 3—4 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen Magenkrampf.

Heim.

664. *Ry.* Asae foetid. pulv.
 Fell. taur. inspiss. āā ʒij
 Rad. jalap. pulv. ʒj.
 M. f. c. spirit. vini q. s. pil. gr. j. Consp.
D. S. Anfangs täglich 2—3mal 10, später mehr
 Pillen auf einmal zu nehmen.
Anwend. Gegen Bandwurm.

Mellin.

Gegen hartnäckige Infarkten.

Radius.

665. *Ry.* Asae foetid. ʒij
 Ammon. carb. pyro-oleos.
 Castorei āā ʒß
 Opii gr. vj.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.
S. Täglich 2—3mal 10 Stück.
Anwend. In krampfhaften Beschwerden, Hysterie, Hypochondrie.

Rosenstein,

666. *Ry.* Asae foetid. ʒij
 Aloes soccotr.
 Ferri sulphuric.
 Zingiberis āā ʒj

Elixir. proprietat. s. q.
F. pil. gr. iv. Consp. lycop.

D. S. Jeden Abend 4—5 Stück.

Anwend. Gegen Hysterie und Hypochondrie.

Barthez.

667. *Rx.* Asae foetid. 3ß—3jß
Mucil. gumm. arab. 3ij
Syrup. althaeae 3j.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Im Keuchhusten für Kinder von anderthalb bis sechs Jahren im zweiten krampfhaften Zeitraume.

Kopp.

668. *Rx.* Asae foetid. dep.
Gumm. ammoniac. āā 3j.
Subige cum vitell. ovor. ij, admisce
Aquae sambuc. 3iv.

D. S. Umgeschüttelt, 2 stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Asthma humidum.

Brunner.

669. *Rx.* Asae foetid. dep. 3ij.
Solve in
Liqu. ammon. acet. 3j.
Adde
Aquae menthae crisp. 3iij
Syrup. croci 3ß.

M. D. S. 1—2 stündlich 1 Thee- bis 1 Esslöffel.

*Anwend. Gegen Asthma Millari. Zur Unterstützung Asand-
klystiere.*

Millar.

670. *Rx.* Asae foetid. $\text{℥}\beta$
Liqu. ammon. acetic. $\text{℥}j$.

S. S. Täglich 4mal 40—50 Tropfen.

Anwend. Bei hysterischen Leiden des Gebietes des Nervus vagus mit Krampfhusten, Stimmlosigkeit, Heiserkeit, Schlundkrampf u. s. w.

Clarus.

671. *Rx.* Asae foetid. $\text{℥}\beta$
Moschi gen. gr. viij
Mucilag. gumm. mimos. $\text{℥}\beta$.
Conter. exactiss., adde
Aquae destill. $\text{℥}ij\beta$
Sacchari albi $\text{℥}ij$.

M. S. Alle Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Millar'sches Asthma,

Wendt.

672. *Rx.* Asae foetid. $\text{℥}ij$.
Tere cum
Decoct. capit. papav. $\text{℥}j$.

Colat. S. Klystier.

Anwend. Bei krampfhaften, besonders hysterischen Beschwerden.

Radius.

673. *Rx.* Asae foetid. $\text{℥}iij$.
Tere cum
Lactis vaccini $\text{℥}v$.
Cola per lint.

S. Klystier.

Anwend. Gegen Askariden.

Budolphi.

674. *Ry.* Asae foetid. gr. vj—viij
 Infus. fl. chamomill. $\bar{3}j$.
 Gummi mimos. q. s.
 ad subact.

S. Zum Klystier.

Oder:

675. *Ry.* Asae foetid. 3β
 Infus. rad. valerian. ($3ij$ — $iiij$) $\bar{3}iv$
 Gumm. mimos. q. s.
 ad subact.

S. Zu zwei Klystieren.

Anwend. Gegen Keuchhusten, Millar'sches Asthma, krampf-
 hafte Zustände überhaupt, wobei zugleich der Kreislauf des
 Blutes verzögert ist. No. 674 für Kinder unter 3 Jahren,
 No. 675 für Kinder von und über 3 Jahre.

Tourtual.

76. *Ry.* Decoct. rad. taraxac.
 „ furfur. tritic. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}iv$
 Asae foetid. in vitell. ovar. solut. $3j$ — ij
 Olei ricini cochlearia aliquot parva.
 M. f. enema.

S. Klystier.

Anwend. In symptomatischer Darmentzündung von Versto-
 pfung durch angehäuften Koth u. s. w.

Berends.

677. *Ry.* Galbani $\bar{3}j$
 Asae foetid. $\bar{3}j\beta$
 Myrrhae $3vj$
 Rad. valerian.
 „ zedoariae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
 Rad. angelicae $\bar{3}\beta$
 Herbae menthae pip. $\bar{3}j\beta$

Herbae serpylli
 Flor. chamomill. roman.
 Semin. cumini
 Castorei canadens. āā ̄j.
 Conc. Cont. bene mixt. affunde
 Spirit. vini rectificatiss. ̄xviij.
 Maceratis in vase clauso per ¼ hor. adde
 Aquae font. q. s.
 ut inde destill. ̄iij.

Aqua foetida s. antihysterica Pragensis.

678. R_y. Aquae foetid. prag ̄iij
 Elixir. proprietat. Paracels. ̄iv
 Aquae chamomill. ̄iv.

M. D. S. *Früh und Abends umgeschüttelt einen
 Esslöffel.*

Anwend. Bei Hysterie mit Dysmenorrhöe.

Heim.

679. R_y. Tinct. asae foetid. ̄vj
 Petrolei depur. ̄β.

M. D. S. *Täglich zu 40 Tropfen 2 Tage lang,
 den dritten Tag 3 stündlich 1 Theelöffel.*

Anwend. Gegen Bandwurm.

Schwartz.

680. R_y. Tinct. asae foetid. ̄iij.

S. *Täglich 2—3mal 16—25 Tropfen.*

Anwend. Gegen beschwerliches Zahren mit Krämpfen.

Merlitsch.

681. *Rx.* Tinct. asae foetid. ℥iij
 Olei galbani gutt. x
 „ valerian. ℥j.

M. D. S. 15—30 Tropfen mit Schleim.

Anwend. Bei krampfhaften Zufällen Hysterischer.

Lockstädt.

682. *Rx.* Gummi ammoniac. dep. pulv. ℥iij
 „ asae foetid. dep. pulv. ℥j
 Sapon. venet. pulv. ℥β.
M. et leni igne emoll. intere
 Spirit. vin. rectific. paux.
F. l. a. massa empl.

Emplastrum foetidum s. resolvens Schmuckeri.

Anwend. Bei skrofulösen und gichtischen Anschwellungen, Drüsenverhärtungen, zur Wiederhervorrufung zurückgetretener Fusschweisse u. s. w.

683. *Rx.* Camphorae ℥j
 Asae foetid. ℥jβ
 Vitell. ovi q. s.
 Conterant. exact., adde
 Pulv. cort. peruvian. q. s. ut f. cataplasma.

S. Unmittelbar aufzulegen.

Anwend. Gegen brandigen Decubitus.

Sundelin.

Aselli jecinoris oleum. Berger Leberthran.

*(Von Gadus Morrhua und andern Gadus-
Arten.)*

Form u. Gabe. Rein, in einer aromat. Flüssigkeit, in Emulsion, in Kaffee, zu $\frac{1}{2}$ —3 Esslöffel, einigemal täglich; Kindern Theelöffelweise. Aeusserlich zu Einreibungen, Pinselsäften, Klystieren. (Der lichtbraune Thran ist den übrigen Sorten vorzuziehen.)

Um den schlechten Geschmack, den der Thran hinterlässt, zu verbessern, nimmt man entweder ein Pfeffermünzplätzchen, eine gebrannte Kaffeebohne, überzuckerten Kalmus u. s. w. nach, oder man spült sich den Mund mit Wasser aus und isst einen Bissen Semmel, Zwieback, oder trinkt einen Schluck Wein, Liqueur u. s. w.

684. Ry. Olei jecinor. asell. $\mathfrak{z}$ iv.

S. Morgens und Abends einen Esslöffel voll zu nehmen und nach und nach mit der Dosis zu steigen.

Anwend. Gegen Lungentuberkeln.

Haeser.

685. Ry. Olei jecinor. aselli $\mathfrak{z}$ ij

Vitell. ovi j

Syrup. menth.

„ aurant. $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{z}$ ij.

M. S. Täglich 3mal einen Kinderlöffel voll.

Anwend. Gegen Skrofeln, Rhachitis, Atrophie.

Tourtual.

686. *Ry.* Olei jecinor. aselli $\bar{3}j$
 Liqu. kali carbon. $\bar{3}ij$
 Olei calam. arom. aeth. gutt. ijj
 Syrup. cort. aurant. $\bar{3}j$

M. S. Früh und Abends 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Rhachitis.

Fehr.

687. *Ry.* Olei jecinor. aselli
 Syrup. cort. aurant.
 Aquae anisi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Olei calam. arom. gutt. ijj .

M. S. Täglich 3mal einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen gichtische Anschwellungen, Rhachitis u. s. w.

Rösch.

688. *Ry.* Olei jecinor. aselli
 Vini hungar. v. malacens. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}iv$
 Gumm. mimos. $\bar{3}j$.

M. f. l. a. Emulsio, cui admisce

Syrup. cort. aurant. $\bar{3}j$

Elaeosacch. menth. pip. $\bar{3}ij$.

M. S. Wohlumgeschüttelt täglich 2—3mal 2 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen veraltete, gichtisch-rheumatische Affektionen, Skrofeln, Rhachitis und bei grossem Widerwillen gegen den reinen Thran.

Brefeld

689. *Ry.* Olei jecinor. aselli $\bar{3}iv$.

S. Morgens und Abends 1 grossen Theelöffel voll zu geben.

Anwend. Bei Kindern gegen skrofulöse Knochenkrankheiten, namentlich Caries, Rhachitis, Atrophie mit grossem Erfolge angewendet.

(Die Kinder nehmen den Thran sehr bald gern ein.)

Walther.

690. *Ry.* Olei jecinor. aselli $\bar{3}\beta$
 Aceti plumb. $\bar{3}ij$
 Vitell. ovi l. adipis suill. $\bar{3}iiij.$
 M. f. unguentum.

S. Zum Verbinden.

Anwend. Gegen Fisteln, Geschwüre, besonders skrofulöser Art.

Brefeld.

691. *Ry.* Olei jecinor. aselli $\bar{3}\beta$

S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen Hornhautverdunkelung.

Walther.

Asparagi. Spargelsprossen.

(*Asparagus officinalis L.*)

Form u. Gabe. Ausgepresster Saft, Abkochung,
 zu $\bar{3}j$ — $iiij$, täglich 1—2mal.

692. *Ry.* Radic. asparagi $\bar{3}j$
 Aquae commun. $\bar{8}j.$
 Coque et colat. adde
 Kali acetic. gr. viij.

M. S. Gläserweise zu nehmen.

Anwend. Als Getränk bei Wassersucht.

Edwards & Vavas seur.

693. R_x. Succ. filtr. asparagi ℥viij
 Sacchar. alb. ℥xv.
 M. f. in baln. Mariae. syrupus.

S. 1—2 *Esstöffel* voll 3—4mal täglich.

Anwend. Gegen Herzklopfen und Hypertrophie des Herzens.

Soubéiran.

Aurantium. Pomeranze.

(*Citrus Aurantium L.*)

A. Aurantii flores; Pomeranzenblüthen.

(*Flores Naphae; Orangenblüthen.*)

Form u. Gabe. Im Aufguss ℥ß—ij auf 2 Tassen Wasser, einigemal täglich. — Syrup ℥j—ij, 6—8mal.

Man vermeide Verbindungen mit Eisenoxydsalzen.

694. R_x. Flor. aurantii ℥ij
 Croci ℥iv
 Flor. chamomill. vulg. ℥vj.
 Conc. M. f. spec. D. in vitro.

S. Einen gehäuften *Esstöffel* voll mit 3 Tassen Wassers aufzubrühen.

Anwend. Ein feines Nervinum.

Berends.

B. Aurantii folia; Pomeranzenblätter.

Form u. Gabe. Im Aufguss zu $\bar{3}ij$ — iv auf $\bar{3}iv$, oder 5 — 10 frische Blätter auf 2 Tassen zum täglichen Verbrauch. In Pulver, Lattwerge $\bar{3}j$ — $iiij$, 2 — 3 mal täglich.

Die frischen Blätter sind den getrockneten zum Aufguss vorzuziehen.

695. Ry. Folior. virid. aurant.
Rad. caryophyllat.
„ valerian.
Summitat. millefol. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

Conc. M. S. Einen bis drei Esslöffel voll mit $\bar{6}j$ Regen- oder destillirten Wassers zu übergiessen, die Nacht über stehen zu lassen, früh durchzuseihen und den Tag über auf dreimal zu verbrauchen.

Anwend. Gegen chronische Nervenkrankheiten.

Hufeland.

696. Ry. Rad. valerian. min. $\bar{3}\beta$
Fol. aurantii $\bar{3}j$
Herb. melissae $\bar{3}ij$.
Conc. M. f. species.

D. S. Morgens und Abends 1 — 2 Esslöffel zum Aufguss.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Phöbus.

697. Ry. Fol. aurant. virid. $\bar{3}vj$
Rad. valerian. $\bar{3}ij$.
Infunde cum

Aquae fervid. q. s. Colat. ℥vj adde
Syrup. aurant. ℥j .

M. S. Hiervon so viel zu nehmen als möglich ist.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Locher.

698. *Ry.* Fol. aurant.
Rad. rhei āā ℥j
„ valerian.
Tart. depur. āā ℥iiij .
M. f. pulvis.

S. Täglich 2mal $\frac{1}{2}$ Theelöffel.

Anwend. Gegen Veitstanz, Epilepsie und ähnliche Krampf-
formen chronischer Art.

Choulant.

699. *Ry.* Pulv. fol. aurant.
„ rad. valerian. āā ℥β
Syrup. cort. aurant. q. s. ut f. electuar. molle.
S. Theelöffelweise 3–4mal täglich.

Anwend. Gegen Epilepsie und andere chronische Nerven-
krankheiten.

Schubarth.

700. *Ry.* Fol. aurantii ℥jβ .
Inf. c. aquae ferv. ℥ij
Dig. per diem. Colat. adde
Rad. salep pulv. ℥ij .
Coqu. ad consist. gelatinae spissioris.
Admisce
Vini rhenani opt.
Syrup. fl. aurant. āā ℥j .

M. S. Theelöffelweise

Anwend. Gegen grosse Nervenschwäche und Abzehrung.

Sundelin.

C. *Aurantii fructus immaturi*; unreife
Pomeranzen.

Form u. Gabe. In *Pulver* (selten), *Lattwerge*, zu $\mathfrak{ij} - \mathfrak{ij}$, 1–2mal täglich; im weinigen *Aufguss*, $\mathfrak{3}\beta - \mathfrak{j}$ auf 1 *Flasche* weissen *Wein*, *Gläserweise*; *Conditum aurant. immat.*, $\mathfrak{3}\beta - \mathfrak{j}$ täglich.; *Tinctura aurantiorum immatur.* $\mathfrak{3}\beta - \mathfrak{j}$, einigemal täglich; *Tinctura amara* auf gleiche Weise. Aeusserlich die kleinsten unreifen Pomeranzen zur Beförderung der Eiterung der Fontanelle.

D. *Aurantiorum corticum flavedo*;
das Gelbe der Pomeranzenschalen.

Form u. Gabe. In *Pulver*, *Bissen*, *Lattwerge*, *Morsellen*, *Aufguss*, $\mathfrak{3}\beta - \mathfrak{3ij}$ und mehr; *Conditum cort. aurant.* zu $\mathfrak{3}\beta - \mathfrak{j}$ täglich. *Extrakt* in *Pillen*, *Mixturen*, zu gr. v—xv, 3–4mal täglich; *Tinktur* zu 30–60 *Tropfen* einigemal; *Syrup* zu $\mathfrak{3}\beta - \mathfrak{j}$.

Man vermeide Verbindungen mit empfindlichen Metallsalzen, wie *Sublimat*, *salpeters. Silber*, *salzs. Eisenoxyd*.

701. *Ry.* *Flaved. cort. aurant.* $\mathfrak{3j}$
Herb. menth. pip.
Flor. chamomill. vulg. $\mathfrak{aa} \mathfrak{3}\beta$.
Conc. M. f. species.

D. S. *Thee* auf 4 Tage.

Anwend. Bei Schwäche des Magens und Darmkanals.

Phöbus.

702. *Ry.* Flaved. cort. aurant.
 Rad. rhei
 Kali tartarici $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}$ j—ij.
 M. f. pulvis.

S. Täglich 1—2 Theelöffel.

Solamen hypochondriacorum Kleinii.

Anwend. Gegen Verdauungsschwäche, Verschleimung, Hypochondrie.

Klein.

703. *Ry.* Flaved. cort. aurant. $\mathfrak{z}$ ij
 Rad. rhei
 Conchar. praep. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}$ j
 Rad. calami aromat.
 Elaeosacch. carvi $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}$ ij.
 M. f. pulvis.

S. Eine Stunde vor der Mahlzeit einen Theelöffel.

Anwend. Gegen Apepsie mit Aufblähung und Säure im Magen.

Vogt.

704. *Ry.* Cort. aurant. curassav. $\mathfrak{z}$ j
 Kali carbon. e tart. $\mathfrak{z}$ ij
 Vini malacens. $\mathfrak{z}$ vj
 Tinct. aurant. $\mathfrak{z}\beta$.
 Stent per trid. in digest. leni. Colat. adde
 Extr. gentianae
 „ centaur. min.
 „ cardui benedict. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}$ ij.
 Digerantur denuo et filtrentur.

S. Man giebt dieses Elixir rein oder in Mischung zu 30—80 Tropfen einigemal täglich.

Elixir viscerale s. temperatum s. balsamicum Hoffmanni.

Pharm. Sax.

Das zusammengesetzte Pomeranzenelixir, Elixir aurantiorum compos. Ph. Bor., welches das Hoffmann'sche Magenelixir ersetzen soll, ist zusammenziehender und mehr flüchtig-reizend. Seine Bestandtheile sind folgende:

705. *Ry.* Cort. aurant. curassav. $\bar{3}j$
 Fructuum immatur. aurant.
 Cassiae cinnamom. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Kali carbon. e tart. $\bar{3}ij$.
 Conc. cont. affunde
 Vini malacens. $\mathcal{Q}j$.
 Mixta stent in digest. leni per trid., dein cola c.
 forti express.; in colat. solve
 Extr. absinthii
 „ cascarillae
 „ gentianae rubr.
 „ trifolii fibrin. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$.
 Solutioni admisce
 Olei citri gr. xv
 antea solut. in
 Spirit. sulphurico - aether. $\bar{3}\beta$.
 M. Serv. in vitro bene clauso.

S. Hiervon giebt man 25—70 Tropfen 2—4mal, rein oder auf Zucker, nicht gern in Mixturen.

Elixir viscerale Pharm. Boruss. s. Elix. aurantiorum compositum.

706. *Ry.* Elix. visceral. Hoffm. $\bar{3}vj$
 Tinct. rhei aquos. $\bar{3}ij$.

M. S. Täglich 2mal 60—80 Tropfen.

Anwend. Gegen das Ende gastrischer Zustände, wo die Zunge noch nicht ganz rein werden will, der Appetit und Oeffnung mangelt, aber doch mit auflösenden und erschlaffenden Mitteln nicht fortgeföhren werden darf.

Radius.

707. *Ry.* Tinct. cort. aurant. 3ij
 „ castorei
 „ aloes āā 3j.

M. S. Täglich 2mal 60 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Gegen hysterische Migräne, die mit Erbrechen begleitet ist.

Hufeland.

708. *Ry.* Extr. absinth. 3j
 Aquae menth. pip. 3iij
 Tinct. cort. aurant. 3ß.

S. S. Täglich 2mal 1 Esslöffel.

Anwend. Als Stomachicum.

Aurum. Gold.

A. Aurum chloratum; Chlorgold.

(*Aurum muriaticum, Chloretum Auri acidum; salzsaures Gold.*)

Form u. Gabe. In Auflösung, Pulver, zu gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$, 1—2mal; äusserlich als Salbe zu gr. iij—iv auf 3j.

Man giebt das salzs. Gold am zweckmässigsten rein, weil es selbst gegen organische Substanzen sehr empfindlich ist; die Auflösungen müssen vor Licht geschützt werden.

709. *Ry.* Auri chlorati gr. j.
 Solve in

Aquae destill. $\mathfrak{z}\text{j}$.
D. ad vitrum charta nigra obductum.

S. *Täglich 4mal 10 Tropfen Anfangs, nach und nach 15 — 25; dabei einen Thee von Wachholderbeeren, Hauhechel oder Liebstöckelwurzel.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Fielitz.

710. Rx. Auri chlorati gr. j
Lycopod. praep. gr. xv.
M. f. pulv. Div. in xvj part. aequal.

S. *Täglich 1 Pulver in die Zunge und das Zahnfleisch einzureiben.*

Anwend. Gegen Syphilis.
Nach und nach lässt man dieselbe Menge nur in 12 oder 10 Theile bringen.

Chrestien.

711. Rx. Auri chlorati gr. j
Aquae destill. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.
S. D. in vitro charta nigra obducto.

S. *Augenwasser, theils einzutropfen, theils damit befeuchtete Kompressen aufzulegen.*

Anwend. Gegen chronische Augenentzündungen, Blepharitis scrofulosa und Hornhauttrübungen nach vorausgegangener gonorrhöischer Entzündung.

Jahn. Schön.

B. Aurum chlorato-natronatum;
Chlorgoldnatrium.

(*Aurum muriaticum natronatum, Chloretum
Auri cum Chloreto Natrii, Murias aurico-na-
tricus; natrumhaltiges salzsaures Gold, salz-
saures Goldoxyd - Natron.*)

Form u. Gabe. Wie das vorige.

712. R_y. Auri chlorato-natron. gr. ij
Aquae destill. ʒj.

Sol. S. Aller 2 Stunden 10 Tropfen.

Anwend. Gegen Wassersucht und überhaupt in solchen Fäl-
len, wo das reproduktive System sehr darnieder liegt. Bei
Herpes exedens, Amaurose und Incontinentia urinae.

Grötzner.

713. R_y. Auri chlorato-natron. gr. v
Sacch. alb. pulv. ʒj.
M. exacte in mort. vitr. F. c. s. q. mucil. gumm.
tragac. past. xL.

Jede Pastille enthält gr. $\frac{1}{12}$ Chlorgoldnatrium.

Chrestiens Goldpastillen.

Anwend. Gegen Elephantiasis der Griechen. Lepra tubercu-
losa, L. alba.

Chrestien.

714. *Ry.* Auri muriat. natron gr. j.
Solve in
Aquae destill. $\bar{3}$ j.
D. in vitro nigro.

S. Dreimal 6—10 Tropfen in Wasser, nach und nach bis zu 18 Tropfen.

Anwend. Gegen secundäre Syphilis.

Richter. Lehmann.

715. *Ry.* Amyli solani tuberos. gr. iv
Gumm. mimos. $\bar{3}$ j.
In mort. vitr. exacte mixtis, adde terendo
Auri chlorato - natron. in aqua destill. $\bar{3}$ j solut.
gr. x.
F. pil. No. cxx. Consp. lycop.

S. Jede Pille enthält gr. $\frac{1}{12}$ Gold.

Chrestiens Goldpillen.

Anwend. In gleichen Fällen wie die Pastillen.

Chrestien. Alibert.

716. *Ry.* Auri muriat. natron. gr. iij—vj.
Solve in
Spirit. vini rect. q. s.
Adde
Extr. conii macul. $\bar{3}$ jß—ij
Pulv. rad. althaeae q. s.
ut f. pil. No. Lxxij. Consp. pulv. rad. althaeae.

D. S. Aller 2 Stunden 10 Stück.

Anwend. Gegen veraltete Syphilis.

Kopp.

717. *Rx.* Auri muriat. natron. gr. j
 Sacch. alb. ʒij .
 M. f. pulv. Divid. in part. aequal. xij.
D. S. Täglich 2mal ein Pulver.

Anwend. Bei Krebsgeschwüren.

Rust.

718. *Rx.* Auri chlorato-natron. Ph. Austr. gr. j—xxiv
 Sacch. lactis gr. xvj.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.
S. Täglich 2mal 1 Pulver in die Zunge oder Lippen einzureiben.

Anwend. Gegen syphilitische Kachexie.

Werneck.

719. *Rx.* Auri chlorato-natron. gr. iij—iv
 Axung. porci ʒß .
 M. exacte, f. unguentum.
S. Salbe.

Anwend. Bei Verhärtungen, Exostosen, Skirrhus, besonders syphilitischen Ursprunges.

Grötzner.

Nach L. W. Sachs gr. xv—xx auf ʒß .

720. *Rx.* Auri chlorato-natron. Ph. Hass. gr. ijß
 Axung. porci ʒjß .
 M. f. unguentum.
S. Abends einer Bohne gross in die Nasenlöcher zu bringen.

Anwend. Gegen skrofulöse Anschwellung der Nase.

Dabei gr. $\frac{1}{12}$ in den Gaumen oder die geschwollenen Lippen einzureiben.

Kopp.

721. *Ry.* Auri muriat. natron. gr. ij—iij
 Ungt. rosati $\bar{3}$ j.
 M. exact. f. unguentum.

D. S. Mehrmals täglich damit zu bestreichen.

Anwend. Gegen kranke Produktionen, Aferorganisationen, Skirrhusitäten und torpide Geschwüre.

Wendt.

C. Aurum cyanogenatum; Blaustoffgold.

(*Aurum hydrocyanicum, Cyanuretum Auri; blausaures Gold, Cyangold.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Plätzchen, Lösung, Syrup, zu gr. $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{6}$, 1—2mal. Salbe.

722. *Ry.* Auri cyanogenati gr. j
 Sem. lycopod. gr. xv.
 M. f. pulv. Div. in part. aequal. xvj.

S. Täglich ein Pulver in die Zunge und das Zahnfleisch einzureiben.

Anwend. Gegen knotige Schwindsucht, skrofulöse Verhärtungen, Geschwülste und Geschwüre, in Verbindung mit Seidelbast.

Chrestien.

723. *Ry.* Auri cyanogenati gr. j
 Extr. daphn. thymel. gr. ij.
 Pulv. rad. althaeae s. q.
 M. exactiss. f. l. a. pil. No. xij—xvj.

D. S. Täglich beim Mittagessen 1 Pille in dem ersten Löffel Suppe zu nehmen u. aller 8 Tage mit einer Pille zu steigen, bis man 10—12 giebt.

Anwend. In gleichen Fällen.

Chrestien.

724. *Ry.* Auri cyanogenati gr. iij
Aquae destill. ℥viiij.

S. S. Früh und Abends 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Drüsengeschwülste, aber auch zur Beförderung der Menstruation.

Carron du Villards. Furnari.

D. Aurum oxydatum; Goldoxyd.

Form, Gabe u. Anwendung. Wie bei den vorigen Goldpräparaten.

E. Aurum purum divisum; reines fein zertheiltes Gold.

(Aurum metallicum divisum.)

Form u. Gabe. In Pillen und Plätzchen, Pulver zu Einreibung in die Zunge, zu gr. $\frac{1}{4}$ —iv. Aeusserlich als Salbe zu gr. x—Lx auf ℥j.

F. Aurum stannatum; Goldpurpur.

Form u. Gabe. Wie bei den vorigen Goldpräparaten.

Avena. Hafer.

(Avena sativa L.)

A. Avena excorticata; Hafergrütze.

Form u. Gabe. In Abkochung, zu ℥ij—℥β auf ℥j, als Getränk, Gurgelwasser, Klystier und Umschlag.

725. *Ry.* Avenae excortic. $\mathfrak{Z}\text{ij}\beta$.
Coque ex aquae font. $\mathfrak{L}\text{iiij}\beta$ ad colat. $\mathfrak{L}\text{iiij}$.
Adde

Nitr. depur. $\mathfrak{Z}\text{iiij}$

Sacchari albi $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

M. S. Zum Getränk.

Anwend. In hypersthenischen Fiebern.

Berends.

726. *Ry.* Avenae excortic. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.
Coque c. aquae communis q. s. Colat. $\mathfrak{Z}\text{viiij}$ adde
Mellis rosati $\mathfrak{Z}\text{ij}\beta$
Acidi sulphur. dilut. gutt. xviiij.

M. S. Gurgelwasser.

Montmahou.

727. *Ry.* Avenae excortic. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.
Coque c. aquae font. $\mathfrak{Z}\text{xij}$. Sub finem coct. adde
Flor. chamomill. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.
Colatur. adde
Olei olivar. l. lini $\mathfrak{Z}\beta$ —j
Sal. culinar. $\mathfrak{Z}\text{j}$ —ij.

M. S. Hausklystier.

728. *Ry.* Avenae excort. $\mathfrak{L}\text{j}$.
Coque c. aquae comm. q. s. ad consist. catapl.
moll. Sub finem coct. adde
Flor. chamomill. conc. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

M. S. Auf Leinwand fingerdick aufzustreichen.
Hausumschlag.

B. Farina avenacea; Hafermehl.

729. *Ry.* Farin. avenac. s. q.

Coque c. suff. aquae marinae (l. Solut. salis marini) q. s. ad consist. catapl.

S. Umschlag.*Anwend.* Gegen skrofulöse Geschwülste, weisse Geschwulst
u. s. w.**Hunter.**

B.

Ballotae lanatae herba. Kraut der
wolligen Ballote.

(*Ballota lanata* L.)

Form u. Gabe. Aufguss, leichte Abkochung, zu
3vj—xij täglich.

730. **Ry.** Ballot. lanatae 3x.

Infunde

Aquae ferv. 3vij.

Digere per $\frac{1}{4}$ hor. Coque residuum ex aquae 8j
ad colat. 3vj. Ambab. colaturis mixtis adde
Syrup. althaeae 3j.

S. Täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Fettsucht.

Weisse.

731. **Ry.** Herbae ballot. lanat. pulv. 3ij.

Coque c. aquae font. 8ij ad rem. 8j. Colat.
adde

Tinct. cort. aurant. 3ß

Spirit. nitrico-aether. 3j.

M. D. S. Zweistündlich 1 Tasse.

Rehmann.

Balsamum Copaivae. Copaivabalsam.*(Copaifera officinalis L.)*

Balsamum Copahu.

Form u. Gabe. Rein, in Gallertkapseln, Pillen, Bissen, Emulsion, Paste, Lattwerge, Mixturen, zu 20—60 Tropfen, täglich einigemal. Aeusserlich zu Klystieren, Injektionen und Salben.

Man vermeide Verbindungen mit starken Mineralsäuren, Salzbildern, Basen und Metallsalzen.

732. Ry. Cerae albae ʒij.

Leni igne liquefact. et semirefrigerat. adde agitando

Bals. copaivae ʒij.

F. pil. No. LXXX. Consp. cinnam.

D. S. Täglich 3mal 5—10 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Tripper.

J. F. Simon.

733. Ry. Cerae albae ʒij.

Leni igne liquef. et semirefr. adde agitando

Bals. copaivae ʒij

et tandem

Pulv. cubeborum (rad. rhei) ʒβ.

M. f. pil. No. cxx. Consp. cinnam.

S. Aller 2 Stunden 5—8 Stück.

Anwend. Gegen Tripper.

J. F. Simon.

Nach Simon verbindet sich der Copaivabalsam mit Wachs und Pflanzenpulvern in folgenden Verhältnissen:

Cerae albae	3j,	Bals. copaiv.	3j.	M. f. pil.				
„	„	3j,	„	„	3jß.	Pulv. cubeb.	l. rhei	3ij
„	„	3j,	„	„	3ij.	„	„	3ij
„	„	3j,	„	„	3ijß.	„	„	3ß
„	„	3j,	„	„	3ij.	„	„	3v.

734. *Ry.* Cerae albe 3ij.

Leni igne liquef. misce agit. cum

Bals. copaiv. 3ß.

Refrigeratis statim admisce

Pulv. cubebar. 3j.

F. l. a. pil. gr. ij. Consp. cinnam.

S. Viermal täglich 5—10 Stück zu nehmen.

Pilulae Balsam. copaivae compos. Cod. med.
Hamb.

Anwend. Gegen Tripper und andere chronische Schleimflüsse.

Fricke.

735. *Ry.* Bals. copaivae

Pulv. cubebar. āā 3j

Mucilag. gumm. mimos. q. s.

ut f. pil. gr. iij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 5—10 Stück und mehr zu nehmen.

Anwend. Gegen Tripper.

v. Hildenbrand.

736. *Ry.* Bals. copaivae c. magnes. spissefact. 3j

Pulv. rad. rhei 3ij.

M. f. pil. gr. iv. Consp. cinnam.

S. Täglich 3mal 6—12 Stück.

Anwend. Gegen chronischen Tripper.

Gall.

737. *Ry.* Bals. copaivae ʒxß
 Pulv. rad. althaeae ʒxvj
 „ gumm. tragacanth. gr. xxxij
 Aquae destill. ʒviij.
M. f. pil. No. ccxL. Consp. lycop.
D. S. Viermal täglich 15 Stück zu nehmen.
Anwend. In gleichen Fällen.

Kopp.

738. *Ry.* Bals. copaivae
 Gumm. mimos. pulv. āā ʒij
 Aquae fl. aurant. ʒij.
 Terendo bene mixtis adde
 Cubebar. pulv. ʒij.
M. f. boli vj. Consp. pulv. cass.
D. S. Täglich 3mal 1 Stück.
Anwend. In gleichen Fällen.

Henschel.

739. *Ry.* Bals. copaivae ʒij
 Gumm. arab. pulv. ʒj
 Rad. liquirit. pulv. q. s.
 ut f. boli xx.
D. S. Früh und Abends 10 Stück.
Anwend. Gegen chronischen Tripper.

Hôp. des Vénér.

740. *Ry.* Bals. copaivae ʒivß.
 Subige c.
 Vitello ovi j
 Pulv. cubebar. ʒivß
 Conserv. rosar. ʒß.
M. f. electuar.
D. S. Täglich 3—4mal 1 Theelöffel voll.
Anwend. Gegen veralteten Tripper torpider Subjekte.
 (Schmeckt sehr unangenehm.)

Vogt.

741. *Ry.* Bals. copaivae $\bar{3}ij$
 Gummi mimos. pulv. $\bar{3}j$
 Vini rhenani $\bar{3}ij$.
F. emulsio cui adde
 (Tinct. ferri acet. aeth. $\bar{3}j$)
 Syrup. balsam. peruvian. $\bar{3}j$.

M. D. S. Umgeschüttelt, täglich 3 mal 1 Ess-
 löffel.

Anwend. Gegen chronischen, torpiden Tripper.

Lockstädt.

742. *Ry.* Bals. copaivae
 Pulv. gumm. mimos. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$ — $\bar{3}\beta$
 Aquae cerasor. l. fl. naphae $\bar{3}viiij$.
F. l. a. emulsio.

D. S. Täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Tripper.

Handschuh.

743. *Ry* Bals. copaivae
 Syrup. succ. citri
 Aquae fl. aurant.
 „ menthae crispae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Acid. sulphur. dilut. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt, täglich 4 — 5 mal einen
 Theelöffel voll in Haferschleim zu nehmen und,
 wenn Durchfall eintritt, einige Tropfen Opium-
 tinktur zu jedem Theelöffel.

Wutzer bedient sich derselben Formel mit nur
 halb so viel Schwefelsäure.

Anwend. In chronischen Schleimflüssen der Harnröhre und der
 Scheide.

Delpech.

744. *Ry.* Spirit. nitrico-aeth. $\text{3}\beta$
 Bals. copaivae
 Spirit. vini rectific.
 Syrup. fl. aurant.
 Aquae menthae crisp. $\bar{a}\bar{a}$ $\text{3}\beta$
 „ fl. aurant. 3ij .
M. D. S. Umgeschüttelt, Morgens 2, Mittags u.
 Abends 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen chronischen Tripper.

Chopart.

745. *Ry.* Bals. copaivae 3ij —vj
 Spirit. sal. ammon. anis. $\text{3}\beta$ —ij
 Syrup. foenicul. l. aurant. 3iij .
M. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel.
Anwend. Gegen chronischen Lungenkatarrh.

Kraus.

746. *Ry.* Bals. copaivae 3j
 Mixt. sulphur. acid. $\text{3}\beta$
 Syrup. rubi idaei
 Aquae ceras. nigr. $\bar{a}\bar{a}$ 3ij .
M. D. S. Umgeschüttelt, 4—6 mal täglich einen
 Esslöffel.

Anwend. Beim Tripper nach Verlauf des entzündlichen Stadiums, wenn noch einige Reizbarkeit zurückgeblieben ist. Bei jeder Wiederholung wird die Dosis des Balsams um $\text{3}\beta$ —j vermehrt.

Hacker.

747. *Ry.* Bals. copaivae 3j —ij
 Tinct. gentian. rubr. 3vj
 „ catechu l. kino $\text{3j}\beta$.
S. M. Aller 2 Stunden 1—2 Theelöffel.

Anwend. Gegen Leukorrhoe, Tripper und andere atonische Schleimflüsse.

Kraus.

748. *Ry.* Bals. copaivae
 Olei terebinth. rectific.
 „ succin. rectific. āā 3j.

M. S. Täglich 3 mal 30–60 Tropfen auf Zucker
 und $\frac{1}{2}$ Glas Rothwein nachzutrinken.

Elixirium balsamicum der Franzosen.

Anwend. Gegen Pollutionen, Tripper, Leukorrhöen und andere Schleimflüsse.

Lallemand.

749. *Ry.* Bals. copaivae 3ij
 Mucilag. gumm. mimos. 3ß
 Aquae calcis viv. 3vj.
F. emulsio.

D. S. Umgeschüttelt, täglich mehrmals einzuspritzen.

Anwend. Bei Geschwüren des Mastdarms, der Harnröhre und der Scheide.

Abernethy.

750. *Ry.* Bals. copaivae 3ij
 Mucilag. gumm. arab. 3iij.
Terendo misce cum
 Aquae font. 3vj
 Tinct. opii simpl. ʒj
 Syrup. althaeae 3ij.

M. D. S. Zum Klystier.

Anwend. Gegen torpiden Tripper und weissen Fluss.

Velpeau.

751. *Ry.* Bals. copaivae c. vitell. ovi subact. 3iv
 Camphorae gr. iv

Extr. opii aquos. gr. j

Aquae gummos. ℥iv.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. In akuten und chronischen Blennorrhöen sehr wirksam.

Hôp. de Perfect.

752. *Ry.* Decoct. rad. althaeae ℥iv
Bals. copaivae in ovi j vitell. dilut. ℥ß
Camphorae gr. iij
Extr. opii aquos. gr. j.

M. S. Zum Klystier.

Anwend. Bei chronischer Blennorrhöe der Geschlechtstheile. Jeden Abend 8 Tage lang zu nehmen und so lange als möglich bei sich zu behalten.

Dublanc.

753. *Ry.* Bals. copaivae ℥ij
Unguent. nervin. ℥j.
M. f. unguentum.

S. In die Damm- und Schamgegend einzureiben.

Anwend. Gegen Wassersucht der Kinder.

Wendt.

Resina Copaivae; Copaivharz.

Form u. Gabe. Pillen, Bissen, zu gr. xx—xxx, täglich einigemal. Klystier.

754. *Ry.* Resin. copaivae ℥ij—vj
Vitell. ovi j

Extr. opii aquos. gr. j

Aquae font. $\bar{3}$ vj.

M. f. emulsio.

D. S. *Klystier.*

Anwend. Gegen Tripper, in Fällen wo der Copaivabalsam innerlich nicht gegeben werden kann.

Ricord.

Balsamum peruvianum nigrum.

Schwarzer peruvianischer Balsam.

(*Bals. indicum nigr.*; *Perubalsam. Von Myroxylon peruiferum L.*)

Form u. Gabe. Rein, auf Zucker, in Emulsionen, Bissen, Pillen (nicht gern), Lattwergen, Mixturen, als Lecksaft, zu gr. iij—x, täglich einigemal. Aeusserlich zu Collyrien, Waschungen, Linimenten, Salben, Einreibungen, Pflastern u. s. w.

755. R $\bar{y}$. Bals. peruvian. $\bar{3}$ vj
Olei olivar. provinc. $\bar{3}$ ijj
Vitell. ovor. ij.
Terendo sensim misce cum
Aceti $\bar{3}$ ijj.

M. S. Umgeschüttelt, zweistündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Nachtripper.

Fricke.

756. R $\bar{y}$. Bals. peruvian.
Tinct. cantharid. āā $\bar{3}$ ij.

M. D. S. Umgeschüttelt, täglich 4mal 24 Tropfen in $\frac{1}{2}$ Glase Wein.

Anwend. Gegen äusserst hartnäckige und torpide Nachtripper.

Kopp.

757. *Ry.* Bals. peruvian.
Tinct. catechu
Spirit. nitrico-aether.
Terebinth. venet. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, aller 3 Stunden 40—50 Tropfen und ein Glas Zuckerwasser nachzutrinken.

Anwend. Gegen hartnäckige Uretrorrhöe.

Cline.

758. *Ry.* Bals. indic. nigr. $\overline{3ij}$
Vitell. ovor. $\overline{ij}$.
Dissolve et adde
Extr. chinae $\overline{3vj}$
Mellis rosati $\overline{3ij}$.
M. f. electuarium.

S. Täglich 4mal 2 Theelöffel.

Anwend. Gegen chronische Schleimflüsse.

Werlhof.

759. *Ry.* Bals. peruvian. nigr. $\overline{3j}$
Extr. polygal. amar. $\overline{3ij}$
Pulv. rad. althaeae s. q.
ut f. pil. No. cxx. Consp. lycop.

S. Täglich 4mal 10 Stück.

Anwend. In gleichen Fällen.

Schubarth.

760. *Ry.* Myrrhae $\overline{3ij}$
Bals. peruvian. $\overline{3j\beta}$
Extr. opii $\overline{3\beta}$.

M. f. pil. gr. $\overline{ij}$. Consp. lycop.

D. S. Aller 2 Stunden 2—4 Pillen.

Anwend. Bei Lungenschwindsucht.

Marcus.

761. *Ry.* Aerugin. pulv. gr. v
 Bals. peruvian. $\bar{3}j$
 Ungt. cerei $\bar{3}ij$.
M. f. liniment.

D. S. Auf Baumwolle in den Gehörgang zu bringen.

Anwend. Bei übelriechenden Ausflüssen aus den Ohren.

G. A. Richter.

762. *Ry.* Balsami peruvian. nigr. $\bar{3}j$
 Pulv. gumm. mimos. $\bar{3}ij$
 Olei amygdal. dulc. $\bar{3}j\beta$
 Aquae rosar. $\bar{3}j$.
M. f. liniment.

D. S. Zum äusserlichen Gebrauch.

Anwend. Bei wunden Brustwarzen.

Dannemann.

763. *Ry.* Borac. venet. $\bar{3}j$
 Vitell. et albi ovor. $\bar{3}\beta-vj$
 Olei amygdal. dulc. rec. expr. $\bar{3}j$
 Bals. peruvian. nigr. $\bar{3}j\beta-ij$.
M. f. liniment.

S. Täglich 3—4mal zu brauchen.

Anwend. Gegen wunde Brustwarzen.

Harless.

764. *Ry.* Bals. peruvian. nigri $\bar{3}j$.
 Tere c. vitell. ovi j
 Aquae vulner. Thed. l. Spirit. serpyll. $\bar{3}ij$.

M. S. Wohlumgeschüttelt zum Bestreichen der Brustwarzen, welche hierauf mit folgendem Pulver zu bestreuen sind:

765. Ry. Pulv. cort. peruvian. ℥j
 „ gumm. mimos. ℥ij .
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Zum äusseren Gebrauch.

Anwend. Gegen wunde Brustwarzen.

Jörg.

766. Ry. Bals. peruvian. nigr. ℥β
 Butyr. de cacao ℥ij .
 M. f. unguentum.

D. S. Auf ein feines Leinwandläppchen dünn zu streichen und aufzulegen.

Anwend. Bei wunden Brustwarzen.

Ribke.

767. Ry. Herb. sabinae ℥β
 „ rutae ℥j .
 Inf. aquae ferv. q. s., diger. per. $\frac{1}{2}$ hor. Colat. ℥vj
 adde
 Bals. peruvian. nigr. vitell. ovi j subact. ℥β .

S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei Pseudo-Erysipelas und schlechten Eiterungen aus mangelnder Vitalität der Theile.

Vogt.

768. Ry. Bals. peruvian. nigr.
 Ungt. cetac. āā ℥j .
 M. f. unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen Fussgeschwüre leukophlegmatischer Frauen, und gegen andere schmerzlose Geschwüre.

769. *Ry.* Bals. peruvian. nigr.
Extract. cicutae $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$
Sacchari saturni $\mathfrak{J}iv$
Ungt. cerei $\overline{3}iv$.
M. f. unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen chronische Fussgeschwüre.

Marshall.

770. *Ry.* Bals. peruvian. $\overline{3}j$
Mixt. oleos. bals. $\overline{3}vj$
Aquae coloniensi. $\overline{3}j$.

M. D. S. Zum Waschen.

Anwend. Bei Frostbeulen ersten Grades.

Rust.

771. *Ry.* Medull. ossium bov. $\overline{3}j\beta$
Mixtur. oleos. bals. $\overline{3}vj$.
Bals. peruvian. nigr. $\overline{3}j\beta$.
M. f. unguentum.

D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Rhachitis, in den Rücken, die Brust und Gelenke.

Wendt.

772. *Ry.* Bals. peruvian. nigr. $\overline{3}\beta$.
Solve in
Alcohol. $\overline{3}iv$.

Adde

Acidi hydrochlorici $\overline{3}j$
Tinct. benzoës $\overline{3}\beta$.

M. S. Mehreremale täglich einzureiben.

Anwend. Gegen Frostbeulen.

Hôt. Dieu.

773. Ry. Bals. peruvian. nigr. $\bar{3}j$
 Camphor. trit. $\bar{3}\beta$
 Opii pulv. gr. xv
 Emplastr. litharg. simpl. $\bar{3}\beta$.
 M. f. emplastrum.

D. S. Auf Leder zu streichen.

Anwend Gegen Frostbeulen zweiten Grades.

Rust.

774. Ry. Bals. peruvian. nigr. $\bar{3}j$
 Empl. diachyl. comp. $\bar{3}\beta$,
 M. f. emplastrum.

S. Auf Leder zu streichen.

Anwend. Zur schnelleren Zeitigung der Furunkel und zur
 Beförderung der Abstossung verdorbenen Zellstoffes.

Walther.

775. Ry. Olei aeth. lavendulae
 „ „ majoranae
 „ „ cardamomi
 „ „ macis
 „ „ cinnamomi
 „ „ rutae
 „ „ corticum citri $\bar{a}a$ $\bar{3}\beta$
 „ „ ligni rhodii $\bar{3}j$
 „ „ caryophyllorum $\bar{3}ij$
 Balsami peruviani nigri $\bar{3}\beta$
 Olei nucistae expressi $\bar{3}j\beta$
 Kali carbonici ex tartaro $\bar{3}j$

Spirit. vini rectificatiss. (Alcoh. Richt. 80°) $\bar{8}iv$.
 Mixta digerantur calore lenissimo et sub iterata agi-
 tatione per quatrimum, dein filtrentur per char-
 tam bibulam.

*S. Balsamum vitae Hoffmanni s. Mixtura oleo-
 so-balsamica; Hoffmanns Lebensbalsam,
 balsamische Oelmischung.*

*Form u. Gabe. Rein oder in spirit. Mischungen,
 10—20 Tropfen, mehrmals. Aeusserlich als Riechmittel,
 Waschung, Einreibung.*

776. *Ry* Medullae ossium tauri $\bar{3}j\beta$.

Liquef., depur. refrigerataeque
adde

Mixturae oleoso-balsam. $\bar{3}vj$

Bals. indic. nigr. $\bar{3}j\beta$.

D. S. Den Rücken, die Brust und die Gelenke
damit einzureiben.

Anwend. Gegen Rhachitis.

Wendt.

777. *Ry* Olei nucistae

Ungt. simpl. $\bar{a}a$ $\bar{3}ij$.

Leni igne liquatis et semirefrig.

adde

Tinct. opii simpl. $\bar{2}j$

Bals. vitae Hoffm. $\bar{3}j$.

M. f. unguentum.

S. Auf den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei chronischen Durchfällen, namentlich der Kinder.

Wendt.

Bardanae radix. Klettenwurzel.

(*Arctium Lappa L.*)

Form u. Gabe. In Abkochung $\bar{3}j—ij$ auf $\bar{8}ij$
Wasser täglich. Aeusserlich als Bähung auf skrofulöse
Geschwüre zu $\bar{3}ij—iv$.

778. *Ry* Radic. bardanae $\bar{3}j$.

Coque cum

Aquae fontan. $\bar{8}ij$ ad rem. $\bar{8}j$. Colat. adde

Syrup. althaeae $\bar{3}j$.

M. D. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. Gegen chronische Hautausschläge und bei sekundä-
rer Syphilis.

Schubarth.

Baryta. Schwererde, Baryt.

A. Baryum chloratum; Chlorbaryum.

(Baryta muriatica, Terra ponderosa salita; salzsaure Schwererde.)

Form u. Gabe. In Lösung, weniger zweckmässig in Pulver und Pillen, zu gr. $\frac{1}{8}$ —ij, täglich mehrmals. Äusserlich zu Augewässern gr. ij—v auf $\mathfrak{z}\beta$, zu Einspritzungen und Waschwässern gr. v—xv auf $\mathfrak{z}j$, zu Bädern $\mathfrak{z}j$ —ij, zu Fussbädern $\mathfrak{z}ij$ —iv.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Kohlensäure, Citronensäure, Weinsäure, schwefels., phosphors., salpeters., weinsteins., kohlens., bernsteins. Salzen, Borax, Gerbestoff und gemeinem Wasser.

779. *Rx.* Barytae muriat. $\mathfrak{z}\beta$
Aquae destill. simpl. $\mathfrak{z}j$.

S. S. Täglich 3 mal Kindern bis zum 3. Jahre 5—20, älteren 10—30, Erwachsenen 20—60 Tropfen allmählig steigend zu geben.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Hufeland.

Statt des einf. destill. Wassers empfiehlt H o p f Kirsch-
lorbeerwasser, besonders bei sehr reizbaren, empfindlichen
Subjekten. In stärkerer Gabe wird es äusserlich gegen
skrofulöse Lichtscheu, Hornhautflecken, skrofulöse Geschwüre
und Flechten angewendet.

780. *Rx.* Barytae muriat. $\mathfrak{z}j$.
Solve in

Aquae melissae $\bar{3}$ vij

Vini stibiat. $\bar{3}$ j.

M. S. Täglich 4mal 20—30 Tropfen.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Hufeland.

781. *Ry.* Barytae muriat.

Extr. conii macul. $\bar{a}\bar{a}$ gr. xij.

Solve in

Aquae cinnamom. simpl. $\bar{3}\beta$.

D. S. Umgeschüttelt, 3—4 mal täglich 10—20 Tropfen.

Anwend. Gegen Skrofeln. Für ein Kind von 10 Jahren.

Phöbus.

782. *Ry.* Barytae muriat.

Extr. conii maculat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

Solve in

Aquae destill. $\bar{3}\beta$.

Adde

Vini stibiat. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt, 3 stündlich 15—30 Tropfen.

Anwend. Gegen chronische Hodenanschwellung.

Wylic.

783. *Ry.* Barytae muriat. $\bar{3}\beta$

Ammon. muriat. ferrug. $\bar{3}$ j

Aquae cort. aurant. $\bar{3}$ j.

S. S. Täglich 4mal 20—40 Tropfen.

Anwend. Gegen Skrofeln bei einem höheren Schwäcgrade.

Sulzer.

784. *Ry.* Barytae muriat.
Ferri muriat. $\overline{aa}$ $\text{3}\beta$.

Solve in

Aquae menth. pip. 3j .

Adde

Syrup. cort. aurant. 3j .

M. D. S. Kindern von 2—3 Jahren aller 3 Stunden 8—10, von 4—6 Jahren 12—15, und älteren 20 Tropfen mit Haferschleim zu geben.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Fischer.

785. *Ry.* Barytae muriat. $\text{3}\beta$ —j
Tinct. chinae $\text{3}\beta$ —j.

M. D. S. Umgeschüttelt, 10—15 Tropfen früh und Abends.

Anwend. Gegen skrofulöse Photophobie.

v. Ammon.

786. *Ry.* Barytae muriat. gr. vj.
Solve in

Aquae destill. 3iv .

D. S. Umgeschüttelt, stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen weisse Geschwulst. Nach 8 Tagen steigt man auf gr. xij und nach und nach bis auf 3ij .

Lisfranc.

787. *Ry.* Barytae muriat. $\text{3}\beta$.
Solve in

Aquae destill. q. s.

Adde

Succ. liquirit. dep. $\text{3}\beta$

Pulv. rad. liquirit. q. s. ut f. pil. Lxx.

Consp. liquirit.

D. S. 3—4mal täglich 4—8 Stück.

(Jede Pille enthält gr. $\frac{1}{4}$.)

Phöbus.

B. Baryum iodatum. Jodbaryum.

(*Baryta hydroiodica.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lösung (?), zu gr. $\frac{1}{8}$ — ij — iiij , 2—4mal täglich.

788. **Ry.** Baryi iodat. gr. j — viij
Pulv. cort. cinnam.
Sacchari albi $\overline{\text{aa}}$ iv .
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Täglich 2—3mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen allgemeine Skrofelsucht.

789. **Ry.** Baryi iodat. gr. iv
Axung. porc. $\overline{\text{ij}}$.
M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen skrofulöse Anschwellungen.

Biett.

Belladonna. Tollkirsche.

(*Atropa Belladonna L.*)

A. Belladonnae herba.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen zu gr. i — iv , täglich 1—2mal; im Aufguss zu ij — ij auf $\overline{\text{ij}}$, esslöffelweise. Extrakt zu gr. $\frac{1}{2}$ — ij , in Pulver, Pillen, Lösung. Tinktur zu 20—40 Tropfen, einigemal täglich. Aeusserlich als Rauchmittel und Streupulver selten, zu Kataplasmen, Bähung, Klystier, Einspritzung, Augewasser; das Extrakt zu Einreibungen, Pflastern, Limenten, Augensalben u. s. w.

Man *vermeide* Verbindungen mit Jod, Alkalien, besonders kaustischen fixen, salzsaurem Gold, salpetersaurem Silber und Quecksilber, Sublimat, essigsaurem Blei, Gerbestoff, Thierkohle, Kochhitze.

790. *Rx.* Pulv. herb. belladonn. gr. viij
 Sacchari albi ℥iv.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.
D. S. Täglich 3mal 1 Stück zu geben.

Anwend. In Epilepsie und Wahnsinn.

Greding.

791. *Rx.* Herb. belladonn. gr. xxiv
 Aquae comm. ferv. q. s.
 Digere per $\frac{1}{2}$ hor. Liquor. adh. calid. cola; colat.
 refriger. ℥ij adde
 Vini stibiat. 3j
 Syrup. seneg. 3vj.

M. D. S. Täglich 3—4mal $\frac{1}{2}$ Esslöffel.

Anwend. Gegen Keuchhusten bei einem Kinde von 10 Jahren.

Vogt.

792. *Rx.* Extr. belladonn. gr. ij
 Aquae cinnam. vinos. ℥j.

S. S. Täglich 3mal so viel Tropfen als das Kind Jahre zählt.

Kaiser u. A. nehmen gr. iv. Zwölf Tropfen ist die höchste Gabe.

Anwend. Als Schutzmittel gegen Scharlach.

Hillenkamp. Serlo. Berndt.

793. *Rx.* Extr. belladonnae gr. iv
Aquae laurocerasi $\bar{3}\beta$.

S. S. Täglich 3—4mal 30 Tropfen.

Liquor belladonnae cyanicus Hufelandi.

Anwend. Bei hartnäckigen Krämpfen, vorzüglich des Schlundes, Magens und Darmkanals, bei Dysphagie, chronischem Erbrechen, selbst anfangender Magenverhärtung, auch bei Gemüthskrankheiten.

Hufeland.

794. *Rx.* Extr. belladonnae $\bar{3}\beta$
„ gratiolae $\bar{3}ij$
Aquae laurocerasi $\bar{3}j$.

S. Täglich 3 mal 30—60 Tropfen.

Anwend. Bei Manie und Melancholie.

Hufeland.

795. *Rx.* Extr. belladonnae
„ hyoscyam. $\bar{a}\bar{a}$ gr. iij
Oxymell. scillit. $\bar{3}\beta$
Syrup. althaeae $\bar{3}ij$.

D. S. Umgeschüttelt, 2stündlich 1 Theelöffel.

Anwend. Bei Keuchhusten eines 8jährigen Kindes.

Phöbus.

796. *Rx.* Extr. belladonn. gr. ij
Liquor. kali carbon. $\bar{3}j$
Aquae menth. $\bar{3}v$
Tinct. rhei aquos.
Syrup. rhei $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Sodbrennen und Wasserspeien mit Kardialgie, gegen chronisches Erbrechen, sofern es nicht von Verschleimung und gastrischen Unreinigkeiten herrührt; palliativ gegen Skirrhus des Magens.

Rösch.

797. *Ry.* Extr. belladonn. gr. iv.

Solve in

Aquae laurocerasi $\mathfrak{z}\beta$.

D. S. Täglich 4 mal 10 Tropfen und täglich um 1 Tropfen zu steigen, nebst zertheilenden Umschlägen.

Anwend. Gegen Icterus pertinax.

A. L. Richter.

798. *Ry.* Herb. belladonnae $\mathfrak{z}\beta$ —j.

Coque in aquae font. $\mathfrak{z}\text{vj}$ per $\frac{1}{2}$ hor.

Colat. adde

Aquae laurocerasi $\mathfrak{z}\beta$ —j β .

M. S. Gegen heftigen skrofulösen Krampf der Augentlider.

v. Ammon,

799. *Ry.* Herb. belladonnae $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Infunde aquae ferv. q. s. ad colat. $\mathfrak{z}\text{vij}$.

S. Mit Kompressen lauwarm über die Augen zu legen.

Anwend. Gegen heftige und schmerzhaftte Schleimflüsse der Augen.

v. Gräfe.

800. *Ry.* Extr. belladonnae $\mathfrak{z}\beta$.

Solve in

Aquae destill. $\mathfrak{z}\beta$.

D. S. Umgeschüttelt, einige Tropfen mehrmals in's Auge zu tröpfeln.

Anwend. Zur Erweiterung der Pupille, zur Untersuchung des grauen Staares und vor der Staaroperation.

Langenbeck.

801. *Ry.* Extr. belladonnae gr. j.
Solve in
Aquae opii ʒij.

D. S. Umgeschüttelt, 2—3mal täglich einige Tropfen in's Auge zu träufeln.

Anwend. Zur Verhinderung der Pupillensperre bei chronischen Ophthalmieen.

Rust.

802. *Ry.* Herb. belladonnae conc. gr. xij—xx
Pulv. rad. salep ʒj.

M. f. spec. Dent. tal. dos. iv.

S. Mit 2 Weingläsern heissen Wassers übergossen und dann durchgeseiht aller 4—6 Stunden eine Portion zum Klystier.

Anwend. Bei eingeklemmtem Bruche.

Vogt.

803. *Ry.* Herb. belladonnae ʒj—jß.

Infunde c. aquae ferv. q. s.

Colat. ʒviij S. Klystier, dem 1—2 Esslöffel Oel zuzusetzen.

Anwend. Gegen eingeklemmten Bruch, nachdem Aderlass, laues Bad, Eisumschläge, Terpenthinklystiere mit Eigelb und Chamillenabsud vergeblich angewendet wurden. Auch gegen krampfhafter Zusammenziehungen in der Harnröhre.

Pitschaft.

804. *Ry.* Extr. belladonnae ʒij.

Solve in

Aquae laurocerasi ʒiv.

Adde

Aether. sulphur. l. Alcohol. ʒj.

M. D. S. Umgeschüttelt, zum Umschlagen.

Anwend. Gegen Neuralgien, auch zum Einreiben gegen gichtische und rheumatische Schmerzen.

Roux.

Gegen schmerzhafter Anschwellung der Brust bei Wöchnerinnen.

Ranque. Schnur.

805. *Rx.* Extr. belladonnae $\mathfrak{z}\beta$.

Solve in

Liqu. ammon. acetic. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

D. S. $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel voll einzureiben.

Anwend. Zur Beförderung der Aufsaugung.

Blasius.

806. *Rx.* Res. elemi $\mathfrak{z}\text{ij}$

Cerae alb. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Leni igne liquefact. admisce

Extr. belladonn. spirit. $\mathfrak{z}\text{ix}$.

S. Pflaster.

Planche's Belladonnapflaster.

807. *Rx.* Extr. belladonnae $\mathfrak{z}\text{j}$

Emplastr. mercurial. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. D. S. Auf Leder gestrichen aufzulegen.

Anwend. Gegen kalte Drüsengeschwülste.

Kopp.

808. *Rx.* Extr. belladonnae $\mathfrak{z}\text{j}$.

Cum paux. aquae rosar. liquefact. immisce exactiss. terendo

Ungt. rosat. l. Cerat. simpl. $\mathfrak{z}\text{j}$.

S. Eine bis zwei Drachmen einzureiben.

Anwend. Gegen krampfhaftes Verengerung der Schliessmuskeln, Strikturen des Muttermundes (und deshalb zögernde Geburt), der Harnröhre, des Afters; gegen weisse Geschwülste.

Chaussier.

Eine halb so starke Salbe empfiehlt Dubla gegen Nierenkolik.

809. *Ry.* Extr. belladonnae ʒij
Mellis commun. ʒj.

M. f. ungt.

D. S. $\frac{1}{4}$ stündlich haselnussgross um und in die Bruchgeschwulst einzureiben.

Anwend. Bei Brucheinklemmung. !

Nevermann.

N. zieht den Honig dem Fette vor, welches sich mit dem Extrakte in Klumpen balle.

810. *Ry.* Extr. belladonnae ʒj
Cerat. simpl. ʒß.

M. f. ungt.

D. S. Auf ein Bourdonnet gestrichen in den Mastdarm einzubringen.

Anwend. Bei krampfhafter Striktur des Sphincter ani.

Boyer.

B. Belladonnae radix.

Form u. Gabe. Wie bei dem Kraute, eher etwas geringer.

811. *Ry.* Pulv. rad. belladonn. gr. x
„ „ rhei ʒij.

M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

S. 2—3 mal täglich 1 Pulver.

Anwend. Bei Verstopfungen, Vergrösserungen, Verhärtungen der Leber und Milz, chronischer Gelbsucht, Atrabilarzustand, Asthma spasmodicum und Herzklopfen.

Hufeland,

812. *Ry.* Pulv. rad. belladonnae gr. vj
Chinii sulphur. gr. vj—xij

Sacchari albi 3ij.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

D. S. Täglich 2—3mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen hartnäckige, besonders Quartanfieber.

813. *R.* Rad. belladonnae gr. iiij

„ ipecacuanhae gr. ij

Zinc. oxydat. alb. gr. vj

Sacchari albi 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

D. S. Zweistündlich 1 Pulver.

Anwend. Gegen nervöse Epilepsie. Doch nicht für die Dauer.

Berends.

814. *R.* Pulv. rad. belladonnae gr. ij

„ ipecacuanhae gr. jß—ij

Sulphur. dep. gr. xxxij

Sacchari lact. gr. viij.

M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Viermal täglich ein Pulver mit Zuckerwasser.

Anwend. Gegen Keuchhusten 3—4jähriger Kinder. Mit der Belladonna steigt man allmählig.

Kopp.

815. *R.* Rad. belladonnae gr. v

Sulphur. dep. 3j

Tartari depur. 3v

Elaeosacch. foenicul. 3ij.

M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

D. S. Aller 3—4 Stunden 1 Pulver in Eibischthee.

Anwend. Gegen Keuchhusten für ein 10jähriges Kind.

Vogt.

816. *Ry.* Rad. belladonnae gr. β —ij
 Ferri sulphuric. gr. j
 Chinii sulphuric. gr. ij
 Magnes. albi gr. x.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. *Früh und Abends ein Pulver mit Zuckerwasser zu nehmen.*

Anwend. Bei Gastralgie, wenn sie mit Säure und mangelhafter Gallenabsonderung verbunden ist.

Naumann.

817. *Ry.* Rad. belladonnae
 Ferri oxydat. fusc. $\overline{aa}$ gr. iij
 Elaeosacch. calami $\mathfrak{z}$ j.
 M. f. pulv. D. ad chart. cerat.

S. *Morgens und Abends ein Pulver.*

Anwend. Gegen Prosopalgie.

Steinrück.

818. *Ry.* Rad. belladonnae gr. viij
 Tart. stibiat. $\mathfrak{z}\beta$
 Extr. conii maculat. 3β
 Sapon. medic. pulv. $3iij$
 Asae foetid. $3ij$.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. irid. flor. D. ad vitrum.

S. *Täglich 3mal 10 Stück.*

Anwend. Gegen hartnäckige Abdominalstockungen, Unterleibsverhärtungen, Leber- und Milzphyskonieen, inveterirte und zum skirrhösen neigende Mesenterialschwellungen.

Richter.

819. *Ry.* Pulv. rad. belladonnae $\mathfrak{z}$ j
 Elect. anod. (Theriac.) $\mathfrak{z}$ j (3β)
 Laudan. liquid. $\mathfrak{z}$ j

Pulv. gumm. mimos. ℥ij.
M. f. c. s. q. aquae electuar. spissius.

S. Auf Leder (Papier) gestrichen auf die Herzgrube zu legen.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Gölis.

Ein fingerbreiter Streifen, über die Augenbraunen gelegt, zeigte sich bei grosser Gereiztheit der Augen, bei gichtischen, syphilitischen und skrofulösen Entzündungen nützlich.

Radius.

820. R_y. Rad. belladonn. ℥j
Aquaе ferv. q. s.
Digere per ¼ hor.

Col. ℥j. S. Zum äusseren Gebrauch.

Anwend. Zur Erweiterung der Pupille. Man lässt 6—8 Stunden vor der Untersuchung alle Stunden ins Auge tröpfeln und die Umgegend waschen.

Radius.

821. a. R_y. Extr. rad. belladonn. ℥ß
Tinct. stramon. ℥ijß
Aquaе amygdal. amar. conc. ℥ij.

M. S. Aller 4 Stunden 30—40 Tropfen.

821. b. R_y. Limatur. martis ℥ß
Sacchari albi ℥j.
M. D. tal. dos. xvj.

S. Aller 4 Stunden abwechselnd mit den Tropfen sub a., so dass aller 2 Stunden eine Gabe von a., und dann von b. genommen wird.

821. c. R_y. Extr. rad. belladonnae
Tinct. stramon. āā ʒj
Aquae amygdal. amar. conc. ʒiij.

M. S. *Aller 3 Stunden etwas auf die schmerzende Wange zu reiben.*

Anwend. Gegen Gesichtsschmerz.

Schmidtman.

Benzoe. Benzoe.

(*Asa dulcis*; wohlriechender Asand. *Styrac benzoin Dryand.*)

Form u. Gabe. Aeusserlich als Räuchermittel, Tinktur zu Waschwässern.

822. R_y. Benzoes
Olibani
Mastiches
Camphorae āā ʒj.

M. f. pulv. gross. D. ad vitrum.

S. *Ein Pfötchen voll auf Kohlen zu streuen, den Dampf in Baumwollwatte aufzufangen und diese warm über die schmerzhaften Theile zu legen.*

Anwend. Gegen Rheumatismus.

Vogt.

823. R_y. Tinct. benzoës
„ cantharid. āā ʒj
Natri subcarbon. ʒij
Aquae fl. aurant. ʒviiij.

M. S. *Zum Waschen.*

Anwend. Gegen Sommersprossen.

Walther.

824. *Rx.* Benzoes $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Amygdal. dulc. excort. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Aquae rosar. $\mathfrak{z}\text{viiij}$.
M. f. l. a. emulsio.

D. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Sprödigkeit und Abschuppung der Haut.

Schubarth.

825. *Rx.* Furf. tritic. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$
 Herb. malvae $\mathfrak{z}\text{vj}$.
 Coq. c. aquae font. q. s. ad col. $\mathfrak{z}\text{xvj}$.
 Adde solvendo
 Ammon. muriat. dep $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Tinct. benzoes $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Finnen des Gesichts.

826. *Rx.* Amygdal. dulc. excort. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Cont. sensim addendo
 Aquae fl. aurant. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 „ rosar. $\mathfrak{z}\text{viiij}$
 Ammon. muriat. dep. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Tinct. benzoes $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Waschwasser.

Anwend. Gegen Finnen und spröde Haut.

Herrmann.

Acidum benzoicum; Benzoessäure.

(Flores Benzoes; Benzoeblumen.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lösung, Mixtur, Plätzchen, zu gr. iij—x, einigemal täglich.

Man vermeide Verbindungen mit Basen, besonders Alkalien und Erden, Eisenoxydsalzen.

827. Rx. Acidi benzoici gr. iij
Elaeosacch. anisi gr. x.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfs bei torpidem Zustande der Luftwege.

Reil.

828. Rx. Acidi benzoici 3ß
Gumm. mimosae.
Adde terendo
Syrup. amygdal. l. Syrup. bals. peruvian. 3ij.
M. D. S. Umgeschüttelt, 1—2stündlich 2 Theelöffel.

Anwend. Zur Beförderung des Auswurfes.

Berends

829. Rx. Acidi benzoici 3ß
Camphorae
Sulphur. stibiat. aurant. āā gr. vj
Elaeosacch. foenicul. 3j.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Lungenlähmung.

Berends.

322 BISMUTHUM NITRICUM PRAECIPITATUM.

830. *Rx.* Sulphur. stibiat. aurant. gr. iij
Pulv. rad. ipecacuanhae gr. vj
Acidi benzoici gr. xxxvj
Sacchari albi 3j.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. in charta
cerata.

S. Viermal täglich 1 Pulver mit Haferschleim.

Anwend. Bei asthenischer Pneumonie.

Horn.

Bismuthum nitricum praecipitatum. Wismuthniederschlag.

(Magisterium Bismuthi, Subnitras bismuthicus, Marcasita alba; basisch - salpetersaures Wismuthoxyd, Wismuthkalk, Schmink-, Perl-, Spanisch - Weiss.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. j—xij, einigemal täglich.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, Schwefel-, Phosphor-, Weinstein-, Citronen-, Galläpfel-, Hydrothionsäure, reinen und kohlensauren Alkalien, alkalischen Erden, Schwefel und Schwefelverbindungen, Jodkalium und Gerbestoff.

831. *Rx.* Bismuth. nitrici praecip. gr. ij
Magnes. carbon. gr. x.
M. f. pulvis. Disp. tal. dos. viij.
D. S Täglich 2 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Magenkrampf.

Marcus.

832. *Ry.* Bismuth. nitrici praecip. gr. iv—viij
Pulv. fol. digital. purp. gr. viij—xij
Conch. praep. ℥iv.

M. f. pulvis. Div. in viij part. aequal.

S. Zwei bis dreimal täglich 1 Pulver.

Anwend. Bei krampfigen Leiden des Nervus vagus, als Krampfhusten, auch Magenkrampf, besonders wenn es mit Gefässerregtheit gepaart ist.

Radius.

833. *Ry.* Bismuth. nitrici praecip. gr. ij
Magnes. ustae gr. x
Olei cajeput. gutt. ij
Sacchari albi gr. vj.

M. f. pulvis. Disp. tal. dos. vj. D. ad chart. cerat.

S. Täglich 2 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Magenkrampf.

Schubarth.

834. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanhae gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$
Bismuth. nitrici praec. gr. ij—iij
Magnes. albae gr. iv
Elaeosacch. anisi l. Sacchari albi gr. viij.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

S. Viermal täglich 1 Stück.

Anwend. Gegen chronische Uebelkeiten, Erbrechen und Würgen aus blosser Verstimmung der Nerven.

Kopp.

835. *Ry.* Rad. ipecacuanhae gr. ij
Bismuth. nitrici praec. gr. vj—xij
Magnes. subcarbon. ℥ij.
M. f. pulvis. Div. in xij part. aequal.

S. Täglich 3—4mal 1 Stück.

Anwend. Bei rheumatisch-nervöser Gastrodynie mit Neigung zu abnormen Blutungen.

Clarus.

836. *Ry.* Bismuth. nitrici praec.
 Extr. nucis vom. spirit. exsicc. āā gr. β
 Magnes. albae gr. iij
 Sacchari albi gr. xv
 Olei menthae pip. gutt. iij.
 M. f. pulvis. Dent. tal. dos. xij ad chart. cerat.
S. *Aller 3 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Gegen Magenkrampf bei schwächlichen Subjekten.

Vogt.

837. *Ry.* Bismuth. nitrici praec. gr. ij—iij
 Extr. lactuc. viros. gr. jβ—ij
 Magnes. albae gr. iv
 Rad. ipecacuanhae gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$
 Elaeosacch. chamom. l. menthae gr. x.
 M. f. pulvis. Disp. tal. dos. xij.
S. *3—4mal täglich 1 Stück.*

Anwend. Gegen Magenkrampf.

Kopp.

838. *Ry.* Bismuth. nitrici praec. gr. vj—xij
 Castorei gr. vj
 Sacchari albi 3j
 Olei destill. chamom. gutt. xij.
 M. f. pulvis. Div. in vj part. aequal.
S. *Täglich 3mal 1 Pulver.*

Anwend. Bei schmerzhafter Menstruation mit Magenschmerz von trefflicher Wirkung.

G. A. Richter.

839. *Ry.* Bismuth. nitrici praec. 3β
 Extr. valerian. 3j
 Olei valerian. gutt. x

Rad. valerian. pulv. q. s.
 ut f. pil. lx. Consp. cinnam. D. ad vitrum.
 S. *Täglich 3mal 6 Stück.*

Anwend. Gegen heftige Kardialgie.

Schubarth.

840. R_y. Bismuth. nitrici praec. ℥j
 Extr. aloes aquos. gr. x
 Pulv. rad. althaeae ℥j.
 F. c. suff. q. mucilag. gumm. tragacanth. pil. xl.
 Consp. canell. alba.
 S. *Früh und Abends 2 Stück.*

Anwend. Gegen kardialgische Beschwerden, wo Blutanhäufungen im Unterleibe, fehlerhafte Gallenabsonderung und Trägheit des Stuhlganges gleichzeitig zugegen sind.

Radius.

841. R_y. Bismuth. nitrici praec. gr. iij
 Sacchari albi gr. x.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj.
 S. *Täglich 2—4 mal auf die Zunge des Kindes zu bringen.*

Anwend. Gegen Diarrhöe der Kinder eines der vorzüglichsten Mittel. Für Kinder von 1—6 Monaten ist die Gabe gr. vj täglich, für Kinder von 6—12 Monaten gr. viij, für Kinder von 1—2 Jahren gr. xij, und für das Alter von 3 Jahren bis zur Pubertät gr. xvij.

Recamier. Trousseau.

Boletus Laricis. Lerchenschwamm.

(*Agaricus albus, Agaricum, Fungus Laricis.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. ij—x, täglich einigemal; im Aufguss 3ß—j auf 3iij, Esslöffelweise. Aeusserlich als Augen- und Streupulver gegen Blutungen.

842. *Ry.* Bolet. laricis gr. j—ij
 Elaeosacch. cinnam. gr. vj.
 M. f. pulv.

D. S. Abends vor Schlafengehen zu nehmen.

Anwend. Gegen kolliquative Nachtschweisse.

de Haen.

843. *Ry.* Bolet. laricis gr. xij
 Sacchari albi 3ij.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Abends 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen schmelzende Schweisse.

Barbut. Trauttsch. Bissou.

844. *Ry.* Pulv. bolet. laricis sicc. gr. vj—xviij
 Extr. thebaic. gr. ij—iiij
 Gummi mimos. 3ij.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Abends, oder Nachmittags und Abends [ein Pulver.

Anwend. Gegen kolliquative Nachtschweisse, bei denen gleichzeitig Neigung zu Durchfall ist.

845. *Ry.* Bolet. laricis
 Alumin. usti āā gr. iiij
 Sacchari lactis 3ß.
 M. f. pulvis.

S. Gegen Abend zu nehmen.

Anwend. Gegen Nachtschweisse Schwindsüchtiger.

Fuchs.

846. *Ry.* Bolet. laricis sicc. 3j
 Sem. cardamom. min. cont. 3jß
 Rad. gentian. rubr. 3ij
 Vini hispan. 3iv.

Dig. per triduum. Cola c. express.

S. Täglich 3mal 20—30 Tropfen.

Anwend. Gegen atonische Verschleimungszustände des Unterleibes, gegen chronische, atonische Bauchwassersucht, besonders gegen Verdauungsschwäche nach dem anhaltenden Missbrauche geistiger Getränke.}

Sundelin.

847. *Ry.* Bolet. laricis
 Hydrargyr. oxydat. rubr. āā gr. xv
 Sacchari albi 3ß.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Jeden Tag ein klein wenig in die Augen zu blasen.

Anwend. Gegen Verdickung der Hornhaut.

Bolus armēna. Armenischer Bolus.

(Argilla ferruginea rubra; rother Bolus.)

Form u. Gabe. In Pulver, Schüttelmixtur, Lattwerge, Bissen, zu gr. v—x, täglich einigemal. *Aeusserlich als Augenmittel.*

848. *Ry.* Boli armenae
 Rad. rhei
 Magnes. carbon. āā 3j.
 M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Täglich 3mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen atonische Metrorrhagie.

v. Hildenbrand.

849. *Ry.* Boli armenae ʒij
 Rad. rhei ʒj
 Magnes. carbon.
 Elaeosacch. macid. āā ʒij.
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich 2mal 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen gelinde habituelle Metrorrhagieen, chronischen weissen Fluss, Nachtripper.

Rust.

850. *Ry.* Boli armenae
 Tartari depur.
 Sacchari albi āā ʒij.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. In das Auge zu blasen.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Baldinger.

851. *Ry.* Boli armenae
 Vitriol. roman. āā ʒiij
 Camphorae ʒij.

Infunde

Aquae fervid. ʒviiij.

Stent in digest. per aliquot tempus.

Colat. *S.* Mittelst einer kleinen Spritze zwischen die Augenlider zu spritzen.

Anwend. Bei eiterigen Ausflüssen der Augenlider.

Scarpa.

852. *Ry.* Boli armenae
 Tartari depur.
 Sacchari cryst. āā ʒj
 Lapid. divini c. aerug. par. ʒij.
 M. f. pulv. tenuiss.

S. Zum Einblasen in's Auge.

Anwend. Gegen Pannus von chronisch - katarrhalischer Augenentzündung.

Fr. Jäger.

853. *Ry.* Mercur. praecip. albi 3ß

Boli armenae

Tutiae praep. āā 3j

Axung. porc. 3ij.

M. exactiss. f. unguent.

. *Täglich 1 — 2 mal einer Linse gross zwischen die Augenlider zu bringen.*

Anwend. Gegen chronische Ophthalmieen, Blennorrhöen, Flecken und Geschwüre der Hornhaut.

Janin.

854. *Ry.* Sanguin. dracon. 3ß

Aluminis

Boli armenae āā 3j

Ferri oxydat. rubri 3ij.

M. f. pulv. subtiliss.

S. Schnupfpulver.

Anwend. Gegen heftiges Nasenbluten.

Griffith.

Brucium. Brucin.

(Brucina, Brucinum, Caniranium.)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Lösung, Tinktur, zu gr. $\frac{1}{4}$ —ij, täglich einigemal.

855. *Ry.* Brucinae pur. gr. xij

Conserv. rosar. 3ß.

M. exact. f. pil. xxiv. arg. obduc.

S. *Täglich 2 mal 2—6 Pillen.*

Anwend. Gegen örtliche und allgemeine Lähmungen.

Magendie.

856. *Rx.* Brucinae pur. gr. xvij
Alcohol. 36° ℥j.

S. S. 6—24 Tropfen täglich 2—3mal.

Anwend. In gleichen Fällen.

Magendie.

857. *Rx.* Brucinae pur. gr. vj
Aqua destill. ℥iv
Sacchari albi ℥ij.

S. S. Früh und Abends 1 Esslöffel.

Anwend. In gleichen Fällen.

Magendie.

Bryoniae radix. Gichtrübe.

(Zaunrübe, Hundskürbis; *Bryonia alba* L.,
Bryonia dioica Jacq.)

Form u. Gabe. Frisch ausgepresster Saft zu ℥j—ij mit Milch; Aufguss ℥iv — vj auf ℥iv Wein, Bier; Pulver zu ℥j—ij mit Milch oder Schleim, täglich einmal. Aeusserlich frisch in Scheiben geschnitten gegen ödematöse, rheumatische Gelenkgeschwülste.

Man vermeide Verbindungen mit Salzbildern, empfindlichen Metallsalzen, z. B. Eisenoxydsalzen, essigs. Blei, Gerbestoff.

858. *Rx.* Rad. bryoniae ℥j
Vini albi vel Cerevisiae ℥j.
Leniter ebulliant.

Colat. S. Eine halbe Tasse voll auf einmal.

Anwend. Gegen Wassersucht. Wirkt diese Dosis binnen 4 Stunden nicht stark auf Stuhl und Urin, so ist die Gabe zu verdoppeln.

Hufeland.

859. *Ry.* Rad. bryoniae $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aquae font. $\mathfrak{z}\text{iv}$.
 Coque; colatur. adde
 Aceti $\mathfrak{z}\text{iv}$
 Salis commun. quantum in aceto dissolvi potest.
D. S. *Erwärmt, Leinwand oder Flanell damit*
zu trinken und auf den kranken Theil zu le-
gen.

Anwend. Bei Gelenkgeschwülsten mit Steifigkeit.

Trampel.

860. *Ry.* Rad. bryoniae $\mathfrak{z}\text{iiij}$
 Flor. sambuci $\mathfrak{z}\text{j}$
 Gumm. ammon. $\mathfrak{z}\beta$
 Ammon. muriat. crud. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Herb. conii macul. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aceti crudi q. s.
 Fiat coquendo cataplasma.
S. *Auf die Geschwulst warm aufzulegen.*

Cataplasma ex Bryonia Plenckii.

Anwend. Zur Zertheilung von Skirrhusitäten, Skrofeln, Kröpfen, Gelenkgeschwülsten u. s. w.

Plenk.

C.

Cacao. Cacaobohnen.

(*Theobroma Cacao* L.)

Form u. Gabe. Die Cacaobohnen (*Semina* s. *Nuclei cacao*) werden zur Bereitung von verschiedenen Sorten von Chocolate in verschiedenen Gaben benutzt. Das Oel oder die Cacaobutter (*Butyrum* s. *Oleum de cacao*) dient zur Bereitung von Salben und zu Stuhlzäpfchen.

861. **Ry.** Pulv. nucleor. cacao tost. ℥viij
„ oryzae
„ sacchari albi āā ℥iv.
„ cinnam. ℥j.

M. f. pulvis.

D. S. Ein bis 3 Loth mit 3—4 Tassen Wasser oder Milch zu kochen und zu verbrauchen.

Anwend. Ein die Ernährung beförderndes Mittel.

Reinhold.

862. **Ry.** Olei cacao ℥j
Pulv. rad. salep subtiliss. ℥j.
Conterant. c. paux. aquae destill. exactiss., ut f.
malagma consist. mellis rec., cui adde

Olei crotonis gutt. x
 „ anisi aether. gutt. xx
 Pulv. rad. althaeae q. s.
 Misc. int. ut f. pil. LX. Consp. irid. flor.
 Obduc. fol. arg.

S. 2 — 3 — 6 Stück auf einmal Vormittags eine Stunde nach dem Frühstück.

Anwend. Ein sehr mildes, selbst von reizbaren Individuen gut vertragenes Abführungsmittel.

Sundelin.

863. R_y. Butyr. de cacao
 Cerat. solid. aa 3j.
 F. suppositoria No. ij.

Anwend. Bei entzündlicher Reizung des Mastdarmes.

Cadmium sulphuricum. Schwefel-
 saures Kadmium.

(Sulphas Cadmii s. Melini s. Klaprothii.)

Form u. Gabe. Bis jetzt nur äusserlich in Lösung oder Salben, zu gr. j—iv auf 3j.

864. R_y. Cadmii sulphur. gr. j—ij
 Axung. porc. ʒiv—3j.
 M. f. unguentum.

S. Augensalbe.

Anwend. Gegen Hornhautflecke mit vielem Nutzen gebraucht.

Radius.

334 CADMIUM SULPHURICUM. CAJEPUTI OLEUM.

865. *Ry.* Cadmii sulphur. gr. ij—vj
Aquae destill. $\overline{3}\beta$.

S. S. Täglich 1—3mal einige Tropfen davon ins Auge zu tröpfeln.

Anwend. Gegen Hornhautflecke, chronische Bindehautentzündung, Blennorrhöe der Augenhäute, Auflockerung der Bindehaut u. s. w.

v. Gräfe. Rust.

866. *Ry.* Cadmii sulphur. gr. j—ij
Aquae destill. $\overline{3}\beta$.

S. S. Täglich 1—2mal ins Auge zu tröpfeln.

Anwend. Gegen Hornhautflecke der Kinder.

Kopp.

867. *Ry.* Cadmii sulphur. gr. j—ij
Mucilag. gumm. mimos. $\overline{3}j$.
M. exacte.

S. Mit einem Haarpinsel auf die Flecke täglich mehreremale zu bringen.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Ansiaux.

Cajeputi oleum. Cajeputöl.

(*Melaleuca Cajeputi Roxbg.*)

Form u. Gabe. Rein auf Zucker, in Pulver, Pillen, Lattwerge, Bissen, Mixturen, zu 1—10 Tropfen; äusserlich als Riechmittel, Einreibung, Zahnpulver u. s. w.

Man vermeide Verbindungen mit starken Säuren, Chlor, Brom, Jod, salzs. Gold, Sublimat, salpeters. Quecksilberoxyd.

868. *R.* Olei cajeputi gutt. xxx
Spirit. sulphurico-aether. ℥ij .

M. D. S. 12—24 Tropfen mit Zucker zu nehmen.

Anwend. In hysterischen und konvulsivischen Krämpfen.

Schubarth.

869. *R.* Olei cajeputi gutt. xxiv
Rad. valerian. min. ℥β
Fol. aurant. ℥j .

M. f. pulvis. Div. in vj part. aequal. D. ad chart. ceratam.

S. Täglich 3mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Richter.

870. *R.* Olei cajeput.
„ menth. crisp. $\bar{a}\bar{a}$ ℥j
Liniment. volat. camphor. ℥j
Tinct. thebaicae ℥j .

M. S. Zum Einreiben.

Linimentum antispasmodicum Hufelandi.

Anwend. Gegen krampfhafte Beschwerden.

Hufeland.

871. *R.* Olei cajeput. ℥β
Liniment. volat. ℥β .

M. S. Zum Einreiben um das Auge.

Anwend. Gegen Stirnschmerz bei chronisch-rheumatischer Augenentzündung.

Fischer.

872. *Ry.* Olei cajeput.
 Tinct. cantharid. āā ℥j
 Spirit. rorismarin.
 „ serpylli
 „ lavendul. āā ℥j.

M. D. S. Einigemal des Tages in die Schläfengegend einzureiben.

Anwend. Bei Amaurosis paralytica.

Weller.

873. *Ry.* Olei cajeput. gutt. iv
 Spirit. nitri dulc. ℥ij.

S. S. In eine mit 10 Unzen Chamillenaufguss gefüllte Spritze.

Clyster anticolicus Vogleri.

Anwend. Gegen Kolikschmerzen verschiedener Art.

Vogler.

Caincae radicis cortex. Cainca- wurzelrinde.

(*Chiococca anguifera* Mart., *Ch. racemosa* L.)

Form u. Gabe. In Pulver (selten), zu ℥j—iij;
 Abkochung, ℥ß—ij auf ℥j Wasser; wässeriges Extrakt,
 zu gr. xij—xxiv täglich.

Man vermeide Verbindungen mit concentrirten Säuren,
 Salzbildern, Alkalien, empfindlichen Metallsalzen, Gerbestoff.

874. *Ry.* Cort. radic. caincae ℥ij.

Digere cum

Aquae font. ℥viiij per xlviiij hor. Colat. coque per
 sext. hor. part.

Decoct. filtra.

S. Das Ganze auf 2mal in 2 Stunden zu nehmen.

Anwend. Gegen Bauchwassersucht.

François.

875. *Ry.* Rad. caincae $\text{℥ij}—\text{vj}$.

Coque cum aquae font. ℥xx ad rem. ℥viiij .

Colat. *S.* *Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel voll.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Hamburger Krankenhaus.

876. *Ry.* Rad. caincae ℥iij .

Coque c. aquae comm. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor.

Colat. ℥vj refrigerat. adde

Spirit. muriat. aether.

Elaeosacch. juniperi āā ℥ij .

M. D. S. *Aller 2 Stunden 1 grossen Löffel voll zu nehmen.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Wendt.

Acidum caincicum; Caincasäure.

Form u. Gabe. Lösung zu gr. $v—vj$ täglich.

Anwend. In gleichen Fällen wie die Abkochung der Wurzelrinde.

Calamus aromaticus. Kalmuswurzel.

(Acorus Calamus L.)

Anker-, Zehr-, Magen-Wurzel.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Morsellen, Lattwerge, zu $\text{℥β}—\text{ij}$; im Aufguss zu $\text{℥β}—\text{j}$ auf ℥j , esslöffelweise; Confekt zu $\text{℥β}—\text{j}$; Extrakt zu gr. $v—xx$; Tinktur zu 30—60 Tropfen, einigemal täglich. Aeusserlich $\text{℥iij}—\text{iv}$ zu einem Bade für Erwachsene, für Kinder die Hälfte.

877. *Ry.* Calami aromat. ℥β .

Infunde aquae ferv. q. s. ad colat. ℥iij

Gumm. mimos. $\bar{3}j$

Sacchari albi $\bar{3}ij$.

S. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen Verdauungsschwäche und asthenischen Durchfall der Kinder. In Verbindung mit gewürzhaften Umschlägen.

Wendt.

878. *Ry.* Rad. calami arom.

„ angelic. $\bar{a}a$ $\bar{3}ijj$.

Infunde c. aquae ferv. $\bar{3}vijj$.

Stent in digest. per $\frac{1}{2}$ hor. Colat. adde

Aether. sulphur. $\bar{3}ij$

Syrup. cort. aurant. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Schwäche der Verdauung mit Blähungsschwerden, Nervenfieber.

Richter.

879. *Ry.* Rad. calami arom. $\bar{3}ij$.

Conc. infunde c. aquae ferv. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor. v. c.

Colat. refriger. $\bar{8}j$ adde

Extr. absinthii $\bar{3}j$

Spirit. sulphurico-aether. $\bar{3}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ Tasse.

Anwend. Gegen Skorbut.

v. Hildenbrand.

880. *Ry.* Pulv. rad. calami arom.

Elaeosacch. aurant. $\bar{a}a$ $\bar{3}j$.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Täglich 3mal 1 Pulver in Wasser oder Wein.

Anwend. Gegen Dyspepsie, Bleichsucht, Skorbut u. s. w.

Meyer.

881. *Ry.* Pulv. rad. calami arom. $\bar{3}$ ijß
 „ „ valerian. $\bar{3}$ jß
 Syrup. cort. aurant. $\bar{3}$ ij.
 M. f. electuarium.

S. *Aller 2 Stunden 1 Theelöffel.*

Schubarth.

882. *Ry.* Sacchari albi $\bar{3}$ vj.
 Coque c. aquae font. q. s. ad consist. tabulandi.
 Adde
 Rad. calami arom. pulv. $\bar{3}$ vj
 Sem. foenicul. pulv. $\bar{3}$ ij
 Olei menthae pip. $\bar{3}$ ß.
 M. f. l. a. morsuli xxx.

D. S. *3mal täglich 1 Stück.*

Phöbus.

883. *Ry.* Calami arom. $\bar{3}$ ß
 Carb. ligni tiliae
 Sapon. venet. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j
 Olei caryophyll. arom. $\bar{3}$ j.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. *Zahnpulver.*

Pitschaft.

884. *Ry.* Rad. calami arom. $\bar{3}$ iv
 Specier. aromat. $\bar{3}$ ij.
 Conc. M. f. species.

S. *Zu aromatischen Bädern und Waschungen.*

Calcaria, Calx. Kalk, Kalkerde.**A. Calcaria carbonica;** kohlsaure Kalkerde.

(*Carbonas Calcis, Terra calcarea.*)

Man benutzt zum arzneilichen Gebrauche die natürlichen kohlsauren Kalkarten:

a) *Creta alba s. praeparata*; weisse präparirte Kreide.

b) *Conchae praeparatae*; präparirte Austerschalen.

(*Ostracodermata; von Ostrea edulis L.*)

c) *Lapides s. Oculi cancrorum*; Krebssteine, Krebsaugen.

(*Von Astacus fluviatilis F.*)

Im Allgemeinen ist jedoch *Magnesia carbonica* diesen drei kohlsauren Kalkarten zum inneren Gebrauch vorzuziehen, weil die *Magnesia* den Magen weniger belästigt.

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Zeltchen, Pillen, Lattwergen und Schüttelmixturen, zu gr. v—xx, mehrmals täglich. Aeusserlich zu Streu-, Zahn- und Augenpulvern.

Man vermeide Säuren, saure Salze, ausser in Brausemischungen, wo man Kohlensäure entwickeln will.

885. *Ry.* Cretae praepar. $\bar{3}\beta$
 Lapid. cancror. $\bar{3}ij$
 Cort. cinnam. $\bar{3}\beta$
 Sacchari purific. $\bar{3}ijj$.
 M. f. pulv. subtiliss. Adde
 Mucilag. gumm. mimos. q. s.
 F. trochisci $\bar{3}\beta$.

S. Des Tages über 3—4 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Magensäure von schwacher Verdauung.

J. A. Schmidt.

886. *Ry.* Lapid. cancror. praep.
 Cornu cervi raspat.
 Rad. valerianae
 Visci querni $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ijj$.
 M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Einigemale täglich zu $\frac{1}{2}$ —1 Messerspitze.

Pulvis antispasmodicus infantum.

Anwend. Bei Säure in den ersten Wegen, Erbrechen, Durchfällen, Nervenreizungen, Zähneknirschen.

Hufeland.

887. *Ry.* Conchar. praepar. $\bar{3}\beta$
 Elaeosacch. anisi $\bar{3}j$.
 M. f. pulv.

D. S. Aller 2 Stunden eine Messerspitze voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Säure und saures Aufstossen.

888. *Ry.* Conchar. praepar.
 Kali sulphuric.
 „ nitric. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.
 M. f. pulv.

Täglich 2—3mal 1 Theelöffel voll.

Unzer's säuretilgendes kühlendes Pulver.

Anwend. In gleichen Fällen.

Unzer.

889. *Rx.* Conchar. praepar. l. magnes. alb. (3ij) 3ß
 Resin. guajac.
 Ferri pulverat. āā 3ß
 Sacchari albi 3iij.

M. f. pulv.

D. S. Früh und Abends 1 Messerspitze voll.

Pulvis antiscrofulosus Goelisii.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Goelis.

890. *Rx.* Conchar. praepar. 3ß
 Gummi mimos. pulv. 3j.

Tere cum

Syrup. althaeae

Aquae commun. āā 3j.

M. D. S. Umgeschüttelt, 2stündlich 1 Theelöffel voll.

Anwend. Bei Diarrhöe eines Säuglings.

Phoebus.

891. *Rx.* Cornu cervi usti 3jß
 Lapid. cancr. 3j
 Rad. irid. flor. 3ß
 Tart. depur. 3ij
 Caryophyll. arom. 3ß
 Nucis moschat. gr. xv.

M. f. pulvis.

S. Weisses Zahnpulver.

B. Calcaria chlorata. Chlorkalk.

(Chloris calcicus, Calcaria oxymuriatica; oxydirt-salzsaurer Kalk, Bleichpulver.)

Form u. Gabe. Als Lösung, Bissen, Plätzchen, zu gr. j—iij, mehrmals täglich. Aeusserlich zu Mund-,

Gurgel-, Augewässern, Einspritzung, Waschung, Bad, Linimenten, Salben, Pflastern u. s. w., zu ʒß—3ij auf ʒj.

Der Chlorkalk wird ausserordentlich leicht, selbst durch die meisten organischen Körper zersetzt; man vermeide auch Licht und Wärme.

892. *Ry.* Calcar. chlorat. ʒj—iiij.

Solve in

Aquae destill. ʒß—j.

Solut. filtr. adde

Syrup. simpl. ʒß.

M. D. in vitro charta nigra obducto.

S. Aller 2—3 Stunden 2—3 Esslöffel.

Anwend. Bei skrofulösen Drüsenleiden.

Cima.

893. *Ry.* Calcar. chlorat. ʒß

Aquae destill. ʒiiij.

S. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel ohne vorheriges Umschütteln.

Anwend. Gegen Scrofula fugax.

Muss 4—6 Wochen fortgesetzt werden, ehe es Nutzen schafft.

Werneck.

894. *Ry.* Calcar. chlorat. ʒß

Sacchari albi ʒij

Mucilag. gumm. tragac. q. s.

ut f. trochisci No. Lxxx., amylo conspergendi, non torrendi. D. in vitro albo.

S. Zweistündlich 1 Stück.

Anwend. Gegen übelriechenden Athem, auch vom Tabakrauchen.

Phöbus.

895. *Ry.* Calcar. chlorat. sicc. ʒj

Sacchari albi ʒiv

Amyli $\bar{3}\beta$ Gummi tragacanth. $\bar{3}\beta$ Carmini gr. $\text{j}\beta$.M. f. pastilli gr. iiij .

S. 4—5 Stück innerhalb 2 Stunden zu nehmen.

Anwend. Gegen übelriechenden Athem.

Deschamps.896. Rx. Calcar. chlorat. $\bar{3}\text{j}$.

Solve leniter terendo in

Aquae destill. $\&\text{vj}$.

Tunc adde

Alcohol. puriss. pond. spec. $83\frac{1}{2}\%$ Richt. $\bar{3}\text{vj}$.Mixt. reponatur in loco frig. per xxiv horas, tunc
filtretur et reservet. in lagena bene obturata.S. Nach Reinigung der Zähne mittelst einer
Bürste den Mund täglich einigemal damit aus-
zuspülen und zu gurgeln.

Freyberg's Mundwasser.

Anwend. Gegen üblen Geruch aus dem Munde.

Kluge. Freiberg.

897. Rx. Calc. chlorat. gr. xv—xxx

Mucilag. gumm. mimos. $\bar{3}\text{j}$ Syrup. cort. aurant. $\bar{3}\beta$.

M. D. in vitro nigro.

S. Umgeschüttelt mittelst eines Charpiepinsels auf
die Geschwüre zu streichen.

Anwend. Bei Exulcerationen des Zahnfleisches.

Angelot.898. Rx. Calcar. chlorat. $\bar{3}\text{j}$ Aquae destill. $\bar{3}\text{vj}$.

S. S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen syphilitische Geschwüre, phagedänische Fuss-
geschwüre, gegen stinkenden weissen Fluss, der nicht als
Symptom vom Gebärmutterkrebs erscheint, überhaupt zur
Reinigung und Verbesserung stinkender Geschwürsflächen.**Werneck. Walther.**

899. *Ry.* Calcar. chlorati āā 3ij—ij
Aquae ℥j.

S. S. Umgeschüttelt, mittelst eingetauchter und stets von Neuem befeuchteter Charpie anzuwenden.

Anwend. Gegen Hospitalbrand.

Rust. Kluge.

Gegen Verbrennungen 2. Grades und Erfrierungen.

Lisfranc.

900. *Ry.* Calcar. chlorat. 3ß
Aquae fluviat. coct. ℥ij.

S. Bad.

Anwend. Gegen Winddorn, beginnenden sowohl als bereits in Verschwärung übergegangenen.

Werneck.

901. *Ry.* Flor. arnicae 3ij
„ chamomill. 3ß

Aquae comm. ferv. q. s.

Stent in digest. per $\frac{1}{4}$ hor. in colat., 3v solve

Calcar. chlorat. 3j.

Filtra. D. in vitro chart. nigra obduct.

S. Zum Umschlagen.

Anwend. Gegen Brand der Augenlider.

Andreae.

902. *Ry.* Calcar. chlorat. gr. ij—xv.

Solve in

Aquae destill. 3ij.

Filtra. D. in vitro nigro.

S. Augewasser. Mit einem Pinsel aller 3 Stunden auf die Konjunktiva zu bringen, dann das Auge sogleich mit einer in kaltes Regenwasser getauchten Kompresse zu bedecken. Die Auflösung muss täglich erneuert werden.

Anwend. Bei Ophthalmia purulenta Erwachsener, auch der Kinder, wenn sie chronisch geworden.

Varlez.

903. *Ry.* Calcar. chlorat. gr. ij
Corall. rubr. alcohol. 3ij.

M. f. pulvis.

S. Zahnpulver.

Anwend. Zum Bleichen gelber Zähne vom Tabakrauchen.

Deschamps.

904. *Ry.* Calcar. chlorat. gr. v—xx
 Conchar. praep. l. Corall. rubr. $\text{℥}\beta$
 Olei caryophyll. gutt. ij.
M. f. pulvis. D. in vitro bene clauso.

S. Zahnpulver. Es soll nur so viel, als jedesmal verbraucht wird, ausgeschüttet, u. das Glas dann wieder sorgfältig verschlossen werden.

Anwend. Gegen üblen Mundgeruch, kariöse und vom Tabakrauche gelb gefärbte Zähne.

905. *Ry.* Sal. commun. pulv. ℥j
 Calcar. chlorat. ℥viii
M. f. pulvis. D. ad vitrum.

S. In einem grossen Glase Wasser aufzulösen und als Waschmittel zu gebrauchen.

Pulvis Knoxii.

Anwend. Als Präservativ gegen venerische Ansteckung vor und nach dem Beischlafe angewendet von den Engländern.

906. *Ry.* Calcar. chlorat. $\text{℥}\beta$
 Axung. porci ℥j .
M. f. unguentum.

S. Einen Tag um den andern ohngefähr gr. xv einzureiben.

Anwend. Gegen Kropf. Man muss oft wegen Reizung der Haut 4—5 Tage aussetzen.

Werneck.

907. *Ry.* Calcar. chlorat.
 Emplastr. diachyl. comp. āā
M. S. Pflaster.

Anwend. Gegen Schwamm des Fussgelenkes.

Heiberg.

908. *Ry.* Calcar. chlorat. $\bar{3}j$
 Sapon. domestic. nigri $\bar{3}ij$
 Aquae fontan. q. s. ut f. liniment.

S. Morgens und Abends damit einzureiben.

Anwend. Gegen Krätzausschlag.

Schönlein.

909. *Ry.* Calcar. chlorat. gr. xv
 Carbon. praep. $\bar{3}\beta$
 Aquae commun. q. s. ut f. liniment.

*D. S. Umgeschüttelt, täglich einigemal aufzu-
 pinseln.*

Anwend. Gegen Herpes.

Neumann.

910. *Ry.* Calcar. chlorat.
 Boracis $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.
 Subtiliss. pulverat. adde
 Adipis suill. $\bar{3}j$.

*M. D. S. Zum Einreiben oder auf Leinwand gestri-
 chen überzulegen.*

Anwend. Gegen Frostbeulen.

Trusen.

911. *Ry.* Calcar. chlorat. $\bar{3}j$
 Adip. suill. $\bar{3}x$.
 M. f. unguentum.

*S. Zweimal täglich haselnussgross in die Grind-
 stellen einzureiben.*

Anwend. Gegen Kopfgrind.

Wenzel.

C. *Calcaria muriatica*; salzsaurer Kalk.

(*Chloretum Calcii*, *Calx salita*, *Sal ammoniacum fixum*, *Phosphorus Hombergii*; *Chlorcalcium*, *Kalköl*, *fixer Salmiak*.)

Form u. Gabe. In Lösung, zu gr. $\text{ij} - \text{x}$, täglich einigemal. Aeusserlich zu Waschungen 3j auf 3viij , zu Bädern $\text{3j} - \text{ij}$, zur Austrocknung der feuchten Luft im Zimmer nach Schönlein.

Man vermeide Verbindungen mit kaustischem Kali und Natron, kohlens. Alkalien, Schwefel-, Phosphor-, Salpeter-Weinstein-, Bernsteinsäure und den Salzen dieser Säuren, auch mit essigs. Salzen, Borax und vielen Metallsalzen.

912. Rx. Calcar. muriat. 3j
Aqua destill. 3j .

M. D. S. Aller 3 Stunden 30 Tropfen. (Für ein Kind von 6 Jahren.)

Anwend. Gegen Skrofeln.

Hufeland.

913. Rx. Calcar. muriat. 3j
Tinct. calami 3j

S. S. Täglich 3mal 30—40 Tropfen.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Niemann.

914. Rx. Calcar. muriat 3j .
Extr. conii maculat. gr. xv.

Solve in

Aquae cinnamom. simpl. $\bar{3}\beta$.

D. S. Umgeschüttelt, täglich 3 mal 8—16 Tropfen. (Für ein Kind von 10 Jahren.)

Anwend. Gegen Skrofeln.

Phöbus.

915. *Ry.* Calcar. muriat. $\bar{3}j$.

Solve in

Aquae destill. $\bar{3}vj$.

Adde

Aquae laurocerasi $\bar{3}j$.

M. D. S. Täglich 3 mal 30 Tropfen.

Anwend. Gegen Skrofeln, Kropf.

Remer.

916. *Ry.* Calcar. muriat. $\bar{3}j$

Extr. hyoscyam. $\bar{3}\beta$.

Solve in

Aquae destill. $\bar{3}vj$.

Adde

Syrup. liquirit.

M. D. S. Umgeschüttelt, 4 mal täglich 1 Esslöffel

Anwend. Bei skrofulöser Lungenschwindsucht.

Beddoes.

917. *Ry.* Calcar. muriat. $\bar{3}j$

Pulv. herb. digital. $\bar{3}ij$

Acet. concentr. $\bar{3}ij$

Adipis suilli $\bar{3}j$.

M. f. unguent.

D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen chronische Drüsengeschwülste.

Sundelin.

918. *Ry.* Calcar. muriat. $\mathfrak{Zij}$
 Liquor. ferr. muriat. $\mathfrak{Ziij}$.
 Solve in
 Aquae destill. $\mathfrak{Ziv}$.

S. Zu zwei Bädern.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Sundelin.

D. Calcaria sulphurata; Schwefelkalk.

(*Hepar Sulphuris calcareum, Sulphuretum Cal-*
cii, Hepar Calcis; Kalkschwefelleber.)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, nicht gern in Pulvern, zu gr. v—x, täglich einigemal; bei Vergiftungen $\mathfrak{Zj}$ — $\mathfrak{ij}$ alle $\frac{1}{2}$ Stunden in Auflösung. Aeusserlich $\mathfrak{Zij}$ — $\mathfrak{iv}$ zu Bädern.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, Metalloxyden und Salzen.

919. *Ry.* Calcar. sulphurat. $\mathfrak{Zj}$
 Pulv. stipit. dulcamar. $\mathfrak{Zij}$
 Mellis despumat. q. s.
 ut f. boli vj. Consp. cinnam. D. ad pyxidem.
S. Täglich 3 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Gicht, chronischen Rheumatismus.

Mönch.

920. *Ry.* Herb. aconiti $\mathfrak{3\beta}$
 Calcar. sulphurat. $\mathfrak{Zij}$
 Succin. liquirit. dep. $\mathfrak{Zj}$.
 M. f. pulv. Div. in xv part. aequal. D. in charta cerata.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen eiterige Lungensucht.

Busch.

921. *Ry.* Calcar. sulphurat. ℥ij .

Solve in

Decoct. althaeae ℥ij .

D. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Crusta lactea.

Hahnemann.

922. *Ry.* Calc. sulphurat. ℥ij .

D. tal. dos. vj .

S. Mit einer hinreichenden Menge Wassers zu kochen und dem Bade zuzusetzen. Kurz vor dem Einsteigen fügt man noch 8 Loth verdünnte Schwefelsäure bei.

Anwend. Gegen Gicht, chronische Hautausschläge u. s. w.

Pharm. Austr.

923. *Ry.* Calcar. sulphurat. ℥β

Aquae ℥jβ .

Solutioni adde

Acidi hydrochlorici tenuis ℥ij .

D. ad lagenam.

S. Offen einige Stunden am Bette stehen zu lassen.

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht.

Augustin.

E. Calcaria sulphurato-stibiata.

Spiessglanzschwefelkalk.

(*Calx Antimonii cum sulphure Hoffm., Calcareum sulphuratum, stibiatum. Hepar Antimonii calcareum, Sulphuretum Calcis stibiatum.*)

Form u. Gabe. In Auflösung, selten als Pulver, Pillen, zu gr. $\text{ij} - \text{vj}$, täglich einigemal. Aeusserlich zu Pflastern, Umschlägen, Waschungen, Bädern $\text{℥j} - \text{ij}$.

Man *vermeide* Verbindungen mit Säuren oder sauren Salzen, Metalloxyden und Salzen, Alkalien.

920. *Ry.* Calcar. antimon. sulphur. ʒij.

Coque c. aquae font. ℥v ad rem. ℥iv.

Colat. S. Täglich ℥ß — j zu verbrauchen und nach und nach bis ℥iij zu steigen.

Anwend. Gegen veraltete, tief eingewurzelte Dyskrasieen, Quecksilber- und andere Metallvergiftungen, Stockungen in den Unterleibseingeweiden, Drüsenanschwellungen, Kropf, veraltete rheumatische Beschwerden.

Vogt.

Aeusserlich wendet man dieselbe Abkochung, welche dann noch einmal so stark gemacht werden kann, gegen Kopfgrind, alte Geschwüre zum Waschen und Fomentiren an. Auch als Mundwasser bei Stomacace.

921. *Ry.* Calcar. sulphurato-stibiat. ʒß

Mucilag. gumm. tragac. q. s.

F. pil. lx. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 5 Stück.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Hufeland.

922. *Ry.* Cerae flavae ʒj — jß.

Liquefact. admisce

Picis liquid. ʒj.

Bene agitatis et paululum refrig. admisce

Calcar. antim. sulphur. ʒv.

D. ad ollam albam.

Emplastrum calcariae piceum.

Anwend. Gegen Ischias, Lumbago, chronischen Kopfschmerz,

Gesichtsschmerz, chronischen Lungenkatarrh, rheumatische, katarrhalische Affektion des Seh- und Hörorgans, Asthma, Pleuritis, subinflammatorische Lungenleiden und Brustbeschwerden.

Günther. Arnheimer.

Man streicht es auf Leder so gross als möglich. Es hat sehr auflösende und zertheilende Wirkung. Man lässt es liegen bis es trocken wird und abfällt, 3—4 Wochen; bisweilen reizt es die Haut stark und bildet kleine Pusteln.

927. *Ry.* Calc. sulphurato-stibiat. $\mathfrak{z}\beta$.

Digere c. aquae ferv. $\mathfrak{g}\text{ij}$ per $\frac{1}{4}$ hor. Admisce
Picis liquid. $\mathfrak{z}\text{xv}$.

Super igne c. spath. lign. per 8 sexagesimas agitata requiescant in vase bene clauso; tunc fluidum decantetur et residuum in vase bene clauso servetur.

Linimentum Calcariae piceum.

Anwend. Um Krampf, Schmerz, eine tief liegende Entzündung, kurz irgend eine innere anomale Thätigkeit, nach vorausgeschickter passender Antiphlogose, durch Derivation auf die allgemeinen Bedeckungen abzuleiten. Bei Lähmungen aller Art, besonders des Rückenmarkes, wenn sie ihr Dasein einer skorischen Schärfe verdanken; bei lymphatischen Geschwülsten.

F. Calcaria viva; ätzender Kalk.

(*Calx usta s. viva s. pura s. caustica, Oxydum calcicum; gebrannter Kalk.*)

Form u. Gabe. Aeusserlich als Aetzmittel, zu Salben, Teigen.

928. *Ry.* Calcar. vivae

Sapon. domest. nigr. $\bar{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. f. pulv.

D. S. Zum äusserlichen Gebrauch.

Linimentum causticum Vogelii.

Anwend. Gegen Muttermaler. Mittelst eines gefensternten

Pflasters, um die benachbarten Theile zu schützen, zwölf Stunden lang anzuwenden. Pollau nimmt zwei Theile Seife und macht eine Paste davon. Plenck venet. Seife gleiche Theile.

Vogel.

929. *Ry.* Calcar. vivae aqua adpersa extinct. $\bar{3}j$

Natri carbon. dep. $\bar{3}ij$

Extr. opii aquos. gr. x

Adipis suill. $\bar{3}ij$.

M. f. ungt.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Hautjucken.

Bielt.

Aqua Calcariae s. Calcis vivae; Kalkwasser.

(Liquor s. Solutio Calcis.)

Form u. Gabe. Innerlich mit Milch und Molken, Fleischbrühe oder schleimigen Abkochungen, $\bar{3}ij$ —vj, täglich einigemal. Aeusserlich als Mund- u. Gurgelwasser, Pinselsaft, Einspritzung, Verbandwasser, Liniment, Salbe.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren und sauren Salzen, kohlensauren, schwefels., phosphors., weinsteins., boraxs. Salzen, salzs., bernsteins., essigs. Ammonium, Metalloxyden und Salzen, Seifen, Gerbestoff, Kleber, Stärkemehlaflösungen, Weingeist, alkaloidischen Vegetabilien, Harzen, ätherischen Oelen, Zucker, Luft, Hitze.

930. *Ry.* Lichen. island. $\bar{3}j$

Rad. colomb. $\bar{3}ij$.

Coq. c. aquae font. s. q. ad colat. $\bar{3}iij$. Adde

Aquae calcis. $\bar{3}j$

Extr. myrrhae

Syrup. papav. alb. $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$.

M. D. S. Viermal täglich 1 Esslöffel voll.

Anwend. In der Lungenschwindsucht.

Jahn.

931. *Ry.* Aquae calcar.

Lactis vaccin. $\overline{aa}$ $\overline{3}iv$.

M. D. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Gegen Brennen der Mundhöhle.

Heim.

932. *Ry.* Aquae calcar.

Syrup. simpl. $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$.

M. S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen Schwämmchen.

Wendt.

933. *Ry.* Aquae calcar. $\overline{3}viii$

Alcohol. $\overline{3}iv$.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei fistulösen, hartnäckigen Geschwüren.

Swediaur.

934. *Ry.* Aquae calcis viv. $\overline{3}j\beta$

Olei oliv. l. lini l. amygdal. dulc. $\overline{3}\beta$.

M. f. liniment.

S. Umgeschüttelt, mittelst Leinwand aufzuschlagen.

Linimentum Calcis Vogleri.

Anwend. Zur Austrocknung wunder Stellen, gegen juckende Hautausschläge, Verbrennungen.

Vogler.

935. *Ry.* Aquae calcar. viv.
 Olei papav. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.
M. f. liniment.

S. Zum Bestreichen oder Leinwand damit zu tränken und überzuschlagen.

Unguentum Calcis Hufelandi.

Anwend. In gleichen Fällen.

Hufeland.

Zuweilen setzt man (Horn u. A.) dieser Mischung Tinct. opii simpl. $\overline{3j}$ zu.

Calendula officinalis L.

Ringelblume.

(*To d t e n b l u m e.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, Abkochung, zu $\overline{3j}$ — $\overline{iiij}$; Extrakt, zu gr. x—xx, in Mixturen, Pulver, Pillen. Aeusserlich ausgepresster Saft, Abkochung, Salbe.

Man vermeide Verbindungen mit empfindlichen Metallsalzen; in flüssiger Form auch Eisenoxydsalze und Gerbestoff.

936. *Ry.* Flor. calendulae $\overline{3iiij}$.
 Coque c. aquae font. q. s. ad colat $\overline{3v}$.
 Syrup. cort. aurant. $\overline{3\beta}$.

M. S. Täglich 3mal 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen Krebs.

Westring.

937. *Ry.* Flor. calendulae
 Herb. calendulae
 „ conii macul. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.
 Inf. c. aquae comm. ferv. q. s. Digere per $\frac{1}{2}$ hor.
 vase clauso. Colatur. $\mathfrak{Lij}$ adde
 Solutionis ferri acet. $\overline{3\beta}$
 Aquae laurocerasi $\overline{3vj}$.
M. D. S. Mit Läppchen aufzulegen.
Anwend. Bei Krebsgeschwüren.

Rust.

938. *Ry.* Herb. et flor. calendulae rec. $\overline{3j}$ —i β .
 Coque cum
 Lact. vaccin. $\mathfrak{Lij}$ ad colat. $\overline{3xviij}$.
S. Täglich zu verbrauchen.
Anwend. Gegen Hautkrebs.

Stein.

Dabei äusserlich:

939. *Ry.* Butyr. recent. insuls. $\overline{3j}$
 Succ. rec. express. calendul. $\overline{3j}$ —i β .
 M. f. unguentum.
S. Täglich damit 3mal zu verbinden.

Stein.

940. *Ry.* Extr. calendulae
 „ conii macul.
 Ferri oxydat. carbon. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$
 Pulv. herb. et flor. calendulae $\overline{3j\beta}$.
 F. pilul. gr. ij Consp. lycop.
D. S. Täglich 3mal 5—6 Stück zu nehmen.
Anwend. Bei Krebs.

Rust.

Dabei folgende Salbe :

941. R_y. Extr. calendulae
 „ conii macul. āā 3iij
 Aquae laurocerasi 3ij
 Tinct. opii simpl. 3ß.

M. S. Mittelst Charpie auf die offenen Stellen zu legen.

Anwend. Gegen Krebsgeschwüre.

Rust.

Campechianum lignum.

Campecheholz.

(*Haematoxylon campechianum* L. Lignum brasilianum rubrum s. coeruleum; Blau-, Blutholz.)

Form u. Gabe. In Abkochung zu 3ij—vj auf 3vj—viij, Esslöffelweise. Extrakt in Lösung, Pillen, zu gr. v—x, aller 2 Stunden.

Man vermeide Verbindungen mit Metallsalzen, Säuren, Alaun, sauren Salzen.

942. R_y Ligni campechiani 3vj.
 Coque c. aquae font. 8j. Colat. 3viij adde
 Syrup. cinnamon. 3j.

M. D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen chronische Diarrhœe.

Vogel.

943. *Ry.* Ligni campechiani $\mathfrak{Zj}$.
 Coque c. aquae simpl. $\mathfrak{Lj}$ ad rem. $\mathfrak{Zviiij}$. Colat.
 refriger. adde
 Camphor. c. s. q. muc. gummi mimos. subact. $\mathfrak{Zj}$.
S. *Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.*

Anwend. Gegen faulige Ruhr, Diarrhöe ohne Leibschnelden
 nach Typhus, Faulfieber u. s. w.

Haase.

944. *Ry.* Cort. chinae reg. rud. tusi $\mathfrak{Z\beta}$.
 Inf. in s. aquae q. per $\frac{1}{4}$ hor.
 In colat. $\mathfrak{Ziij}$ solve
 Extr. ligni campechiani $\mathfrak{Zj}$
 Syrup. cinnamon. simpl.
 „ flor. aurant. $\overline{aa}$ $\mathfrak{Z\beta}$.

S. S. *Stündlich 1 Kinderlöffel voll.*

Anwend. Gegen hartnäckigen Durchfall der Kinder.

Wendt.

945. *Ry.* Extr. ligni campechiani $\mathfrak{Ziij}$
 Aquae cinnamon. vin. $\mathfrak{Zj\beta}$
 „ font. $\mathfrak{Zvij}$
 Tinct. catechu $\mathfrak{Zij}$.

S. S. *Aller 4 Stunden 1—2 Esslöffel.*

Anwend. Gegen atonische Blut- und Schleimflüsse, chronische
 Diarrhöen, septische Dysenterieen.

Pringle.

Camphora. Kampher.*(Laurus Camphora L.)*

Form u. Gabe. In *Pulver*, *Pillen*, *Bissen*, *Latt-
werge*, *spirit. Auflösungen*, *Emulsionen*, *Mixturen*, zu
gr. $\frac{1}{4}$ — v, einigemal täglich *Aeusserlich* als *Pulver*,
Mund- und Gurgelwasser, *Pinselsaft*, *Salbe*, *Liniment*,
Pflaster, *Klystier*, *Räucherung*, zu *Bädern*.

Man vermeide Verbindungen mit Salzbildern; für Kam-
pher-Auflösungen auch wässeriges Kali.

946. *Ry.* Camphorae trit. gr. ij
Sacchari albi gr. viij.
M. f. pulv. Dispensentur tales doses viij. D. in
charta cerata
S. *Aller 2 Stunden 1 Pulver.*

Marcus.

947. *Ry.* Tartari stibiati
Opium puri āā gr. j
Camphorae trit. gr. xxiv
Kali nitrici ʒij.
M. f. pulv. Div. in quatuor part. aequal. D. ad
chartam ceratam.
S. *Täglich 2—4 Pulver zu nehmen.*

Anwend. Bei rheumatischen Brustentzündungen, wenn durch
Blutentziehung die entzündlichen Symptome beseitigt sind.

Reil.

948. *Ry.* Camphorae
Sulphur. antim. aurat. āā gr. vj

Ammon. muriat.

Pulv. rad. liquirit. āā 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. ad chart. ceratam.

S. Aller 2–4 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Husten von Rheumatismus, auch bei katarrh. Husten reizloser, phlegmatischer Personen.

Jahn.

949. *Ry.* Flor. arnicae pulv.

Nitri antimoniat. per. inspiss. par. āā 3ß

Camphorae gr. v

Opii gr. ij.

M. f. pulvis.

S. Täglich einigemal einen kleinen Kaffeelöffel voll.

Selle's Brustpulver.

Anwend. Gegen Katarrhe, falsche Lungenentzündung, anfangende Schwindsucht mit entzündlichen Leiden in der Brust

Selle.

950. *Ry.* Sulphur. depur. 3ij

„ antimon. aurat.

Camphorae āā gr. viij

Sacchari albi 3ij.

M. f. pulvis.

S. Täglich 2–4mal eine Messerspitze voll.

Pulvis diaphoreticus Hufelandi.

Anwend. Gegen katarrhalische, rheumatische und gichtische Leiden.

Hufeland.

951. *Ry.* Opii puri gr. ß

Camphorae gr. ß–j–ij

Kali nitrici gr. v
 Sacchari albi gr. x.
 M. f. pulvis.

S. Vor Schlafengehen in Thee zu nehmen.

Pulvis diaphoreticus Graefii.

Anwend. In gleichen Fällen.

v. Gräfe.

952. *Rx.* Camphorae trit. gr. vj
 Sulphur. dep.
 Sacchari albi āā 3β.
 F. pulv. Div. in part. aequal vj.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Quecksilberkacherie.

v. Hildenbrand.

953. *Rx.* Nitri depur. 3β—j
 Sulphur. antimon. aurat.
 Camphorae trit. āā gr. jβ—iij
 Gumm. mimos.
 Sacchari albi āā 3j.
 M. f. pulvis Div. in vj part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Bei Lungenentzündung, wenn die heftige Entzündung gebrochen, oft schon am 3. oder 4. Tage, besonders wo eine rheumatische Grundlage vorhanden war; bei gastrischer Komplikation scheint es nicht zu passen. — Man kann diese Verbindung auch als Saft geben.

Thaer.

954. *Rx.* Opii puri
 Camphorae trit. āā gr. j

Pulv. rad. ipecacuanhae gr. ij

Sacchari albi gr. xij.

M. f. pulvis.

D. S. Mit warmem Fliederthee zu nehmen.

Anwend. Um die Hautthätigkeit zu befördern.

Richter.

955. *Ry.* Camphorae pulv. gr. xxiv

Moschi orient. gr. viij

Extr. opii gr. ij.

M. f. c. suff. q. Syrup. comm. pil vj. Consp. cinnamon.

S. Den Tag über zu verbrauchen.

Pilulae antisepticae Dupuytreni.

Anwend. Gegen Hospitalbrand.

Dupuytren.

956. *Ry.* Camphorae ʒij

Extr. opii aquos. gr. viij

Mucilag. q. s. ut f. pil. xvj. Consp. lycopod.

S. Jeden Abend 2—3 Stück.

Anwend. Gegen Erektionen und Reiz des Blasenhalses.

Ricord.

957. *Ry.* Camphorae gummi arab. subact. gr. ij

Pulv. flor. arnicae gr. x

Mellis q. s.

Fiat bolus. Disp. tal. iv.

S. Mit Wasser oder Wein (aller 4 Stunden) zu nehmen.

Anwend. Bei Lähmungen.

Schmidt.

958. *Ry.* Camphorae $\mathfrak{z}$ j
Aether. sulphurici $\mathfrak{z}$ j.

S. S. Aller 2—3 Stunden 16—20 Tropfen.

Anwend. Gegen Brand, besonders in Fällen, wo das Fieber einen typhösen, fauligen Charakter annimmt.

Wedemeyer.

959. *Ry.* Camphorae trit. $\mathfrak{z}$ j
Amygdal. dulc. excort.
Semin. papav. alb. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$
Aquaе rubi idaei $\mathfrak{z}\text{x}$.
Fiat l. a. emulsio. Colaturae $\overline{\text{ad}}$ misce
Kali nitrici $\mathfrak{z}$ ij
Syrup. amygdal. $\mathfrak{z}$ ij.

M. D. S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ Tasse voll zu nehmen.

Anwend. In katarrhalisch- rheumatisch- nervösen Fiebern.

Vogel.

960. *Ry.* Camphorae gr. vj
Gumm. mimos. $\mathfrak{z}$ j
Aquaе commun.
Acet. destill. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ iiij
Syrup. simpl. $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. l. a. emulsio.

S. Esslöffelweise.

Mixtura acetico-camphorata Schol. clin. Lips.

Anwend. Gegen Petechialtyphus.

Clarus.

961. *Ry.* Camphorae gr. iv
Amygdal. dulc. excort. $\mathfrak{z}\beta$
Aquaе font. $\mathfrak{z}$ vj.

F. l. a. emulsio, cui adde
Syrupi croci $\bar{\text{z}}\beta$.

S. *Stündlich einen Esslöffel.*

Anwend. Bei rheumatischen Diarrhöen.

962. Ry. Camphorae trit. gr. iv
Mucil. gumm. mimos.
Syrup. althaeae $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\beta$
„ flor. aurant. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Theelöffel.*

Anwend. In asthenischen Fiebern.

Wendt.

963. Ry. Camphorae gr. iij
Ammon. muriat. gr. v
Gummi mimos.
Aquaе petrosel. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ q. s.
ut f. emulsio. Dent. tal. dos. No. iv.

S. *Aller 2 Stunden 1 Portion.*

Anwend. Gegen paralytische Urinverhaltung.

Sommervail.

964. Ry. Camphor. pulv.
Extr. hyoscyam. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ gr. xxiv
Gummi mimos. $\bar{\text{z}}\beta$
Emuls. papav. concentr. $\bar{\text{z}}\text{vj}$
Liqu. ammon. succin. $\bar{\text{z}}\text{ij}$ — ij
Sacchari albi $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. S. *Stündlich 1 Theelöffel bis Esslöffel.*

Anwend. Gegen asiatische Cholera.

Zu Anfange der Krankheit in der vorerwähnten Menge nach der Individualität; bei ausgebildeter Krankheit, so lange noch nicht Magenlähmung eingetreten ist, $\frac{1}{2}$ —2 Esslöffel, so oft eine Ausleerung erfolgt, viertelstündig, ja selbst alle 5 Minuten, bis sich der Puls hebt, dann wieder selte-

ner. Das Bilsenkrautextrakt wird ausgesetzt, sobald die übermässige Reaktion des Magens sich gemässigt hat.

Leviseur.

965. *Ry.* Kali nitrici 3jß
Camphorae s. q. mucilag. gumm. mimos. sub-
act. gr. vj
Aquae sambuc. 3vj.

M. S. Aller 2—4 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Rose.

Jahn.

966. *Ry.* Flor. sambuci
„ chamomill.
Farin. fabar. āā 3j—ij
Camphor. trit. 3j—3ß.
F. pulv. grosse contus.

S. Zum Kräutersäckchen.

Anwend. Gegen atonische Entzündungen der Augen, der Haut, bei Rose.

967. *Ry.* Specier. aromaticar. pulv. 3ij
Camphor. ras. 3j.
M. f. pulvis.

S. Zum Kräutersäckchen.

Anwend. In gleichen Fällen.

968. *Ry.* Camphorae
Myrrhae āā 3ij
Cort. peruv. fusc.
Flor. chamom. vulg. āā 3ß
Pulv. carbon. 3j.
M. f. pulv. subtiliss.

S. Zum Einstreuen.

Anwend. Beim feuchten Brande.

Rust.

969. *Ry.* Camphor. trit.
 Kali nitrici $\overline{\text{aa}}$ $\overline{3j}$
 Myrrhae elect. $\overline{3ij}$
 Cort. salic. pulv. $\overline{3j}$.
 M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Streupulver.

Anwend. Gegen brandige Wunden und Geschwüre.

G. A. Richter.

970. *Ry.* Camphorae $\overline{3j}$
 Olei cajeput. $\overline{3ij}$
 „ amygdal. dulc. $\overline{3\beta}$.

D. S. In die Ohren zu tröpfeln.

Anwend. Bei torpider Harthörigkeit.

Vogt.

971. *Ry.* Aether. sulphurici $\overline{3ij}$
 Camphorae gr. x
 Olei caryophyll. gutt. vj.

S. S. Leinwand damit befeuchtet über die Augen zu legen.

Anwend. Gegen Blattern auf den Augen; sobald beim Ausbruche der Blattern die Augen schmerzen oder sich schon rothe Pünktchen auf der Bindehaut oder dunkle Stellen auf der Hornhaut zeigen.

Neumann.

972. *Ry.* Camphorae $\overline{3ij}$
 Gummi mimosae $\overline{3ij}$
 Vini gall. alb. $\overline{3viiij}$.

S. S. Zum Befeuchten der Kompressen.

Kampherwein der Engländer.

Anwend. Gegen Sphacelus; überhaupt bei faulig-brandigen Geschwüren.

Kluge.

973. *Ry.* Camphorae 3j
Olei terebinth. 3ß.

S. S. Früh und Abends einzureiben.

Anwend. Gegen Ueberbeine.

974. *Ry.* Camphorae 3ß
Olei terebinth.
Liqu. ammon. caust. āā 3ß.
M. f. liniment.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Darmgeschwüre im zweiten Zeitraume synochischer Abdominalnervenfieber.

Berndt.

975. *Ry.* Camphorae 3j
Olei amygdal. dulc. 3j.

S. S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen Mundgeschwüre beim Speichelflusse während der Einreibungskur.

P. Frank. Rust.

976. *Ry.* Camphorae trit. gr. vj
Gummi mimos. 3j
Olei amygdal. dulc.
Syrup. althaeae āā 3vj
Tinct. opii simpl. 3ß.

M. D. S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen Merkurialgeschwüre in der Mundhöhle.

Berends.

977. *Ry.* Camphorae gr. vj
Gummi mimos. q. s.

Extr. cort. peruv. $\mathfrak{Z}$ ijj
 Aquae salviae $\mathfrak{Z}$ viiij.

M. S. Zu Einspritzungen.

Anwend. Gegen brandige Halsentzündung.

978. *Ry.* Camphorae $\mathfrak{Z}\beta$ —j.

Tere in mort. vitr. c. vitell. ovi j. Adde sensim
 Decoct. sem. lini $\mathfrak{L}$ j.

S. Zum Klystier.

Anwend. Bei Nervenfiebern und manchen Neuralgieen.

Foy.

979. *Ry.* Camphorae gr. x

Vitell. ovi j

Extr. opii aquos. gr. j.

Aquae $\mathfrak{Z}$ vj.

M. f. emulsio.

S. Klystier.

Anwend. Gegen Erektionen, wenn die Pillen No. 956 nicht helfen.

Ricord.

980. *Ry.* Cerae flavae

Axungiae

Sevi taurin. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}$ j.

Liquefact. adde

Olei lauri $\mathfrak{Z}$ j

Camphor. in alcohol. $\mathfrak{Z}\beta$ sol. $\mathfrak{Z}$ ij.

M. S. Zwei bis drei Drachmen auf nicht schwärende Stellen einzureiben.

Plenk's Frostsalbe.

Anwend. Gegen Erfrierungen.

Plenk.

981. *Ry.* Axung. porc. l. avium
 Olei amygdal. dulc. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Cerae flavae $\bar{3}\beta$.
 Liquefactis et semirefrigeratis adde
 Olei lavendul. $\bar{3}\text{ij}$
 Ammonii $\bar{3}\text{ij}$
 Camphorae in Tinct. sem. sinap. $\bar{3}\text{ij}$. solut. $\bar{3}\text{j}$.
 M. f. l. a. liniment.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Frostbeulen.

Selbst die stärksten, jedoch nicht schwieligen Frostbeulen sollen dem 3mal vor einem lebhaften Feuer mit diesem Liniment wiederholten Einreiben weichen.

Legrin.

982. *Ry.* Aether. sulphur. $\bar{3}\beta$
 Camphorae
 Olei nucis moschat. express. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{j}$.
 M. f. liniment.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei Lähmung des Rückenmarkes.

983. *Ry.* Sapon. domest. puriss. rasi $\bar{3}\text{xvj}$.
 Coque cum aquae $\bar{3}\text{viiij}$ in vas. terr. vitreat. leni igne ad consist. pult. Adde
 Olei olivar. provinc. $\bar{3}\text{v}$.
 Coque eodem igne sub cont. agitat. ad consist. pultis ten. Massae ab igne remot. et semirefrigerat. admisce
 Camphorae in ol. oliv. $\bar{3}\text{j}$ sol. $\bar{3}\text{j}$.
 Miscelam per aliquot momenta agitatam effunde in formam.

Wetzler's Kampherseife.

Nach W. Angabe giebt es kein Mittel, das so sehr

geeignet wäre, die krankhaft erhöhte Empfindlichkeit der Haut zu heben und das Hautleben zu kräftigen, als mit dieser Seife gemachte lauwarme Waschungen bei stufenweiser Verminderung ihres Wärmegrades.

984. *Ry.* Camphorae $\mathfrak{z}\beta$
 Sapon. domestic $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Ungt. cinerei $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Drüsengeschwülste.

Schreger.

985. *Ry.* Camphorae trit. $\mathfrak{z}\beta$
 Tinct. opii crocat. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Ungt. rorismar. comp. $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei Cholera der Kinder.

Gölis.

986. *Ry.* Emplastr. de galbano croc. $\mathfrak{z}\beta$
 Camphorae elect.
 Petrolei
 Ammon. volat. cryst. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. emplastr.

S. Auf die gelähmten Stellen zu legen.

Anwend. Gegen Lähmungen,

Rademacher.

987. *Ry.* Picis albae $\mathfrak{z}\beta$
 Camphorae $\mathfrak{z}\text{j}$

Opii puri ʒß

Petrolei q. s. ut f. emplastr.

S. Auf Leder zu streichen und die krankhafte Stelle damit zu bedecken.

Anwend. Gegen festsitzenden Rheumatismus.

G. A. Richter.

988. *Ry.* Emplastr. lithargyr. simpl. ʒß.

Leni calore liquefact. admisce

Opii pulv. gr. xv

Camphorae c. Bals. peruvian. ʒj trit. ʒß.

F. emplastr.

D. S. Auf Leder zu streichen.

Anwend. Gegen Frostbeulen zweiten Grades.

Rust.

Spiritus vini camphoratus; Kampher-spiritus.

989. *Ry.* Spirit. vini camphor.

„ juniper. āā ʒj

Aceti scillit. ʒß.

M. S. Lauwarm mit Lämpchen aufzulegen.

Anwend. Gegen Kopfgeschwulst Neugeborener.

Becker.

990. *Ry.* Spirit. vini camphor. ʒij

Aceti ʒvj

Infus. specier. aromat. ex ʒiij par. ℥iij.

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Bei sehr asthenischen und faulen Fiebern.

Berends.

991. Rx. Spirit. vini camphor.
 „ „ sapon. āā ̄ijj.

M. S. Zwei- bis dreimal das Gelenk zu waschen.

Anwend. Nach Luxationen und Subluxationen anzuwenden.

Vogt.

Cannabis semina. Hanfsamen.

(*Cannabis sativa* L.)

Form u. Gabe. In Emulsion, Aufguss oder Ebullition, ̄j auf ̄viij, esslöffelweise stündlich.

992. Rx. Semin. cannab. cont.
 Amygdal. dulc. excort. et. cont. āā ̄j.
 Terendo sensim misce cum
 Aquae comm. ̄ij, ut f. emulsio.
 In colat. solve
 Pastae gummos. ̄β.

D. S. Umgeschüttelt, stündlich 1/2 Tasse.

Anwend. Bei Entzündung der Schleimhäute, besonders der Harnröhre und Blase, bei Tripper.

Richter.

993. Rx. Semin. cannab. ̄ijj—vj
 Amygdal. amar. No. iv.
 Contunde et tere c. aquae font. ̄ij.
 F. emulsio, cui adde
 Syrup. papav. albi ̄ij.

S. Den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. In gleichen Fällen.

994. *Rx.* Semin. cannab. $\bar{z}$ iiij
 Rad. althaeae $\bar{z}$ j
 Fol. malvae $\bar{z}$ iv.

Conc. cont. M. S. Einen Esslöffel voll mit 4—6 Tassen Wasser zu kochen und täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen entzündlichen Tripper.

Tode.

995. *Rx.* Semin. cannab.
 Rad. althaeae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}$ ij
 „ liquirit.
 Semin. foenicul. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}$ β.
 C. C. M. f. Species.

D. S. Zum Thee. Zwei gehäufte Esslöffel mit 4 Tassen Wasser zu kochen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Hufeland.

996. *Rx.* Semin. cannab. sativ. $\bar{z}$ vj
 Gummi arabici $\bar{z}$ j
 Aquae petrosel. $\bar{z}$ v.
 F. l. a. emulsio, cui colatae adde
 Syrup. balsam. peruvian. $\bar{z}$ j.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Schleimflüsse.

Choulant.

Cantharides. Spanische Fliegen.*(Lytta vesicatoria. F., Meloë vesicatorius L.)*

Form u. Gabe. In Pulver (mit Vorsicht), Pillen, Bissen, Emulsion, zu gr. $\frac{1}{4}$ —1—2, täglich 2—3mal. Tinktur zu 5—20 Tropfen, einigemal täglich. Aeusserlich als Pulver, in Salben, Pflastern; die Tinktur zu Einreibungen, Waschungen, Einspritzungen, Linimenten.

Man vermeide Verbindungen mit Salpetersäure, Salzsäure.

997. Rx. Pulv. cantharid. gr. xij

Lapid. cancror.

Sacchari albi āā ʒjβ.

M. f. pulv. subtiliss. Div. in part. aequal xij.

D. S. Täglich 2—3 Pulver mit Haferschleim zu nehmen.

Anwend. Zur Verhütung der Wasserscheu.

Rust.

998. Rx. Cantharid. pulv. ʒβ—j

Amygdal. dulc. excort. ʒj

Aquae calid. ʒx

Sacchari albi ʒβ.

M. f. emulsio.

S. Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Hufeland.

999. *Ry.* Cantharid. siccat. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Amygdal. dulc. excort. $\mathfrak{z}\text{vj}$
 Aquae calcis $\mathfrak{z}\text{x}$
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Dig. Cola sine express.

S. *Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen pituitöse Neuralgie und Verschleimung der Harnwerkzeuge.

Berends.

1000. *Ry.* Cantharid. gross. pulv. gr. j
 Sacchari albi
 Gummi mimos. pulv. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Conterantur exactissime, sensim addendo
 Emuls. amygdal. $\mathfrak{z}\text{v}$.

M. D. S. *Umgeschüttelt, $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel.*

Anwend. Im zweiten Stadium des Keuchhustens.

Wendt.

1001. *Ry.* Pulv. cantharid. gr. j
 Camphorae gr. vj
 Hydrargyr. muriat. mit. gr. $\text{j}\beta$
 Mucilag. gummi mimos. q. s.
 F. pil. vj . Consp. lycop.

S. *Auf einmal zu nehmen.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Werlhof.

1002. *Ry.* Tartari boraxat. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Solve in
 Aquae petroselin. $\mathfrak{z}\text{viiij}$.

Adde

Tinct. cantharid. $\bar{3}j$

Syrup. althaeae $\bar{3}j$.

M. D. S. Umgeschüttelt, stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei mit Nierentorpor verbundener Wassersucht.

König. Plieninger.

1003. *Rx.* Cantharid. subtiliss. pulv. gr. j—iij

Camphor. trit. gr. iij—vj

Sapon. medic. $\bar{3}\beta$.

M. f. pil. xij. Consp. pulv. cinnam.

S. Täglich 3 mal 1—3 Stück.

Anwend. Gegen paralytische Enuresis der Wöchnerinnen.

v. Siebold d. V. — Kraus.

1004. *Rx.* Pulv. cantharid. subt. pulv. $\bar{3}j$

Ferri pulverati $\bar{3}ij$

Succ. liquirit. $\bar{3}j$.

M. f. pil. gr. j. Consp. lycop.

S. Täglich 4mal 3—4 Stück und allmählig zu steigen.

Anwend. Gegen paralytische Enuresis, besonders bei Wöchnerinnen und alten Leuten.

Ludw. Meissner.

1005. *Rx.* Pulv. cantharid. $\bar{3}ij$

Adipis suill. $\bar{3}iv$

Hydrargyr. muriat. corr.

Tart. stibiat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

M. exactiss.

S. Salbe.

Anwend. Zur Erzeugung künstlicher Geschwüre.

Rust.

1006. *Rx.* Pulv. cantharid. 3ß

Adipis suill. 3ß.

M. f. ungt.

S. Täglich einer Erbse gross einzureiben.

Unguentum epispasticum Hufelandi.

Anwend. Bei Kindern und in chronischen Uebeln ein sehr brauchbares Mittel.

Hufeland.

1007. *Rx.* Unguent. digestivi 3ß

Pulv. cantharid.

Hydrargyr. oxydat. rubr. aa 3j.

M. f. unguent.

S. Zum Verband.

Anwend. Auf kauterisirte Wunden nach dem Bisse toller Thiere.

1008. *Rx.* Tinct. cantharid. 3j

„ cort. aurant. 3jß

Elix. paregoric. 3ß.

M. S. Täglich 3—4 mal so viel, bis Brennen in der Harnröhre folgt.

Anwend. Gegen Keuchhusten mit intermittirendem Typus, wenn der akute Zeitraum vorüber ist.

Suttcliff.

1009. *Rx.* Farin. sem. lini 3j

Rad. liquirit. conc. 3j.

Coque c. aquae font. q. s. per 1/4 hor. Colat. 3iv
adde

Tinct. cantharid. gutt. x—xx.

S. Aller 3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Schلاffheit und Lähmung der Blase.

1010. *Ry.* Tinct. cantharid.

Spirit. serpyll. āā ʒiij.

M. S. In die äussere Fläche der Augenlider und Augenbraunen einzureiben.

Anwend. Gegen Ptosis palpebrae, Amaurose.

A. G. Richter.

1011. *Ry.* Tinct. cantharid. ʒj

Spirit. roris mar. l. serpyll. l. menth. ʒj.

M. S. Wie das vorige.

Anwend. Zur Erregung der Nerventhätigkeit des Auges, bei Lähmungen, Amblyopie, besonders gegen Schwäche und Lähmung der Muskeln.

1012. *Ry.* Tinct. cantharid. ʒij—ʒj

Aquae font. ʒvj.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei Fistelgängen, die man in Entzündung versetzen will.

Vogt.

1013. *Ry.* Tinct. cantharid. ʒj

Unguent. saponis ʒvj.

M. f. ungt.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen torpide Frostballen.

Wardrop.

1014. *Ry.* Tinct. cantharid. ʒij

Spirit. formicar.

„ vini camphor. āā ʒiij.

M. D. S. Täglich 2mal erwärmt einzureiben.

Anwend. Bei atonischen Rheumatismen, Lähmungen u. s. w.

Vogt.

1015. R_y. Medull. bovis ʒj.

Liquat., colat. et semirefrig. admisce

Tinct cantharid.

Succi citri rec. express. et col. āā ʒß

Extr. chinae fusc. ʒj

Olei cort. citri ʒß

„ bergamott. gutt. vj.

M. S. Pomade. Täglich früh eine starke Messerspitze voll auf den Kopf einzureiben, nachdem derselbe vorher mit Seifenwasser, dem man einige Theelöffel Eau de Cologne zugesetzt hat, rein abgewaschen und abgetrocknet worden ist.

Anwend. Gegen Kahlheit.

Schneider.

1016. R_y Cantharid. pulv. ʒvj

Cerae flavae ʒix

Resin. albae

Terebinth. comm. āā ʒivß.

M. exactiss. f. emplastr.

S. Auf Leder zu streichen.

Dieses Pflaster lässt sich leichter streichen, klebt besser und schimmelt nicht so leicht, als dasjenige, was Baumöl enthält.

Martius.

Capsici annui fructus. Spanischer-Pfeffer.

(*Piper hispanicum* s. *indicum*. Von *Capsicum annum* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. ij—x, täglich 3mal; Aufguss gr. iij—vj auf ʒiij, esslöffelweise; Tinktur 10—15 Tropfen in Schleim, 2—3mal täglich; Extrakt in Lösung, Pillen, Bissen, gr. iij—vj, 3mal täglich.

1017. *Rx.* Camphorae ʒj
 Bacc. capsici annui gr. viij
 Resin. guajaci nativ. ʒj.
 Pulv. cantharid. exact. paux. vitell. ovi sub act.
 ope long. triturat. gr. v.
 M. f. c. Tinct. colocinth. q. s. pil. LXXX
 Consp. lycop.

S. Täglich zweimal 1, dann 2—3—4 Stück mit Hafergrütze zu nehmen.

Anwend. Gegen Unterleibslähmung, welche die Blase, den Mastdarm und die Beine befällt.

Sundelin.

1018. *Rx.* Capsici pulv. ʒj
 Hydrargyr. muriat. mit. gr. x
 Semin. stramon. pulv. ʒij
 Mucilag. gumm. mimos q. s.
 F. pil. LX. Consp. lycop.

S. Aller 4 Stunden 1 Pille.

Anwend. Gegen Gesichtsschmerz.

Peacock.

1019. *Rx.* Extr. capsici annui
 „ absinth. āā ʒj
 Aquae menthae crisp. ʒvj
 Tinct. rhei aquos. ʒj.

S. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

v. Hildenbrand.

1020. *Rx.* Extr. capsici annui
 „ centaur. minor. āā ʒß

Aquae melissae $\mathfrak{Z}\text{vj}$
 Spirit. sulphur. aether. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

S. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

v. Hildenbrand.

1021. *Ry.* Tinct. capsici annui $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Spirit. camphor. $\mathfrak{Z}\text{vj}$
 Liqu. ammon. anisat. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. D. S. Täglich dreimal 15—60 Tropfen.

Anwend. Gegen torpide Lähmungen.

Sundelin.

1022. *Ry.* Pulv. capsici annui $\mathfrak{Z}\beta\text{—j}$
 Natri muriat. $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Aceti $\mathfrak{Z}\beta$
 Aquae ferv. $\mathfrak{Z}\text{vj}$.

Col. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei bösartigen und atonischen Halsentzündungen.

Thomson.

1023. *Ry.* Tinct. capsici $\mathfrak{Z}\beta$
 Aquae rosar. $\mathfrak{Z}\text{viiij}$
 Syrup. sacchari $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Bei chronischer Bräune.

Engl. Hosp.

1024. *Ry.* Spirit. armoraciae $\mathfrak{Z}\beta$
 Infus. armoraciae $\mathfrak{Z}\text{v}$
 Tinct. capsici annui $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen katarrhalische Taubheit.

Fosbroke.

1025. *Rx.* Cupri sulphur. gr. vj
Tinct. capsici annui $\text{℥}\beta$
Aquae rosar. $\text{℥v}\beta$

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. In gleichen Fällen.

Fosbroke.

1026. *Rx.* Pulv. capsici ℥iij
Rad. zingiber.
„ armorac. $\overline{\text{aa}}$ ℥ij
Sacchari albi ℥j
Conserv. rosar. ℥j .
M. f. trochisci ix.

S. Zum Kauen.

Anwend. Gegen katarrhalische Taubheit.

Fosbroke.

Carbo animalis. Thierische Kohle.

(Carbo carnis, Caro vitulina tosta.)

Form u. Gabe. *Pulver, Lattwerge, Bissen, zu gr. j—x—xx, täglich 2—4 mal. Aeusserlich zum Aufstreuen, als Salbe.*

1027. *Rx.* Carbon. animalis gr. iv
Sacchari albi ℥j .
M. f. pulvis.

S. Früh und Abends einer Erbse gross zu nehmen.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Weisse.

1028. *Ry.* Carbon. animalis
Rad. liquirit. āā 3vj.
M. f. pulvis.

S. Täglich 1/2—1 Kaffeelöffel voll.

Anwend. Gegen Rhachitis, Skrofeln, Flechten, auch skrofulöse Augenentzündung nach Schindler, der sie zu diesem Zwecke mit Zucker versetzte, in einigen Fällen nützlich gefunden.

Radius.

1029. *Ry.* Carbon. carnis pulv. gr. iij
Ammon. muriat. dep. pulv. ʒj
Extr. conii macul. gr. ij
„ liquirit. q. s. ut f. bolus.
Consp. D. in vitro. Disp. tal. viij.

D. S. Täglich 3mal ein Stück.

Anwend. Bei Anschwellung und Skirrhusität der Prostata und der Schleimhaut der Harnröhre.

Magendie.

- Ry.* Carbon. animalis ʒj
Ferri subcarbon.
Sacchari albi āā ʒij.
M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

D. S. Täglich 3—4mal ein Stück in allmählig steigenden Gaben.

Anwend. Bei angehender Hypertrophie der Ovarien und des Uterus einigemal von Nutzen.

Clarus.

1031. *Ry.* Carbon. animal. pulv. ʒβ
Ungt. althaeae l. digital. 3vj.
M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Drüsengeschwülste, Drüsenverschwürungen.

Radius.

Carbo vegetabilis (Tiliae). Holzkohle, Lindenholzkohle.

(*Carbo ligni s. praeparatus s. purus; vegetabilische, präparirte Kohle.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, Bissen, Pillen, Plätzchen, Morsellen, zu gr. x—xxx, täglich mehrmals. Aeusserlich als Pulver, Salbe, Umschlag.

1032. R_y. Carbon. ppt. $\bar{3}$ vj
Ligni quassiae
Magnesiae carbon. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j.
M. f. pulv. D. in vitro.
S. Täglich 2—3mal einen Theelöffel.
Anwend. Gegen Pyrosis.

Heim.

1033. R_y. Pulv. carbon. tiliae $\bar{3}$ j
Syrup. cort. aurant. $\bar{3}$ ij.
M. f. electuar.
S. Aller 2 Stunden 1—2 Theelöffel.
Anwend. Gegen fauliges Aufstossen, Säure u. s. w.

Schubarth.

1034. R_y. Carbon. vegetab.
Natri carbon. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j
Electuar. e senna $\bar{3}$ ij.
M. f. electuar.
D. S. Täglich 3—4mal einen Theelöffel.
Anwend. Gegen hartnäckige Verstopfung.

Mitchill.

1035. *Rx.* Semin. cacao tost. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

In mort. ferr. calido in massam subtiliss. redige.

Adde

Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{j}\beta$

Carbon. ppt. $\mathfrak{z}\beta$

Bals. peruvian. $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. morsuli pond. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

D. S. Mehrmals täglich ein Täfelchen langsam zu verzehren.

Anwend. Im kolliquativen Stadium der Lungenschwindsucht, wenn sich Aphthen bilden.

Schönlein.

1036. *Rx.* Chocolat. pulv. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$

Carbon. veget. loti et subt. pulv. $\mathfrak{z}\beta$

Vanillae $\mathfrak{z}\beta$

Mucilag. gumm. tragacanth. q. s.

F. l a. pastill. gr. xvij.

S. Täglich 6—8 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen übelriechenden Athem.

Chevalier.

1037. *Rx.* Pulv. carbon. vegetab.

Kali sulphurat. āā $\mathfrak{z}\text{j}\beta$

Extr. hyoscyam. nigr.

„ myrrhae aquos. āā $\mathfrak{z}\beta$

„ marrub. l. trifol. fibr. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Aller 2—3 Stunden 5—6 Stück.

Anwend. Bei stinkendem, jauchigem Auswurf in der Lungenschwindsucht. Bei grosser Reizung der Lungen werden die bittern, wohl auch die balsamischen Mittel weggelassen. Nach den Pillen eine Tasse warme Milch.

Ebers.

1038. *Ry.* Carbon. tiliae $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 Aloes succotr.
 Myrrhae $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$.
 M. f. pulvis.

S. Täglich 1—2mal aufzustreuen. Vor dem Einstreuen mit lauem Wasser abzuwaschen.

Anwend. Bei stinkenden, reizlosen Geschwüren.

Vogt.

1039. *Ry.* Resin. s. colophon. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Gummi arabic. $\mathfrak{z}\beta$
 Carbon. ppt. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Zum Aufstreuen.

Pulvis haemostaticus Bonafoux.

Anwend. Gegen gefährliche traumatische Blutungen.

Bonafoux.

1040. *Ry.* Carbon tiliae
 Cort. peruv. alcohol. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.
 M. f. pulvis.

S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Gegen Brand.

1041. *Ry.* Carbon. vegetab.
 Cort. chinae $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{vj}$
 „ salicis
 Rad. calami arom. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. pulvis.

S. Mit rothem Wein zu einem Brei zu machen und lau aufzulegen.

Anwend. Gegen Brand, namentlich der Vorhaut und des Penis

1042. *Ry.* Camphorae ʒjß
 Carbon. pulv.
 Cort. peruv. pulv. āā ʒj
 Olei terebinth. rectific. q. s.
 F. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Auf brandige, durchgelegene Stellen.

Berends.

1043. *Ry.* Camphor. c. vitell. ovor. subact. ʒj
 Cort. peruviani
 Carbon. tiliae pulv. āā ʒj
 Vini rubri q. s.
 F. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Auf brandige Stellen.

Berends.

1044. *Ry.* Pulv. carbon. praep. ʒij
 Aquae fontan. ʒvj.

M. S. Zum Ausspülen des Mundes.

Anwend. Gegen sehr übelriechende Mundsäule.

v. Hildenbrand.

1045. *Ry.* Pulv. carbon. tiliae l. pan. secal. ʒiij
 „ cort. peruvian.
 Tart. depur. āā ʒjß
 Olei caryophyllor. gutt. viij.
 M. f. pulvis.

S. Zahnpulver.

Radius.

1046. Ry. Pulv. carbon. tiliae
 „ ligni santal. rubri
 „ cort. aurant.
 „ „ peruvian.
 Tart. depur. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Olei bergamott. gutt. xx.
 M. f. pulvis.

S. Zahnpulver.

Schubarth.

1047. Ry. Carbon. praep. $\overline{3j}$
 Cort. chinae fusc. $\overline{3\beta}$
 Myrrhae $\overline{3ij}$.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Zahnpulver.

Ph. Slesv.

1048. Ry. Pulv. carb. tiliae subt.
 „ rad. irid. flor.
 „ cort. peruv. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Tinct. myrrh. spirit. $\overline{3\beta}$
 Mellis opt. despum. q. s.
 F. electuar.

S. Zahnlattwerge.

L. W. Sachs.

1049. Ry. Unguent. styrac.
 Carbon. tiliae alcohol. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Camphorae
 Myrrhae $\overline{aa}$ $\overline{3j}$ — $\overline{ij}$
 Olei terebinth. q. s.
 F. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen schwammige, eine üble Jauche aussondernde Geschwüre.

Rust.

390 CARBO VEGETABILIS. CARBONEUM SULPHURATUM.

1050. *Ry.* Pulv. carbon. tiliae
Natri carbon. sicc. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
Unguent. rosat. $\bar{3}j$.
M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Kopfgrind.

Man lässt Abends die kahlgeschorene Stelle einreiben und darauf den Kopf mit einer Nachthaube oder einem Tuche bedecken, und am folgenden Morgen mit einer concentrirten Auflösung von schwarzer Seife rein waschen. Nebenbei wird aller 8 Tage eine Purganz aus Calomel und Jalappe gereicht.

Casper.

1051. *Ry.* Pulv. carbon. tiliae $\bar{3}iij$
Adipis $\bar{3}j$.
M. f. unguent.

S, Salbe.

Anwend. Gegen Kopfgrind.

Alibert.

1052. *Ry.* Carbon. tiliae $\bar{3}\beta$
Adipis suill. $\bar{3}j$
Bals. peruviani
Tinct. myrrhae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.
M. f. unguentum.

S. Reizende Kohlensalbe.

Vogt.

Carboneum sulphuratum.

Schwefelalkohol.

(*Alcohol Sulphuris, Bisulphuretum Carbonii;*
Schwefelkohlenstoff.)

Form u. Gabe. In Tropfen, Mixturen, zu 1—5 Tropfen, 2—3mal täglich. Aeusserlich als Waschmittel, Liniment, zu 4—20 Tropfen, einigemal täglich.

1053. *Rx.* Carbonei sulphurat. $\mathfrak{z}\text{j}$
Lactis vaccin. $\mathfrak{z}\text{vj}$
Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Täglich 4mal 1 Esslöffel und öfterer.

Anwend. Bei Hypertrophie der Magenhäute und Verengung der Speiseröhre oft bewährt.

Clarus.

1054. *Rx.* Carbonei sulphurat. $\mathfrak{z}\text{ij}$
Aether. sulphuric. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. ad vitrum bene clausum.

S. Tropfenweise auf Zucker zu geben.

Anwend. Bei rheumatischen und gichtischen Beschwerden.

Lampadius.

1055. *Rx.* Carbonei sulphurat. $\mathfrak{z}\text{j}$
Spirit. vini rectificatiss. $\mathfrak{z}\text{ij}$ — $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Täglich 3mal 5—10—15 Tropfen.

Anwend. Gegen solche Rheumatismen, die nicht von Fieber, oder doch nur von sehr geringem begleitet sind.

Wutzer.

1056. *Rx.* Carbonei sulphurat. $\mathfrak{z}\text{ij}$
Spirt. vini camphorat. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Früh und Abends einzureiben.

Anwend. Gegen chronischen Rheumatismus.

1057. *Rx.* Carbonei sulphurat. $\mathfrak{z}\text{ij}$
Olei olivar. l. Liniment. ammoniat. camphor. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. Wie das vorige.

Anwend. Im gleichen Falle.

Cardui benedicti herba. Cardo-
benediktenkraut.

(*Centaurea benedicta* L.)

Form u. Gabe. In Pulver (selten) zu $\mathfrak{zj} - \mathfrak{ij}$, im Aufguss zu $\mathfrak{3\beta} - \mathfrak{j}$ auf $\mathfrak{3j}$, esslöffelweise; Extrakt, zu gr. v — xx, 3 — 4mal täglich. Aeusserlich zu Bähungen und Klystieren.

Man vermeide Verbindungen mit Salzbildern, Alaun, salpetersaurem Silber und Quecksilber, Sublimat, salzs. Golde, essigs. Blei, in flüss. Form auch Eisenoxydsalze.

1058. *Ry.* Herb. cardui bened. $\mathfrak{3\beta}$
Rad. ari $\mathfrak{3ij}$
Semin. anisi
„ foenicul. $\overline{\mathfrak{aa}}$ $\mathfrak{3j}$
Flor. sulphur. $\mathfrak{3\beta}$.
M. f. pulvis.

D. S. Kaffeelöffelweise.

Pulvis pectoralis Vogleri.

Anwend. Gegen Husten mit Auswurf.

Vogler.

1059. *Ry.* Herb. cardui bened.
„ taraxaci $\overline{\mathfrak{aa}}$ $\mathfrak{3j}$
Rad. taraxaci
„ valerian. min. $\overline{\mathfrak{aa}}$ $\mathfrak{3j\beta}$.
Conc. M. f. species.

D. S. Täglich 1—2mal den 6. Theil nebst einem Esslöffel voll Waizenkleie mit $2\frac{1}{2}$ Tassen Was-

ser leicht aufgewallt und durchgeseiht zum Klystier.

Anwend. Visceralklystier.

Phöbus.

1060. *Ry.* Extr. cardui bened. $\bar{3}j$
 „ dulcamar. $\bar{3}j$
 Aquae foenicul. $\bar{3}j$
 „ laurocerasi $\bar{3}j$.

M. S. Täglich 4mal 60 Tropfen.

Elixir anticatarrhale Hufelandi.

Anwend. Gegen nicht mehr ganz neue Katarrhe.

Hufeland.

1061. *Ry.* Extr. cardui bened. $\bar{3}ij$ —iv
 Liqu. ammon. acet. $\bar{3}\beta$
 Aquae foenicul. $\bar{3}v$.

Solve S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei chronischem Katarrh.

Berends.

1062. *Ry.* Extr. cardui bened. $\bar{3}j$ —ij
 „ hyoscyam. gr. viij—xij
 Aquae foenicul. $\bar{3}j$
 Spirit. sal. ammon. anis. l. salis dulc.
 Syrup. liquirit. l. senegae $\bar{3}j$.

M. S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ —2 Theelöffel (nach dem Alter).

Anwend. Gegen chronischen Katarrh der Brustorgane.

Töpken.

Caricis arenariae radix. Sandried-
graswurzel.

(*Sandsegge, deutsche Sarsaparille. Von Carex
arenaria L.*)

Form u. Gabe. In Abkochung zu $\mathfrak{zj}$ — $j\beta$ auf $\mathfrak{Lj}$
täglich.

1063. R γ . Rad. caricis arenar. $\mathfrak{z}\beta$
„ liquirit. $\mathfrak{z}\beta$
Cort. ulmi $\mathfrak{z}ij$.
Coque ex aquae font. $\mathfrak{L}ii\beta$ ad colat. $\mathfrak{L}ii$.
Adde
Salis thermar. carolin. $\mathfrak{z}j$
Natri carbon. dep. $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Flechten.

Heim.

1064. R γ . Radic. caricis arenar.
Stipit. dulcamar. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}j$
Rad. liquirit. $\mathfrak{z}ij$.
Conc. M. f. species.

D. S. Den 6. Theil mit einem Quart Wasser bis
auf $\frac{2}{3}$ einzukochen.

Anwend. Gegen chronischen Hautausschlag.

Schubarth.

1065. R γ . Cort. mezerei conc. $\mathfrak{z}j$
Caul. dulcamar. conc.

Ligni guajaci conc.

„ sassafras conc. āā ʒij

Rad. caricis arenar. conc. ʒvj.

Digere c. xxxviii ʒ aquae font.

Tunc adjice

Antimon. crudi gross. pulv. in sacc. ligat. ʒiv.

Coque ad reman. ʒ xvj.

Sub finem coction. adde

Fol. senn. conc. ʒij

Semin. anisi vulg. cont.

Rad. liquirit. conc. āā ʒj.

Refrig. cola.

S. Auf Weinflaschen zu füllen.

Anwend. Statt des theuren Decoct. Zittmanni in der chirurg. Poliklinik zu Leipzig gegen veraltete herpetische und syphilitische Leiden angewendet von

Walther.

Caricae. Feigen.

(Ficus carica L.)

Form u. Gabe. In Abkochung lothweise; Gurgelwasser, Umschlag.

1066. Rx. Caricarum

Rad. althaeae āā ʒj

Lactis vaccin. ʒij.

Coque ad colat ʒjß.

S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei eiternder Bräune.

J. A. Schmidt.

1067. *Rx.* Caricarum $\bar{3}j$
 Flor. sambuci $\bar{3}j\beta$.
 Inf. c. lactis ferv. $\mathcal{R}j$.

Col. S. Lauwarm sich damit zu gurgeln.

Anwend. In gleichem Falle.

Berends.

1068. *Rx.* Caricar. sicc., concis. et ad modum coffeae
 tost. $\bar{3}ij$.

Ebull. len. in aquae font. $\mathcal{R}j$. Filtra.

S. Zum Getränk.

Anwend. Als das beste Surrogat des arabischen Kaffees empfohlen von

Radius.

Carvi semina. Kümmel.

(*Carum Carvi L.*)

Karbe.

Form u. Gabe. In Pulver zu $\mathfrak{3}\beta$ — $\bar{3}\beta$, im Aufguss zu $\bar{3}ij$ — iv auf $\bar{3}vj$, esslöffelweise. Aetherisches Oel zu Einreibungen. Aeusserlich zu Klystieren.

1069. *Rx.* Croci gr. xv
 Rad. irid. flor. $\bar{3}j$
 Semin. carvi $\bar{3}j\beta$
 Magnes. carbon. $\bar{3}ij$.
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich 5—6 mal eine Messerspitze voll in Fenchelthee.

Pulvis infantum Rosensteinii.

Anwend. Gegen Blähungsbeschwerden und Kolik der Kinder.

Rosenstein.

1070. *Ry.* Semin. carvi $\bar{3}\beta$
 „ foeniculi $\bar{3}\text{ij}$
 Herb. menth. piperit. $\bar{3}\text{ij}$
 Flor. chamomill. $\bar{3}\beta$.
 Conc. cont. M. f. species.

S. Einen Esslöffel voll mit 3 Tassen Wasser anzubrühen.

Anwend. Karminativmittel.

1071. *Ry.* Olei olivar. $\bar{3}\text{j}$
 „ menth. piperit. aether.
 „ carvi aether. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{j}$
 Tinct. opii croc. $\bar{3}\beta$.

M. S. Gewärmt in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Gegen Verdauungsschwäche, Durchfall und Blähungen der Kinder.

Henke.

Caryophyllatae radix. Nelkenwurzel.

(Garoffel. Von *Geum urbanum* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu $\bar{3}\beta$ — j , täglich einigemal; im Aufguss $\bar{3}\text{j}$ auf $\bar{3}\text{vj}$ — viij , in Abkochung $\bar{3}\text{j}$ mit $\&\text{j}\beta$ auf $\&\text{j}$.

1072. *Ry.* Pulv. rad. caryophyllat. $\bar{3}\beta$
 „ calami aromat.
 Sacchari albi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{iv}$.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Täglich 3—4 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen leichte Wechselfieber.

Meyer.



1073. *Rx.* Pulv. rad. caryophyllat. ℥vj
 „ salis ammoniac. ℥ij.
M. f. pulv. D. ad scatulam.

S. Aller 2—3 Stunden 1 Kaffeelöffel voll.

Pulvis febrifugus pauperum Disp. Fuld.

Anwend. Gegen leichte Wechselfieber.

1074. *Rx.* Pulv. rad. caryophyllat. ℥j
 „ cort. cinnamom. ℥ij
 Syrup. cort. aurant. ℥iij.
M. f. electuar.

S. Alle Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Schubarth.

1075. *Rx.* Rad. caryophyllat. conc. ℥j.
 Coq. c. aquae simpl. ℥xij ad rem. ℥viiij.
 Colat. adde

Extr. caryophyllat. l. cort. peruvian. ℥ij

Spirit. sulphurico-aether. ℥j.

M. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. In leichten Wechselfiebern als Vorbereitung auf die China.

Haase.

1076. *Rx.* Fol. aurantii
 Rad. caryophyllat.
 „ valerian.
 Summitat. millefol. āā ℥iij.

Conc. M. S. 1—2—3 Esslöffel voll mit 1/2 Kanne Wasser anzubrühen und den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. Bei schwachem Magen, Verschleimung und Würmern.

Hufeland.

Caryophylli aromatici. Würznelken.

(Gewürznägelein, Kreidnelken. Von *Caryophyllus aromaticus* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, zu gr. iij — v, mehrmals täglich; in Aufguss, 3j auf 3iv—vj. Aether. Oel, zu 2—5 Tropfen. Aeusserlich als Zahntropfen, zu Zahnpulver und Zahnpillen, als Einreibung, Pflaster, künstlicher Balsam.

1077. R_y. Caryophyllor. arom. 3ij
 Flaved. cort. aurant.
 Magnes. carbon. aa 3j
 Rad. rhei 3ß
 Sacchari albi 3ß.
 M. f. pulvis.

D. S. Täglich 2—3 mal 1 kleinen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Verdauungsbeschwerden.

Meyer.

1078. R_y. Pulv. caryophyllor. 3ß
 „ rad. ari 3j
 Magnes. carbon. 3iij.
 M. f. pulvis.

D. S. Täglich 4 mal eine reichliche Messerspitze voll zu nehmen.

Anwend. In gleichem Falle.

Schubarth,

1079. R_y. Olei caryophyll. ʒj
 Tinct. opii 3ß
 Aether. sulphur. 3j.

M. S. 20—30 Tropfen.

Anwend. Den letzten 2—3 Gaben Chinapulver zuzusetzen,

wenn die Wechselfieber sehr hartnäckig sind, und dem einfachen Gebrauche der China nicht weichen wollen.

Horn.

1080. *Ry.* Olei caryophyll. aeth. ℥j
Tinct. opii
Aether. sulphur. āā 3ß.

M. D. S. Einige Tropfen auf Baumwolle in den hohlen Zahn zu bringen.

Guttae antiodontalgicae.

Anwend. Gegen Zahnschmerzen.

Rust.

1081. *Ry.* Camphorae 3j.
Solve in
Spirit. vini rectific. 3ij.
Adde
Tinct. opii croc. 3ß
Olei caryophyll. ℥j.

M. D. S. Einige Tropfen auf Baumwolle in den hohlen Zahn zu bringen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Boerhaave.

1082. *Ry.* Extr. belladonnae
„ hyoscyami
Opium gr. xx
Pyrethri 3ß
Olei caryophyllor. gutt. xx.
Fiat mass. pilul. Form. pil. gr. j.

M. D. S. Eine Pille in den hohlen Zahn zu bringen.

Rust.

1083. *Ry.* Olei caryophyllor.
 „ nucis moschat. āā 3j
 Spirit. juniper. 3iv.

M. S. Zum Einreiben auf den Unterleib und auf den Rücken.

Anwend. Bei Durchfall und Veitstanz.

Rosenstein. Chrestien.

1084. *Ry.* Olei caryophyllor.
 „ lavendul.
 „ succin. rectific. āā gutt. vj
 Spirit. vini rectific. 3β.

M. S. Um's Auge einzureiben.

Spiritus ophthalmicus Himlyi.

Anwend. Gegen amblyopische Gesichtsschwäche.

Himly.

1085. *Ry.* Caryophyllor. arom. cont. 3ij
 Nuc. moschat. l. Sem. carvi 3j
 Micae panis nigr. 3iij—iv.

M. f. cum vino rubro cataplasma.

S. Fingerdick auf doppelte Leinwand gestrichen und erwärmt auf die Herzgrube zu legen.

Anwend. Gegen Schwäche der Verdauung, Blähungsbeschwerden, krampfartige Leiden des Magens und der Gedärme sehr empfohlen von

Radius.

Cascarillae cortex. Cascarillrinde.

(Schakarille, graue Fieberrinde. Von Croton Cascarilla L., Croton Eluteria Swartz.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu 3β—j; in wenigem oder wässerigem Aufguss, 3β auf 3iv; in Abko-

chung, $\mathfrak{Z}\beta$ auf $\mathfrak{Z}vj$ und bis auf $\mathfrak{Z}iv$ eingekocht. Extrakt in Pillen, Auflösung, zu $\mathfrak{Z}\beta-j$, einigemal täglich.

1086. *Ry.* Cort. cascarill. gr. x
Opium puri
Rad. ipecacuanh. $\bar{a}\bar{a}$ gr. $\beta-j$.
M. f. pulv. D. tal. dos. $iiij$.

S. Aller 5 Stunden 1 Pulver.

Pulvis adstringens Brerae.

Anwend. Bei hartnäekigen und colliquativen Diarrhöen.

Brera.

1087. *Ry.* Cort. cascarill.
Rad. gentian. lut. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}iiij$
„ calam. arom.
Flaved. cort. aurant. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}j$.
M. f. pulv. D. ad scatulam.

S. Eine Stunde vor der Mahlzeit einen Theelöffel voll mit rothem Wein.

Anwend. Bei Magenschwäche als Stomachicum.

Vogt.

1088. *Ry.* Cort. cascarill. $\mathfrak{Z}ij$.
Coque c. aquae s. q. ad $\mathfrak{Z}iv$. Colat. adde
Spirit. nitri dulc. $\mathfrak{Z}iv$
Syrup. aurant. $\mathfrak{Z}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Durchfälle und Ruhren.

Jahn.

1089. *Ry.* Cort. cascarill. $\mathfrak{Z}iiij$
Rad. columb.
„ arnicae $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}ij$.

Infunde cum aquae ferv. q. s. ad colat. $\bar{3}$ viiij.

Admisce

Syrup. cort. aurant. $\bar{3}$ j.

D. S. Dreistündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen atonische Durchfälle.

Berends.

1090. *Ry.* Pulv. cort. cascarillae

Extr. rad. gentian. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij.

M. f. pil. gr. ij.

D. S. Täglich 4mal 12 Stück zu nehmen.

Schubarth.

1091. *Ry.* Extr. cascarillae

Ferri oxydul. nigr. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij

Syrup. cinnam. q. s.

F. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 3 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen allgemeine Erschlaffung, vermindertes Blutleben, Schleimflüsse u. s. w.

Vogel.

1092. *Ry.* Extr. cascarill.

„ columbo $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ jß.

Solve in

Aquae menth. pip. $\bar{3}$ v.

Adde

Tinct. cinnam. $\bar{3}$ ij

Syrup. cort. aurant. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Umgeschüttelt, 2stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Diarrhöen.

Vogel.

Cassia cinnamomea. Zimmtcassie.

(*Cinnamom. indicum, chinense; chines., franz.,
engl. Zimmt. Von Cinnamomum
aromaticum Nees.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge,
Aufguss, ʒß—j, mehrmals täglich. — Tinktur 20—60
Tropfen. — Wasser, esslöffelweise 3—6mal. — Syrup,
ʒß—j auf ʒiv. — Aeth. Oel, 1—2 Tropfen einigemal.
Aeusserlich als Zahnmittel.

1093. Rx. Cassiae cinnam. ʒij
Flaved. cort. aurant. ʒß.
Inf. aquae ferv. q. s. ad col. ʒvj.
Tinct. rhei vin. ʒiij
Spirit. sulphurico-aeth. ʒij
Syrup. cort. aurant. ʒß.

M. S. Stündlich oder zweistündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Als magenstärkendes und belebendes Mittel.

Sobernheim.

1094. Rx. Olei cassiae cinnamom. gutt. x
Aether. sulphuric. ʒj.

M. S. Aller $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden 10—15 Tropfen.

Anwend. Bei lebensgefährlichen Mutterblutstürzen.

Thilenius.

1095. *Ry.* Olei cassiae cinnamom.
 Gummi mastich. āā 5j
 Spirit. vini rectific. 3ij.

M. S. Zum Befeuchten von Baumwolle, welche man in den hohlen Zahn einbringt.

Anwend. Gegen feuchten Brand der Zähne.

Linderer.

Castoreum. Bibergeil.

(*Von Castor fiber L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Mixturen, zu gr. ij—x, einigemal täglich. Spirit. und äther. Tinktur zu 10—30 Tropfen, mehrmals täglich. Als Riechmittel.

1096. *Ry.* Castorei gr. xvij
 Kali nitrici dep. 3ß—j
 Sacchari albi 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part aequal.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen aktive Kongestionen zum Uterus und gegen Gebärmutterkrämpfe, welche Fehlgeburt drohen.

Berends.

1097. *Ry.* Castorei gr. iv—vj
 Rad. valerian. min.
 Sacchari albi āā 3ß.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj. D. ad chart. cera

S. Ein Pulver auf einmal zu nehmen.

Anwend. Bei hysterischen und Unterleibskrämpfen.

A. G. Richter.

1098. *Rx.* Asae foetid. ʒj
 Galbani
 Myrrhae āā ʒß
 Castorei gr. xv
 Tinct. valerian. aether. q. s. ut f. pil. No. Lxxij.
 Consp. cinnamon. D. in vitro.

S. Dreimal täglich 3—8 Stück.

Pilulae antihystericae Sydenhami.

Anwend. Gegen Hysterie.

Sydenham.

1099. *Rx.* Rad. valerian. ʒß
 Flor. chamomill. vulg. man. j.
 Infund. ad colat. ʒx.
 Ammon. muriat. ʒij
 Castorei ʒj
 Syrup. aurant. ʒj.

M. S. Aller Stunden 1—2 Esslöffel.

Anwend. Bei Schlagflüssen nach gemachtem Aderlasse.

Lentin.

1100. *Rx.* Tinct. castorei moscov. ʒiijß
 Liqu. ammon. pyro-oleos. ʒiij
 Spirit. sulphur.-aether. ʒj.

M. S. Vierzig Tropfen mit Chamillenthee zu nehmen.

Anwend. Bei hysterischen Anfällen.

Vogt.

1101. *Rx.* Tinct. castorei
 Liq. anod. min. Hoffm. āā ʒij.

M. S. Während des Krampfanfalles 15—20 Tropfen zu nehmen.

Anwend. In gleichem Falle.

J. Frank.

1102. *Ry.* Tinct. castorei 3j
 „ opii simpl. 3ß.

M. S. $\frac{1}{2}$ —2stündlich 15 Tropfen.

Anwend. Gegen zu heftige Nachwehen.

Mappes.

1103. *Ry.* Tinct. castorei aether.
 Liqu. ammon. caustic. āā 3ij.

M. S. In das obere Augenlid und in die Augenbrauengegend einzureiben.

Anwend. Gegen Amaurose.

A. G. Richter.

1104. *Ry.* Olei nucis moschat. 3ij
 Castorei ʒij
 Sal. volatil. corn. cerv. ʒß
 Olei rutae gutt. vj.

M. S. In die Schläfe und Nase einzureiben.

Balsamum aromaticum aethereum.

Anwend. Bei Hysterie.

Augustin.

1105. *Ry.* Camphorae trit. gr. ij
 Acid. succin. crud.
 Ammon. carbon. pyro-oleos. āā gr. iv.
 Pulveratis adde
 Castorei pulv. c. paux. aquae in pultem re-
 dact. ʒj
 Adipis suill. ʒiv
 Olei anisi gutt. viij.

M. f. unguentum. D. in pyxide alba, epistomate subereo clausa.

S. *Mittelst langer Charpiefäden etwas davon in's Ohr zu bringen und über Nacht darin zu lassen.*

Anwend. Gegen asthenisch-nervöse Schwerhörigkeit.

Rust.

1106. R. Galbani
Elemi āā ̄β
Cerae flavae
Terebinth. laric. āā ̄ij.
Leni calore liquef. admisce
Castorei sibir. ̄ij
Olei chamom. aether. gutt. xx.
M. f. emplastrum.

S. *Auf den Magen oder Unterleib zu legen.*

Anwend. Bei spastischen und kardialgischen Affektionen, nervösen Koliken und Unterleibskrämpfen.

Brückner.

Catalpa. Katalpa.

(*Bignonia catalpa* L.)

Siliquae. Schoten oder Früchte; auch die Rinde der Wurzel.

Form u. Gabe. Abkochung, ̄β auf ̄vj — viij, esslöffelweise.

1107. R. Siliquar. bignon. catalp. ̄β.
Coq. ad colat. ̄vij.
Oxymell. scill. ̄β.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen convulsivisches Asthma.

Brera.

1108. *Ry.* Siliquar. bignon. catalp. $\bar{3}\beta$
 Coque in aquae font. s. q. ad colat. $\bar{3}\text{viiij}$
 cui adde
 Lactis ammoniacal. $\bar{3}\text{j}$
 Spirit. nitri dule. gutt. xx
 Oxymell. scill. $\bar{3}\text{j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1—2 Esslöffel.

Anwend. Bei nervösem Asthma mit Lungenschwäche.

Brera.

1109. *Ry.* Succ. cort. rad. bignon. catalp.
 Alcohol. pond. spec. 0,380 $\bar{a}\bar{a}$ part. aequal.
 Stet in loco frigido saep. agitando per octi-
 duum, dein filtra et exhibe.
S. Hiervon 4—8 Tropfen, mit 12 Tropfen destill.
 Wasser verdünnt, in das Auge zu tröpfeln.

Anwend. Gegen skrofulöse Augenentzündung mit Augenlid-
 krampf.

J. N. Fischer.

Catechu. Katechu.

(*Terra japonica*, *Extractum* s. *Succus Catechu*. Von *Acacia Catechu* Willd, *Mimosa Catechu* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Zeltchen, Lattwerge, Auflösung, zu $\bar{3}\beta$ — $\bar{3}\beta$, mehrmals täglich. Aeusserlich als Gurgelwasser, zu Zahnmitteln, Einspritzungen.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Kalkwasser, Metallsalzen, vorzüglich eisenhaltigen.

1110. *Ry.* Opii pur. gr. vj
 Catechu $\bar{3}\text{j}\beta$

Elaeosacch. caryophyllor. $\text{℥}\beta$.

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

D. S. Aller 3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei chronischen Durchfällen.

Vogel.

1111. *Rx.* Pulv. rad. ipecacuanh.

„ opii pur. āā gr. x

Catechu ℥j

Pulv. cort. cinnam. ℥iv .

M. f. pulv. Div. in part. x aequal.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Vogel.

1112. *Rx.* Catechu gr. iir

Extr. opii gr. ij

Conserv. rosar. q. s.

F. bolus. Consp. cinnam.

S. Früh und Abends 1 Bissen.

Anwend. Gegen chronische Diarrhöe.

Parmientier.

1113. *Rx.* Cerae flavae $\text{℥}\beta$

Cetacei ℥j .

Leni igne liquef. immisce

Pulv. catechu ℥j

Olei cinnam. gutt. xij.

F. pil. gr. vj. Consp. cinnam.

S. Täglich 3—4 Stück.

Pilulae antidysentericae Willisii.

Anwend. Gegen chronische Ruhren.

Willis.

1114. *Ry.* Catechu
 Alumin. crud. āā 3ij
 Extr. gentian. q. s.
 ut f. pil. gr. ij. Consp. cinnam.

S. Aller 3 Stunden 4 Stück.

Pilulae adstringentes Hufelandi.

Anwend. Bei allen chronischen Profluvien, sowohl Blut- als Schleimflüssen, sehr wirksam, besonders gegen weissen Fluss, wo sie Hufeland's Lieblingsmittel waren.

Hufeland.

1115. *Ry.* Pulv. rad. ipecacuanhae 3j
 Catechu 3ij
 Sacchari albi 3j
 Mucilag. gumm. mimosae q. s.
 ut fiant trochisci lx.

D. S. Täglich 1—2 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei chronischem Durchfall und Atonie des Nahrungskanals.

Richter.

1116. *Ry.* Catechu 3ij.
 Coque c. Decoct. ligni quassiae ℥j.
 Colatur. 3viiiij adde
 Aquae cinnamomi
 Syrup. cinnamomi āā 3jß.

M. D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Kämpf.

1117. *Ry.* Pulv. catechu
 Boli armen. āā 3ij

Alumin. asti ℥j.
Tinct. opii q. s.
ut f. pasta.

Anwend. Als Stypticum im Thomashospitale zu London vorrätig und empfohlen von

Astley Cooper.

1118. *Ry.* Catechu
Flor. balaust. āā ʒβ
Alumin. crudi
Piper. long. āā gr. v.
M. f. pulvis.

S. Nach herabgedrückter Zunge die Spitze des Zäpfchens mit dem auf einem Kaffeelöffel befindlichen Pulver zu berühren.

Anwend. Gegen Erschlaffung des Zäpfchens.

1119. *Ry.* Pulv. catechu
„ rad. calam. arom. āā ℥j
„ myrrhae ʒβ
Olei caryophyll. gutt. xij
Mellis rosat. ʒβ.
M. terendo, f. electuarius.

S. Zum Bestreichen des Zahnfleisches.

Anwend. Gegen Auflockerung, Schlaffheit und Bluten des Zahnfleisches.

1120. *Ry.* Tinct catechu
Spirit. cochlear. āā ʒβ
Aquae salviae ʒvj.

M. D. S. Umgeschüttelt. Mundwasser.

Phöbus.

1121. *Ry.* Catechu ℥j
Alumin. ʒviij
Resin. pini ʒj

Olei olivar. ℥ij

Aquae q. s.

ut f. l. a. unguent.

S. Zum Verbinden.

Anwend. Gegen schlaaffe, atonische Geschwüre.

Thomson.

Centaurii minoris herba et summitates. Tausendgüldenkraut.

(Von *Gentiana Centaurium* L., *Erythraea Centaurium* Rich.)

Form u. Gabe. In Pulver (selten), zu ℥j — ij, einigemal täglich; in Aufguss, Abkochung, ℥℔ — j auf ℥viij, esslöffelweise; zu Klystieren. Extrakt, zu ℥℔ — j, mehrmals täglich, in Pillen, Bissen, Mixturen.

Man vermeide Verbindungen mit Salzbildern, Alaun, salpetersaurem Silber und Quecksilber, Sublimat, salzsaurem Gold, essigs. Blei und Eisenoxydsalzen.

1122. R_y. Herb. centaur. min.

Rad. gramin.

„ saponar.

„ taraxac. āā ℥ij.

Conc. M. f. species.

D. S. Den 8. Theil mit ℥j Wasser auf ℥℔ gekocht. Klystier.

Anwend. Visceralklystier.

Kämpf.

1123. R_y. Extr. centaur. minor. ℥℔

Ammon. muriat. dep. ℥ij.

Solve in

Aquae menth. pip. $\bar{3}vj$

Oxymell. scill. $\bar{3}vj$.

M. D. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Richter.

1124. *Ry.* Amygdal. amar. $\bar{3}j\beta$

Aquae commun. $\bar{3}j$.

F. l. a. emulsio. Adde

Extr. centaur. minor. $\bar{3}j$.

*S. S. Eine Stunde vor dem Anfalle des Wechsel-
fiebers auf einmal zu nehmen.*

Frank (in Posen).

Cera alba et flava. Weisses und
gelbes Wachs.

(*Von Apis mellifica L.*)

*Form u. Gabe. In Emulsion, Lattwerge, zu $\bar{3}j$,
öfters täglich. Aeusserlich als Tampon, zu Salben, Ce-
raten, Pflastern, Kerzen, Räucherungen, Wachspapier.*

*Das gelbe Wachs zieht man als geschmeidiger dem
weissen vor.*

1125. *Ry.* Cerae flavae $\bar{3}\beta$.

Leni cal. liquef. in mort. calefact. fiat cum

Vitellis ovar. vj

Aquae menthae crispae $\bar{3}vj$

l. a. emulsio, cui adde

Syrup. croci $\bar{3}j$.

M. D. S. Umgeschüttelt, esslöffelweise.

Anwend. Bei Ruhr.

Vogel.

1126. *Ry.* Cerae flavae $\overline{3}\beta$
 Olei amygdal. $\overline{3}j\beta$.
 Leni calor. liquat. admisce
 Conserv. rosar. $\overline{3}ij$.
 F. electuarius. D. in pyx. alb.

S. Umgerührt, aller 3 Stunden 2 Theelöffel voll.

Anwend. Bei übermässiger Reizbarkeit des Darmkanals mit Aussonderung scharfer und selbst häutiger Stoffe.

Schwartze.

1127. *Ry.* Cerae albae $\overline{3}ij$
 Mastichis $\overline{3}j$
 Olei amygdal. rec. $\overline{3}iij$
 Opii puri gr. ij
 Olei caryophyll. arom. gutt. xij
 Coccionell. gr. $vijj$.
 M. form. in bacillos crassitud. calami script. et involv. in charta cerat.

S. Zahnwachs.

Cera ad dentes cariosos.

Anwend. Ein verhältnissmässig grosses Stück dieser halbweichen Masse in den hohlen Zahn zu drücken.

Clarus.

1128. *Ry.* Cerae flavae l. albae $\overline{3}ij$
 Olei olivar. provinc. $\overline{3}vj$.

Liqu. S. Einfache Wachssalbe.

Unguentum cereum.

Anwend. Als mildes Verbandmittel, dem andere, z. B. Opium, beigemengt werden können.

1129. *Ry.* Cerae flavae
 Butyr. rec. insuls. $\overline{aa} \overline{3}i$.

Liquef. conterant. c.

Aquae comm. paux. F. unguentum. D.

S. Zum Verbande.

Anwend. Bei Verbrennungen.

Stahl.

1130. R_y. Cetacei ʒj

Cerae albae

Terebinth. latic. aa ʒjß.

Liquef. simul baln. Mar. et spatula extendantur
super chartulas. Refriger. D.

S. Wachspapier.

Anwend. Als Decke bei stark nässenden Geschwüren, statt Wachstaffet in den Schuhen zu tragen, oder mit etwas Oel oder Eiweiss dünn bestrichen als Unterlage zur Verhütung des Decubitus.

Ph. Gall.

Cervi Cornu. Hirschhorn.

(Von *Cervus Elaphus* L.)

Form u. Gabe. Zu Tisanen, ʒj mit ℥ij—iij auf ℥j eingekocht, zu Gallerten ʒjß mit ℥j auf ʒiij eingekocht; selten als Pulver.

Man vermeide Verbindungen mit concentrirter Salpetersäure, Gerbestoff, Chlor, kaustischen Alkalien, Alaun, Kochsalz, vielen Metallsalzen und Weingeist.

1131. R_y. Cervi cornu raspati

Micae panis albi aa ʒiij.

Coque ex aquae font. ℥v ad colat. ℥iij.

Syrup. succi citri q. s. ad gratum saporem.

M. S. Zum Getränk.

Decoctum album Sydenhami nach Klein.

Anwend. Bei Durchfällen, Ruhren, Abzehrungen, Husten, Entzündungen der Verdauungswerkzeuge.

1132. *Ry.* Cervi cornu raspati et ablut. $\bar{3}$ ij
 Aquae commun. $\mathfrak{L}$ ijß.
 Coque ad modicum ignem in vase tecto per 8 horas; liquori per pannum laneum colato, adhuc calido, admisce
 Sacchari albi $\bar{3}$ j
 Vini rhenani
 Succ. citri rec. expr. et colat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij.
 Repone in loco frig. ut f. gelatina. D. in pyxide alba.

S. Zweistündlich 1—2 Theelöffel.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Ph. Slesv.

1133. *Ry.* Cervi cornu raspati $\bar{3}$ j
 Coq. c. aquae font. $\mathfrak{L}$ iv ad rem. $\mathfrak{L}$ ij.
 Filtra et adde
 Sacchari albi q. s. ad grat. saporem.

S. Zum Getränk.

Anwend. Als erweichendes und nährendes Mittel.

Frank.

1134. *Ry.* Cervi cornu raspati $\bar{3}$ ijß
 Cort. cascarill. $\bar{3}$ ß.
 M. f. species.

S. Täglich den dritten Theil mit $\mathfrak{L}$ jß Wasser auf $\mathfrak{L}$ j einzukochen und täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Atrophieen, Kolliquationen, hektische Zustände.

Choulant.

1135. R_y. Baccar. lauri
 Nucis moschatae
 Cornu cervi rasp. āā 3β.
 F. pulv. subtiliss. S. suo nom.

Pulvis antihectico-scrofulosus Kaempfii et
 Goelisi.

1136. R_y. Pulv. antihectico-scrof. 3ij.
 „ rad. liquirit. 3iij.

M. S. Täglich 3mal eine Messerspitze voll.

Anwend. Gegen Skrofeln. Nebenbei lässt man die Kinder dreimal wöchentlich ein laues (27—28° R.) Heusamen- oder Kleienbad nehmen, und dünne leicht nährnde Kost genießen.

Gölis.

1137. R_y. Pulv. antihectico-scrof. 3ij
 Resin. guajac.
 Ferri pulv. āā 3β
 Sacchari albi 3ij.
 M. f. pulv. subtiliss.

S. Wie das vorige.

Anwend. In gleichem Falle. Ist ein skrofulöser Hautausschlag vorhanden, so kann statt des Eisens Hydrargyr. stibiato-sulphur. ʒj—ij zugesetzt werden.

Gölis.

Cornu cervi ustum album; weissgebranntes
Hirschhorn.

(*Knochenasche.*)

Form u. Gabe. Selten innerlich als Pulver, ʒß—j,
einigemal täglich. Aeusserlich zu Zahnpulver.

Man vermeide Säuren, besonders Mineralsäuren.

1138. R. Cornu cervi usti
Tartari depur.
Corall. rubr. ppt. āā ʒiij
Rad. iridis flor.
Myrrhae elect. āā ʒij
Coccion. subtiliss. trit. ʒß
Olei caryophyll. gutt. xij
Mell. rosar. ʒijß.

M. S. Zahnlattwerge.

Clarus.

Cetaceum. Wallrath.

(*Sperma Ceti. Von Physeter macrocephalus L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lecksaft, Emul-
sion, ʒj, mehrmals täglich. Aeusserlich zu Pflastern, Sal-
ben, Waschpulvern und Pasten.

1139. R. Cetacei ʒij
Kali nitrici ʒj
Pulv. rad. iridis florent.
Sacchari albi āā ʒj.

M. f. pulvis.

S. Täglich 3—4mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen katarrhalische Beschwerden, Husten u. s. w

1140. *Ry.* Cetacei $\mathfrak{Z}$ ij
 Sacchari albi $\mathfrak{Z}$ j.
M. f. pulvis.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel.

Anwend. Gegen katarrhalischen Husten.

1141. *Ry.* Cetacei $\mathfrak{Z}$ vj
 Gumm. mimos. $\mathfrak{Z}$ ijj
 Sacchari albi $\mathfrak{Z}$ j.
 Conterantur exactiss. sensim addendo
 Aquae destill. $\mathfrak{Z}$ iv.

S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Husten.

Hufeland.

1142. *Ry.* Cetacei $\mathfrak{Z}$ ij
 Olei amygdal. $\mathfrak{Z}$ jß.¹
 Liquat. in mort. calefact. admisce terendo
 Syrup. violar. $\mathfrak{Z}$ jß
 Conserv. rosar. $\mathfrak{Z}$ ß.

D. S. Umgeschüttelt, Theelöffelweise.

Anwend. In gleichen Fällen.

Marcus.

1143. *Ry.* Cetacei non rancidi
 Gummi arab. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}$ ij.
 Contrita simul subigantur c. aquae ros. [q. s..
 ut in mucilaginem abeant. Dein admisce
 Syrup. althaeae $\mathfrak{Z}$ vj.
M. f. linctus.

S. Alle Stunden einen Kaffeelöffel voll.

Anwend. Zur Beförderung der Expektion, gegen Harnbeschwerden.

J. A. Schmidt.

1144. *Ry.* Spermat. ceti
Terebinth. venet. āā 3ij.

Mixtis adde

Myrrhae 3j

Olibani q. s.

ut fiant pilulae gr. iij.

S. *Aller 3 Stunden 1 Stück.*

Pilulae balsamicae Boerhaavii.

Anwend. Die Expektionen befördernd bei Lungenschwindsucht.

Boerhaave.

1145. *Ry.* Cetacei 3ß.

Leni igne in mort. lapid. fuso adde

Olei amygdal. dulc. 3j

„ destill. lavendul. gutt. xx

„ bergamott. gutt. x.

M. f. unguentum.

S. *Zum Einreiben.*

Anwend. Gegen Sprödigkeit der Haut.

Chamomillae vulgaris flores.

Gemeine Kamillen.

(Von Matricaria Chamomilla L.)

Die römischen Kamillen (*Chamomillae romanae flores*, von *Anthemis nobilis* L.) werden eben so angewendet, nur in etwas geringerer Gabe, als die gemeinen Kamillen, weil sie reicher an äther. Oele und an adstringirendem Principe sind.

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu ʒj—iij, täglich mehrmals; im Aufguss, 3ij—vj auf 3vj—viij, 2 stündlich esslöffelweise; Extrakt in Pillen, Bissen,

Mixturen, zu ʒß – ʒß, mehrmals täglich; ätherisches Oel, 1—3 Tropfen. Aeusserlich zu Kräuterkissen, Kataplasmen, Streupulvern, Einspritzungen, Klystieren ʒj — ij, Bädern ʒj—ij, Bähungen.

1146. *Ry.* Magnes. carbon.
Tartari depur.
Rad. rhei
Flor. chamomill.
Elaeosacch. foenicul.
Sulphur. dep. aa ʒij.
M. f. pulvis.

S. Täglich 2—3 mal einen Theelöffel voll.
Pulvis ecphracticus Sellii.

1147. *Ry.* Opii puri gr. j
Ammon. muriat. dep. ʒij
Flor. chamomill. vulg. ʒiij
Elaeosacch. foenicul. ʒß.
M. f. pulvis.

D. S. Zweistündlich 1 Theelöffel.

Anwend. Bei leichten Wechselfiebern.

Phöbus.

1148. *Ry.* Rad. valerian. minor. ʒvj
Flor. chamomill. vulg. ʒij
Aquae comm. ferv. ʒviiij.
Repone ad refriger. Colat. adde
Tinct. castorei ʒij
Syrup. cinnam. ʒß.

M. D. S. Umgeschüttelt, stündlich 1 grossen Esslöffel.

Anwend. Bei Unterleibskrämpfen.

G. A. Richter.

1149. *Ry.* Extr. chamomill. $\mathfrak{Zj}$
 Kali tartar. $\mathfrak{Zj}$
 Aquae chamomill. $\mathfrak{Ziv}$.

S. S. *Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen krampfhafte Unterleibsschmerzen der Wöchnerinnen, wenn diese fieberlos sind, die Cirkulation im Unterleibe aber gehindert, der Fruchthälter ausgedehnt und der Wochenfluss sparsam ist. Dabei lauwarme Einspritzungen von Kamillen- und Fliederaufguss und Einreibungen auf den Unterleib von Ungt ror. marin. comp. $\mathfrak{Zj}$, Olei hyoscyam. $\mathfrak{Zj}$ und Olei menth. $\mathfrak{Z\beta}$.

Ribke.

1150. *Ry.* Extr. chamom. vulg.
 Gummi mimos. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Zij}$.
 Solve in
 Aquae chamomill. $\mathfrak{Zv}$.
 Adde
 Syrup. capit. papav. $\mathfrak{Z\beta}$.

M. D. S. *Umgeschüttelt, 2stündlich 1 Esslöffel.*

Anwend. Bei Durchfällen und Ruhren.

A. G. Richter.

1151. *Ry.* Asae foetid. $\mathfrak{Z\beta}$
 Extr. chamomill.
 „ valerian. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Zij}$
 Sapon. jalapp.
 Extr. aloes $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Zj}$
 Olei menthae pip. gutt. x.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

D. S. *Dreimal täglich 4—6 Stück.*

Anwend. Gegen habituelle Verstopfung bei Hysterischen.

Rust.

1152. *Ry.* Olei chamomill. aether. gutt. xvj
 Spirit. nitrico-aether. 3ij.

M. S. Zweistündlich 15—20 Tropfen.

Anwend. Krampfstillendes und belebendes Mittel.

Heim.

1153. *Ry.* Olei chamom. coct. 3ß
 Bals. tranquill. (Olei hyoscyam. coct) 3j
 Olei terebinth. sulphurat.
 „ succin. rectific.
 Tinct. asae foetid.
 „ castorei āā gutt. xij.

M. S. Ohrtropfen.

Anwend. Gegen chronische Ohrenentzündung und Taubheit von Schwäche der Gehörorgane.

Montmahou.

1154. *Ry.* Infus. flor. chamomill. (3ij) 8ij
 Aceti plumbi 3j
 Tinct. opii simpl. 3ij.

M. S. Lauwarm überzuschlagen mittelst Leinwand.

Anwend. Gegen Pseudoerysipelas und nicht allzu aktive äussere Entzündungen.

Rust.

1155. *Ry.* Extr. chamomill. vulg.
 „ calendulae āā 3ij.
 Solve in
 Aquae laurocerasi 3ij.
 Adde
 Tinct. opii simpl. 3j.

M. D. S. Umgeschüttelt, als Verbandwasser.

Anwend. Bei Krebsgeschwüren. Ein Lieblingsmittel von

Rust.

1156. *Ry.* Cort. querc. gross. pulv. $\bar{3}j$.
 Coque c. aquae comm. $\bar{8}j$. Sub finem coct.
 adde
 Flor. chamom. vulg. $\bar{3}\beta$.
 Colat. refrig. $\bar{3}vj$ adde
 Tinct. myrrhae $\bar{3}ij$.

M. D. S. Umgeschüttelt, zum äusserlichen Gebrauch, als Verbandwasser oder Einspritzung.

1157. *Ry.* Flor. chamomill. $\bar{3}j\beta$
 Semin. lini $\bar{3}j$.
 Coque c. aquae comm. s. q. ad colat. $\bar{3}vj$; adde
 Magnes. sulphur. $\bar{3}\beta$
 Olei lini $\bar{3}j\beta$.

M. S. Eröffnendes Klystier.

Reil.

1158. *Ry.* Infus. flor. chamom. ($\bar{3}j$) $\bar{3}v$
 Vitell. ovor. $\bar{ij}$
 Olei olivar. $\bar{3}ij$
 Sacchari albi $\bar{3}j\beta$.
M. f. emulsio.

D. S. Zum Klystier.

Anwend. Für sehr sensible hysterische Individuen.

Berends.

1159. *Ry.* Flor. chamomill.
 „ sambuci $\bar{aa}$ $\bar{3}j\beta$.

Conc. M. S. Mit heissem Wasser aufgegossen zum Sitzbade.

Anwend. Gegen Krämpfe der Geschlechts- und Harnwerkzeuge, Menostasie u. s. w.

Berends.

1160. Ry. Flor. chamomill.
 „ sambuc.
 Farin. secalin. āā 3j.
 M. f. species.

S. Zum Kräutersäckchen.

Chelidonii herba. Schöllkraut.

(*Chelidonium majus* L. Schwalbenkraut, Gold-
 wurzel.)

Form u. Gabe. Frisch ausgepresster Saft, zu
 3ß—iv, mit Milch, Molken u. s. w. Aeusserlich als
 Augenwasser. Extrakt in Pillen, Lösung, Mixturen, zu
 3ß—3j, einigemal täglich.

1161. Ry. Succ. rec. express. herb. chelidonii 3j—ij
 „ „ „ „ fumariae
 „ „ „ „ taraxaci āā 3vj—viij.
 Succos colatos et decantatos misce; adde
 Aether. acetic. gutt. x.

D. S. Umgeschüttelt, in einem Tage zu ver-
 brauchen.

Phöbus.

1162. Ry. Aceti scillit. 3iv
 Kali carbonic. dep. q. s. ad perf. saturat.
 Ammoniaci 3ij
 Extr. chelidonii 3j
 Tart. stibiat. gr. vij
 Aquae menth. pip. 3iiij.

M. D. S. Aller 3 Stunden 1/2 Tasse voll zu neh-
 men.

Anwend. Bei chronischer Leberaffektion.

A. G. Richter.

1163. *Ry.* Extr. chelidon.
 Gummi ammoniac. āā 3jß
 Sapon. medic. 3j.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

D. S. Täglich 3mal 8—12 Stück zu nehmen,

Anwend. Gegen Unterleibsstockungen, Leberauftreibungen.

Schubarth.

1164. *Ry.* Extr. chelidon.
 Sapon. venet.
 Gummi asae foetid. l. ammoniac. āā 3ij.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. liquirit.

D. S. Früh und Abends 15 Stück zu nehmen.

Anwend. In der mit Stockungen im Pfortadersysteme verbundenen Gicht.

A. G. Richter.

1165. *Ry.* Extr. chelidon. 3ijß
 „ hyoscyam. 3j
 Kali sulphur. 3j
 Tart. stibiat. gr. j
 Aquae fl. sambuc. 3vj
 Oxymell. scillit. 3j.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen halben Löffel.

Potio hydragoga.

Anwend. Gegen Wassersucht, von Leberkrankheit entsprossen.

Augustin.

Chenopodium ambrosioides L.

Mexikanisches Traubenkraut.

(*Chenopod. mexicanum*, *Botrys mexicana*; *mex. wohlriechender Gänsefuss*, *mex. Thee*.)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, zu $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{3j}$, einigemal täglich; im Aufguss $\mathfrak{3ij}$ — $\mathfrak{vj}$ auf $\mathfrak{3vj}$, täglich zu verbrauchen.

1166. *Ry.* Herb. chenopod. ambros. $\mathfrak{3j}$
 „ millefol. $\mathfrak{3j\beta}$
 Rad. liquirit. $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{ij}$.

Conc. M. S. Einen gehäuften Esslöffel voll mit 2—3 Tassen kochenden Wassers aufzugießen und täglich zu verbrauchen.

Anwend. Bei Magenkrampf und andern krampfhaften Zuständen des Unterleibes, Hämorrhoidalbeschwerden. Zuweilen lässt Radius $\mathfrak{3j}$ — $\mathfrak{ij}$ Senna zusetzen.

Radius.

1167. *Ry.* Herb. chenopod. ambros.
 Flor. arnic. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{3ij}$.
 Inf. aquae ferv. q. s. per $\frac{1}{4}$ hor. v. c. Colat. $\mathfrak{8j}$
 adde
 Sacchari albi $\mathfrak{3ij}$.

M. D. S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ Tasse voll.

Anwend. Gegen asthenischen Veitstanz.

v. Hildenbrand.

1168. *Ry.* Castorei pulv. $\mathfrak{3j}$
 Herbae chenopod. ambros. pulv.

Herbae mari veri pulv. āā ʒv
 Mellis despum. ʒij.
 M. f. electuar. D. in pix. alba epist. subereo
 clausa.

S. Umgerührt, 4 mal täglich einen reichlichen
 Theelöffel.

Anwend. Bei Krämpfen des Unterleibes, besonders hysteri-
 schen.

Vogt.

Tinctura herbae chenopodii ambrosioides
 zu 40—80 Tropfen in Lähmungen empfiehlt

Lentin.

Chenopodium olidum. Stinkender
 Gänsefuss.

(*Herba Vulvariae*, *Chenopod. olid. Curt.*)

Form u. Gabe. Frisch ausgepresster Saft, ʒi—ij,
 einigemal täglich; Essenz 30—40 Tropfen, 4—6mal.

1169. Rx. Succ. rec. express. chenopod. olid.
 Spirit. vini āā.
 Digere per iil horas.

Colat. S. Aller 2 Stunden 30 Tropfen in er-
 wärmtem Bier.

Essentia Chenopodii olidi.

Anwend. Gegen unterdrückte Menstruation. 14 Tage vor der-
 selben täglich ein paar mal zu brauchen.

Krieg.

1170. R_y. Essent. chenopod. olid. ℥vj
Tinct. ferri muriat. ℥ij.

M. S. Täglich 2mal 30 Tropfen.

Anwend. In gleichen Fällen mit Atonie

Krieg.

Chimophilae umbellatae folia.

Blätter des doldentragenden Wintergrüns.

(Von Chim. umbell. Pursh., *Pyrola umbellata* L.)

Form u. Gabe. Abkochung, zu ℥β—j auf ℥vj—
xij täglich. Wässeriges oder weingeistiges Extrakt, gr.
x—xx, täglich 3mal.

1171. R_y. Chimoph. umbell. ℥j
Macera per. xij hor in aquae font. ℥ij.
Coque ad colat. ℥j.

S. Täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Wassersucht, chronische Katarrhe, Lungen-
sucht.

Cerutti. Radius. Sommerville.

1172. R_y. Chimoph. umbell. ℥β—j.
Coque c. aquae font. ℥xij ad rem. ℥vj.
Coct. finit. adde
Spirit. frument. ℥ij.
Digere frigide per hor. vj.

Colat. S. Täglich 4mal 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht, Gicht, besonders wenn die
Absonderung des Urins quantitativ und qualitativ fehler-
haft ist.

Radius.

1173. *Ry.* Chimoph. umbell. $\mathfrak{Z}\text{vj}$.
 Coque c. aquae font. $\mathfrak{Z}\text{xij}$ ad rem. $\mathfrak{Z}\text{vj}$.
 Sub finem coct. adde
 Fol. sennae $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

Colat. S. Aller 2 Stunden 1 Esstöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht mit Unterleibsstockungen, wenn durch die Chimophila allein nicht hinreichende Oeffnung geschafft wird.

1174. *Ry.* Gummi Guajac.
 Extr. chimoph. umbell. spirit. aquos. $\mathfrak{Z}\text{j}\beta$
 Sulphur. antim. aurat. gr. xij.
 F. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 5 Stück.

Anwend. Gegen Gicht.

Radius.

Chinae cortex. Chinarinde.

*(Cortex peruvianus; Perurinde, Fieberrinde.
 Von mehreren Arten Cinchona u. Exostemma.)*

Drei Sorten China sind vorzugsweise im Gebrauche:
 1) Cort. chinae regiaae s. flavae, die billigste und an Alkaloiden reichste, verdient desshalb als Fiebermittel und als Amarum den Vorzug. 2) Cort. chinae fuscae, die am häufigsten angewendete, enthält Cinchonin, wenig oder kein Chinin. 3) Cort. chinae rubrae, die theuerste und nach Link in Berlin selten ächt zu haben, wurde besonders zum äusseren Gebrauche empfohlen, ist jedoch am ersten zu entbehren.

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, Pillen, zu $\mathfrak{Z}\text{j}$ —iv, mehrmals täglich; in Abkochung, wässrigem oder wenigem Aufguss, zu $\mathfrak{Z}\beta$ —j auf $\mathfrak{Z}\text{j}$ —ij Co-

latur, spitzglasweise 2mal als Tonicum, oder auf ℥viij—x, halbtassenweise, täglich zu verbrauchen, als Fiebermittel. — Extrakt in Pillen, Lösung, Bissen, zu ʒß—3ß, mehrmals täglich. — Tinktur, zu 30—80 Tropfen, einigemal. — Aeusserlich zu Streupulver, Zahnpulver, Kataplasmen, Mund-, Gurgelwässern, Einspritzungen, Klystieren, Fomentationen, Bädern, Salben.

Man vermeide Verbindungen mit Metallsalzen, namentlich Eisen- und Spiessglanzpräparaten, Alkalien, Alkaloiden, starken Säuren, thier. Leim, Stärkemehl, Kleber, Eiweiss, rothem Wein.

1175. *Rx.* Cort. chinae reg. ℥j
Ammon. muriat. ʒjß
Rad. rhei ʒj.
M. f. pulvis.

S. Täglich 2—3mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Bei Verstopfung der Eingeweide und grosser Neigung zu Rückfällen des Wechselfiebers. Soll das Fieber damit unterdrückt werden, so muss man 4—5mal einen Theelöffel nehmen lassen.

Radius.

1176. *Rx.* Cort. chinae reg. ℥j
Ammon. muriat. ʒiv.
M. f. pulvis.

S. Aller 1—3 Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

1177. *Rx.* Cort. peruvian. subt. pulv. ʒj
Ferri ammoniati gr. ij
Flor. cassiae gr. j.
M. f. pulv. D. tal. dos. viij.

S. Täglich 3—4mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen Wechselfieber, besonders viertägige, wenn man es mit muskelschwachen Personen zu thun hat.

Baglivi.

1178. *Rx.* Pulv. cort. chinae ʒj
 Ammonii muriat. martiat. gr. ij.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij. D. ad chart. cerat.

S. Täglich 4 Stück zu nehmen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Selle.

1179. *Rx.* Cort. peruvian. reg. ʒvj
 Elaeosacchar. Flav. aurant. ʒiij
 Tinct. opii croc. gutt. xxiv.
 M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. In der Apyrexie zweistündlich 1 Pulver.

Anwend Gegen einfach nervöse Wechselfieber.

Berends.

1180. *Rx.* Cort. chinae fusc. ʒvij
 „ cinnamom. ʒj.
 M. f. pulv. Div. in part. xij aequal.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. In der Apyrexie von einfachen Wechselfiebern.

Marcus.

1181. *Rx.* Pulv. cort. peruvian. ʒj
 „ rad. rhei ʒj
 Ammon. muriat. ʒj.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

D. S. Aller 2 Stunden ein Pulver.

Anwend. In gleichen Fällen.

Richter.

1182. *R.* Cort. peruvian. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Tart. emetic. gr. ij
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{j}$.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Pulveres antifebriles resolventes Brerae.

Anwend. Gegen Wechselfieber aus gastrischen Ursachen und bei Neigung zu Verstopfung der Eingeweide.

Brera.

1183. *R.* Pulv. cort. chinae fusc. $\mathfrak{z}\text{vj}$
 Tartari depur. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. pulvis.

S. Täglich 2mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Colica flatulenta.

Vogler.

1184. *R.* Cort. peruvian. select. $\mathfrak{z}\beta$
 Rad. gentian. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Ammon. muriat. dep. $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

D. S. Aller 2 Stunden zur fieberfreien Zeit ein Pulver.

Anwend. Zur Unterdrückung viertägiger Wechselfieber wird diese Verordnung gewöhnlich 2—3mal wiederholt.

v. Hildenbrand.

1185. *R.* Cort. peruvian. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Rad valerian. $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Alle Stunden 1 Pulver.

Pulveres antifebriles compositi Brerae.

Anwend. Gegen Wechselfieber bei zugleich vorhandenen Nervenzufällen, wie heftiger Frost, sehr empfindlicher Kopfschmerz u. s. w.

Brera.

1186. *Ry.* Cort. chinae reg. 3j
 Rad. serpentar.
 Ammon. muriat. mart. āā gr. vj
 Elaeosacch. menthae crisp. ʒj.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. viij.

S. In der fieberfreien Zeit zu verbrauchen, so dass das letzte Pulver 3 Stunden vor dem nächsten Anfalle genommen wird.

Anwend. Man giebt zur ersten Gabe 1, zur zweiten 2 u. so fort, zu jeder einen Tropfen Laudanum mehr, zur achten aber 12 Tropfen. Nicht leicht soll ein Wechselfieber diesem Mittel widerstehen.

Schmidtman.

1187. *Ry.* Cort. peruvian. ʒjß
 Rad. ari
 „ hellebor.
 „ gentian. rubr. āā ʒij.
 M. f. pulvis.

S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ —1 Quentchen.

Berliner Fieberpulver.

Anwend. Gegen rebellische Wechselfieber

Jahn.

1188. *Ry.* Cort. chinae opt. ʒj
 Antimon. crudi dep. gr. v—xx.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. Täglich 2—3 Pulver.

Anwend. Gegen Ueberbleibsel von rheumatischen Krankheiten mit Kachexie verbunden; gegen Wechselfieber.

F. Hoffmann. Lentin. Jahn.

1189. *Ry.* Cort. peruvian. opt.
Tartari depur. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij.
M. f. pulvis.

S. Täglich 2—3mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen hartnäckige Leibesverstopfung von Schläffheit der Gedärme oder Krämpfen, bei Hypochondristen, Hysterischen, Schwangeren, unterdrücktem Monats- und Hämorrhoidalflüsse.

Voyers.

1190. *Ry.* Pulv. chinae opt. $\bar{3}$ j
Syrup. cort. aurant. q. s. ut f. electuar.

S. Alle Stunden 1 reichlichen Theelöffel voll und 1 Löffel Wein nachzutrinken.

Tode's Fieberlattwerge.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Tode.

1191. *Ry.* Pulv. cort. peruvian. fusc. $\bar{3}$ vj
Ammon. muriat. depur. $\bar{3}$ ij
Pulv. cinnamon. $\bar{3}$ j
Syrup. cort. aurant. $\bar{3}$ ij.
M. f. electuar.

S. Täglich 4mal einen gehäuften Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Wechselfieber und manche andere Nervenkrankheiten.

Vogt.

1192. *Ry.* Cort. chinae reg. subt. pulv. $\bar{3}\beta$
Rad. calam. decort. pulv. $\bar{3}\beta$
Oxymell. scillit. $\bar{3}\beta$

Succi juniper. inspiss. $\bar{3}$ ij

Aquae commun. q. s.

ut f. electuar.

D. S. Umgerührt, aller 2—3 Stunden 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht und Wechselfieber.

A. G. Richter.

1193. *Ry.* Pulv. cort. chinae $\bar{3}\beta$
Summitat. arnicae pulv.

Rad. serpentar. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ijj

Syrup. cort. aurant. $\bar{3}$ vj.

M. f. electuar.

D. S. Alle Stunden 1 Kaffeelöffel.

Anwend. im Typhus acutus und in der Febris nervosa lenta.

Stoll. Collin.

1194. *Ry.* Pulv. chinae reg. $\bar{3}$ j
„ rad. zingib. gr. xv—xx
Vini gall. rubr. $\bar{3}$ vijj
Sacchari albi $\bar{3}$ j.

M. S. Umgeschüttelt, binnen 8 Stunden zu verbrauchen.

Anwend. Bei böartigen, bald zu unterdrückenden Wechselnfebern. Man fängt damit bei Abnahme des Schweisses an und lässt eine Stunde vor dem neuen Anfalle Opii gr. j nehmen.

C. G. Neumann.

1195. *Ry.* Cort. peruv. opt. $\bar{3}$ j
Flaved. cort. aurant. $\bar{3}$ ij—ijj.

C. C. S. Mit einer Flasche Wein aufzugießen und täglich 1—2 mal 1 Weinglas voll zu gebrauchen.

Anwend. Gegen Wechselfieber und nach erschöpfenden Krankheiten.

1196. *Ry.* Cort. peruv. opt. $\mathfrak{Zj}$
Rad. valerian. $\mathfrak{Z}\beta$.

C. C. S. Mit $\mathfrak{Qj}$ heissen Wassers aufzugiessen, einen Tag an der Sonne oder einem mässig warmen Orte ziehen zu lassen und 2mal täglich ein Spitzglas voll zu nehmen.

Anwend. Nach erschöpfenden Krankheiten mit Neigung zu Unterleibskrämpfen.

Radus.

1197. *Ry.* Cort. peruvian. $\mathfrak{Zj}$
Rad. gentian.
Clavell. cinnam. $\overline{aa}$ $\mathfrak{Ziij}$
Spirit. vini gall. $\mathfrak{Zviiij}$.

M. Digere per xxiv hor. et dein cola.

S. Täglich 2—3mal 1 Löffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Atonie der Gedärme, Kachexieen und Schwächekrankheiten ausgezeichnet.

Augustin.

1198. *Ry.* Pulv. chin. fusc. $\mathfrak{Z}\beta$
„ fol. sabinae $\mathfrak{Zj}$.
Infunde cum aquae ferv. q. s. Colat. $\mathfrak{Zx}$ admisce
Borac. venet. $\mathfrak{Zj}\beta$.

D. S. Dreimal täglich 1 Esslöffel voll.

Anwend. Bei Selbstschwächung. Dabei täglich kalte Waschungen der Genitalien und des Rückgrats und spirituöse Einreibungen desselben.

Kopp.

1199. *Ry.* Cort. peruvian. $\mathfrak{Zj}$.
Coque cum
Aquae font. $\mathfrak{Qj}$ ad colat. $\mathfrak{Ziv}$. Adde
Succi citri rec. $\mathfrak{Ziij}$
Vini rhenani
Syrup. berberid. $\overline{aa}$ $\mathfrak{Zj}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Faulfieber.

Vogel.

1200. *Rx.* Cort. chinae fusc. $\mathfrak{z}\beta$.

Coque cum

Acid. sulph. dil. $\mathfrak{z}\beta$ et Aquae font. q. s.

ad colat. $\mathfrak{z}\text{vj}$. Sub finem coct. adde

Sem. phellandr. aquat. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

Refrig. adde

Extr. dulcamar. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Syrup. balsam. peruv. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Zweistündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen eiterige Lungenschwindsucht mit nächtlichen Schweissen.

Sobernheim.

1201. *Rx.* Cort. chinae reg. pulv. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Coque cum

Aquae comm. $\mathfrak{z}\text{xij}$ ad rem. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Colat. adde

Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Aller 3 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

1202. *Rx.* Cort. peruv. reg. $\mathfrak{z}\beta$.

Coque ex

Aquae dest. simpl. $\mathfrak{z}\text{ix}$ et Acid. sulph. dilut. $\mathfrak{z}\text{j}$

ad rem. col. $\mathfrak{z}\text{vj}$. Refrig. adde

Spirit. sulphurico-aether. $\mathfrak{z}\text{j}$.

S. Esslöffelweise.

Anwend. Gegen Wechselfieber; als Stärkungsmittel.

Kretzschmar.

1203. *Rx.* Decoct. cort. chinae fusc. ($\mathfrak{z}\text{j}$) $\mathfrak{z}\text{viiij}$

Extr. cort. chin. fusc. $\mathfrak{z}\beta$

Syrup. cort. chin. fusc. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In gleichen Fällen.

P. Frank.

1204. *Ry.* Extr. cort. peruvian. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aquae cinnam. vinos. $\mathfrak{z}\text{xiv}$.

S. Morgens und Abends 60 Tropfen in Wein zu nehmen.

Anwend. Zur Stärkung.

Tode.

1205. *Ry.* Extr. cort. peruvian. frig. par. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aquae flor. aurant. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Aether. sulphur. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. Aller 3 Stunden 20—60 Tropfen.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Berends.

1206. *Ry.* Extr. cort. peruvian. frig. par. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Gummi mimos. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aquae destill. $\mathfrak{z}\text{iiij}$
 Spirit. muriat.-aeth. $\mathfrak{z}\beta$
 Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{z}\text{j}$.

S. Alle Stunden 2 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen brandige Aphthen.

Lentin. Wendt.

1207. *Ry.* Extr. chinae
 Tinct. cinnam. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$
 Syrup. cynosbat.
 Aquae flor. naphae $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

M. S. Esslöffelweise zu nehmen.

Anwend. Bei passiven Hamorrhagieen.

Edwards et Vavas seur.

1208. *Ry.* Pulp. tamarind. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Extr. chinae fusc. frig. par. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Elaeosacch. citri $\mathfrak{Z}\text{vj}$
 Aether. acetic. $\mathfrak{Z}\text{j}$.
M. f. electuar. D. in pyx. epist. subereo clausa.
S. Zweistündlich 1 Theelöffel.
Anwend. Nach den Anfällen von Melaena.

Sundelin.

1209. *Ry.* Decoct. chinae ($\mathfrak{Z}\beta$) $\mathfrak{Z}\text{iv}$
 Vitell. ovi j
 Pulv. chinae reg. subtil. $\mathfrak{Z}\text{iiij}$
 Tinct. opii croc. gutt. xij.
M. S. Klystier.
Anwend. Gegen bössartige, larvirte oder komitirte Wechsel-
 fieber.

Berends.

1210. *Ry.* Extr. cort. peruvian. $\mathfrak{Z}\text{ij}$
 Aquae destill. $\mathfrak{Z}\text{iv}$.
 Olei olivar. $\mathfrak{Z}\beta$
 Tinct. opii simpl. gutt. xij.
M. S. Klystier.
Anwend. Gegen Wechselstieber, wenn der Kranke keine China
 nehmen kann.

Lind.

1211. *Ry.* Infus. flor. chamomill. $\mathfrak{Z}\text{iv}$
 Asae foetid. vitell. ovi subact. $\mathfrak{Z}\text{j}$
 Pulv. cort. peruvian. $\mathfrak{Z}\beta$.
M. S. Klystier.
Anwend. In Fällen, wo gastrisch-gallige Fleber in hyper-
 sthenische Fieber ausarten; auch in perniciosen Wechsel-
 fiebern.

1212. *Rx.* Pulv. chinae $\mathfrak{z}\text{j}$
Aquae communis $\mathfrak{g}\text{j}$.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Zur Reinigung von Fisteln und kalten Abscessen;
zuweilen setzt man Laud. liq. Syd. $\mathfrak{z}\beta$ zu.

Hôtel-Dieu.

1213. *Rx.* Camphor. trit. gr. vj
Gummi mimos. pulv. $\mathfrak{z}\beta$.
Terendo sensim misce cum
Aquae salviae $\mathfrak{z}\text{viiij}$.
F. l. a. emulsio, in qua solve
Extr. chinae fusc. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

D. S. Umgeschüttelt einzuspritzen.

Anwend. Gegen brandige Halsentzündung bei Kindern

Wendt.

1214. *Rx.* Cort. peruvian. rud. pulv. $\mathfrak{z}\text{j}$.
Coque cum
Aquae font. $\mathfrak{z}\text{xij}$. Colat. $\mathfrak{z}\text{xj}$ post refrigerat.
adde
Vini rubri $\mathfrak{z}\text{ij}$
Alumin. crud. $\mathfrak{z}\text{j}$

D. S. Täglich 3mal 2 Esslöffel einzuspritzen.

Anwend. Gegen atonische Medorrhoea und Atonie der Vagina.

1215. *Rx.* Cort. chinae fusc. $\mathfrak{z}\text{j}$
Rad. rhei $\mathfrak{z}\text{ij}$.
Coque cum
Aquae comm. q. s. per $\frac{1}{2}$ hor. ad col $\mathfrak{z}\text{iv}$,
cui adde
Bals. peruvian. c. muc. gummi arab. subact. $\mathfrak{z}\text{ij}$
Extr. aloes aquos. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Mit Charpie zum Verbande.

Anwend. Gegen atonische Fussgeschwüre.

Vogt.

1216. *Rx.* Decoct. chinae ℥ij
 Infus. chamomill. rom. ℥j
 Spirit. camphorat. ℥ij
 Acid. hydrochloric. ℥j.

M. S. Zum Ueberschlagen.

Anwend. Gegen Brand und faulige Geschwüre.

Edwards & Vavasseur.

1217. *Rx.* Cort. peruvian. fusci ℥ij
 „ cinnamon.
 Herbae salviae
 Caryophyllor. aromat. aa ℥β.

C. M. S. In ein Säckchen locker einzubinden, und mit 3 Schoppen Branntwein und 1 Schoppen Essig auf Kohlen zu erwärmen. Sobald die Species gehörig ausgezogen und hinlänglich erwärmt sind, werden Flanelltücher in die Flüssigkeit getaucht und warm übergelegt.

Anwend. Bei atonisch-krampfhafter Metrorrhagie.

Vogt.

1218. *Rx.* Gummi asae foetid. ℥β.
 Solve l. a. et adde
 Decoct. cort. chinae ℥iv
 Infus. flor. chamomill. ℥vj
 Alcohol. vini ℥β.

M. S. Zum Bähnen.

Anwend. Bei beginnendem kalten Brande und bei eintretender Fäulniss, theils zur Verhütung, theils um den Fortschritten desselben Einhalt zu thun.

Brera.

1219. *Rx.* Extr. chinae frig. par. ℥ij
 Aquae rutae ℥ij

Spirit. muriat.-aether. ℥ij
Mellis rosat. ℥j.

M. S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen brandige Bräune.

Wendt.

1220. *Ry.* Cort. chinae fusc. gross. pulv. ℥β.

Coque cum

Aquae comm. ℥vijβ ad colat. ℥iv, cui refrigerat.
adde

Tinct. myrrhae ℥j

Spirit. cochlear. ℥ij

Mellis rosat. ℥β.

M. D. S. Mundwasser.

Anwend. Umgeschüttelt, bei brandiger Halsentzündung der
Kinder einzuspritzen.

Wendt.

1221. *Ry.* Cort. peruvian. ℥j.

Coque cum

Aquae font. ℥xviiij ad col. ℥xij. Solve

Alumin. pur. ℥j

Mellis rosat. ℥jβ.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Bei Erschlaffung des Zäpfchens.

Montmahou.

1222. *Ry.* Cort. peruvian. fusc. rud. pulv. ℥iij—vj.

S. Mit einem Maasse Wasser zu kochen und durch-
zuseihen und eine solche Portion zu einem Bade
zu schütten.

Anwend. Gegen Wechselfieber kleiner Kinder.

Stiebel.

1223. *Ry.* Decoct. mali granat. ℥iv
 „ cort. chinae ℥ij
 Zinci sulphur. ʒjβ
 Alcohol. opiat. ʒj.

M. S. Zum Bade.

Anwend. Bei äusserlichen Hämorrhoiden, die sehr erschlaßt sind und zu viel Blut geben, bei Vorfall des Mastdarms, bei Blutfluss der Harnröhre und Blennorrhöe der Mutterscheide aus Schwäche.

Brera.

1224. *Ry.* Cort. peruvian.
 Carbon. vegetab. āā ʒβ
 Cort. salic. laur.
 Rad. calami aromat. āā ʒij.
M. f. pulvis.

S. Mit Wein zum Breiumschlage zu machen.

Anwend. Auf brandige Stellen und brandige Geschwüre.

Berends.

1225. *Ry.* Cort. peruvian. pulv. ʒjβ
 Camphorae ʒjβ
 Farin. sem. lini ʒβ
 Vini rubri q. s. ut f. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. In ähnlichen Fällen.

Berends.

1226. *Ry.* Farin. hordei ʒiv
 Pulv. cort. peruvian. ʒj
 Camphorae ʒj
 Aquae fervid. q. s. ut f. cataplasma.

S. Umschlag.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

1227. *Ry.* Pulv. chinae
 „ rutae
 Alcohol. camphorat. āā ʒv
 Camphor. pulv. ʒj
 Aceti q. s. ut f. cataplasma.

S. Umschlag.

Cataplasma antisepticum Reussii.

Anwend. Bei brandigen Geschwüren.

Reuss.

1228. *Ry.* Cort. peruvian. alcohol.
 Carbon. ligni tiliae āā ʒjß.
 M. f. pulvis.
D. S. Dick aufzustreuen.

Anwend. Auf brandige und faulende Geschwüre und Theile. :

Vogt.

1229. *Ry.* Cort. peruvian.
 Sacchari albi āā ʒß
 Camphorae ʒj.
 M. f. pulvis.

D. S. Zum Einstreuen.

Anwend. Auf schlaffe Geschwüre.

1230. *Ry.* Cort. peruvian. alcohol. ʒij
 Myrrhae elect. ʒß
 Camphorae ʒij.
 M. f. pulvis.

S. In die Einschnitte einzustreuen und nachher mit Weingest zu befeuchten.

Anwend. Gegen Brand.

Vogt.

1231. Rx. Pulv. cort. chinae rubr. 3j.

Subigat. cum

Olei amygdal. dulc. 3vj.

Deinde teratur ad refrigerat. usque in mortario cum

Medull. bovin. praep. et liquef. 3vj.

S. Zum äusseren Gebrauch.

Anwend. Zur Beförderung des Haarwuchses nach erschöpfenden Krankheiten.

1232. Rx. Cort. chinae rubr. subtiliss. pulv. 3j

Olei amygdal. dulc. 3ij.

Medull. bovis liquef. et colat. 3vj.

Tere usque ad perf. refriger. Sub finem adde

Olei bergamott. gutt. vj

Bals. peruvian. gutt. xx.

D. in olla alba.

S. Pomade.

Anwend. Gegen das Ausfallen der Haare.

Aubergier.

1233. Rx. Extr. chinae 3ij

Olei amygdal. dulc. 3iij

„ nucis moschat. 3ij.

M. f. unguent.

S. Haarpomade.

Anwend. — Gegen Kahlheit.

Naumann.

1234. Rx. Camphor. c. spir. vini trit.

Myrrhae pulv. āā 3j—ij

Cort. chinae fusc. pulv.

Carbon. ppt.

Unguent. de styrace āā 3vj

Olei terebinth. rectific. q. s.
ut f. unguent.

D. S. Verbandsalbe.

Anwend. Bei fauligen und brandigen Geschwüren.

Rust.

1235. *Rx.* Cerat. simpl. 3j
Extr. chinae spir. in alcohol. quant. parva dis-
soluti 3j.
M. triturando.

S. Zum Verbande.

Anwend. Bei Geschwüren, welche brandig zu werden drohen.

1236. *Rx.* Cort. chinae fusc. 3vj
Ligni santal. rubr. 3ij
Olei caryophyllor.
„ bergamott. āā gutt. iij.
M. f. pulv. subtiliss. D. in scatula.
S. Zahnpulver.

Hufeland.

1237. *Rx.* Cort. chinae fusc. 3β
Rad. calami decort.
„ irid. flor. āā 3ij
Myrrhae
Sanguin. dracon. āā 3j
Olei caryophyllor. gutt. xij.
M. f. pulv. D. ad scatulam.
S. Zahnpulver.

Chinae Tinctura composita; zusammengesetzte Chinatinktur.

(*Elixir roborans s. Roberti Whyttii*; *Whytt'sches Magen- oder stärkendes Elixir*.)

Form u. Gabe. Rein, auf Zucker oder auch in Mischung, 30—80 Tropfen, 2—3 mal.

Anwend. Ein vortreffliches Stärkungsmittel nach erschöpfenden Krankheiten.

Chinium; Chinin.

(*Chininum, Kinin, Quinin*.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Auflösung, zu gr. $\frac{1}{4}$ —v—x, 1—4 mal täglich. Aeusserlich endermatisch wie die Chininsalze.

Man vermeide Verbindungen mit Salzbildern, salpetersaurem Quecksilber- und Silberoxyd, salzs. Gold, Gerbestoff; für concentrirte wässerige Lösungen auch Alkalien.

1238. *Ry.* Chinii gr. viij
Spirit. vini rectificatiss. $\overline{3}\beta$
Aether. sulphur. $\overline{3}\beta$.

S. S. Täglich 2—3 mal 20—60 Tropfen.

Anwend. Gegen Nervenschwäche.

Phöbus.

1239. *Ry.* Chinii $\mathfrak{J}$
Alcohol. $\overline{3}\beta$.

S. S. Aller 2 Stunden 20—40 Tropfen.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Riecke.

Chinium aceticum; essigsaures Chinin.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lösung, Saft, zu gr. β —iv, 2—5mal täglich. Endermatisch und anatripsologisch, gr. ij—vj, 1—3mal. Klystier, Schnupfmittel, überhaupt wie *Chinium sulphuricum*.

Man vermeide, ausser den bei Chinium angezeigten Verbindungen, auch Alkalien, alkalische Erden, weinsteins. Alkalien, Sublimat, Weinsteinsäure.

Chinium citricum; citronsaures Chinin.

Form u. Gabe. Wie bei dem vorigen. In Sicilien besonders gebräuchlich.

Chinium muriaticum; salzsaures Chinin.

Form u. Gabe. Wie bei dem vorigen.

1240. *Ry.* Chinii muriatici $\mathfrak{z}$ j
Aquae menthae pip. l. cinnam. $\mathfrak{z}\beta$.

S. S. Aller 2 Stunden 20—60 Tropfen.

Anwend. Gegen Wechselfieber bei Kindern, bei nervösem Rheumatismus.

Wutzer.

1241. *Ry.* Chinii muriatici gr. viij
Aquae foeniculi $\mathfrak{z}\nu$
Spirit. muriat.-aeth. $\mathfrak{z}$ j
Sacchari albi $\mathfrak{z}\beta$.

S. S. Aller 2 Stunden einen reichlichen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Spielmann.

1242. *Ry.* Pulv. rad. scillae gr. vj
 Opii pur. gr. xij
 Chinii muriat. gr. xxxvj
 Elaeosacch. menthae 3ij.

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Täglich 3—4mal ein Pulver.

Anwend. Bei Geschwulst nach Wechselfiebern.

C. G. Neumann.

Chinium phosphoricum; phosphorsaures Chinin.

Form u. Gabe. Wie bei dem vorigen.

Chinium sulphuricum; schwefelsaures Chinin.

(Sulphas quinicus.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lösung
 Saft, zu gr. β—x—xx in 24 Stunden. Aeusserlich en-
 dermatisch und anatripsologisch, zu gr. ij—vj, 1—3mal;
 in Klystieren, zu gr. iv—x, 1—2mal; in Schnupfpulver.

Zu vermeiden sind dieselben Verbindungen, welche un-
 ter Chinium aceticum angegeben sind.

1243. *Ry.* Chinii sulphur. gr. iiij—xij
 Sacchari albi 3ij.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Früh und Abends 1 Pulver.

Anwend. Gegen Nervenschwäche, Wechselfieber. Am besten
 in schwarzem Kaffee zu nehmen.

Radius.

1244. *Rx.* Chinii sulphur. gr. iv
 Pulv. rad. belladonnae gr. j
 Flaved. cort. aurantior ꝰj.
 M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

S. Während der fieberfreien Zeit zu verbrauchen.

Anwend. Gegen hartnäckige, veraltete, häufige Rückfälle machende Wechselfieber.

v. Stosch.

1245. *Rx.* Chinii sulphur. gr. ij — vj
 Morphii acetic. gr. ß — j
 Sacchari albi. xj
 M. f. pulv. Div. in ij — iv part. aequal.

S. Vor dem Anfalle in halbstündigen oder stündigen Zwischenräumen.

Sedillot verordnet gr. xij — xx Chinin.

Anwend. Gegen hartnäckige Wechselfieber.

Magendie.

1246. *Rx.* Chinii sulphur. gr. x
 Tart. emetic. gr. iij.
 M. exacte. Div. in vj part. aequal.

S. In der fieberfreien Zeit aller 2 Stunden 1 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen hartnäckige Wechselfieber. Die erste Gabe macht meist Erbrechen.

Gola.

1247. *Rx.* Opii gr.
 Chinii sulphur. gr. iij
 Sacchari albi

Gummi mimos. āā gr. vj.

M. f. pulvis.

D. S. Kurz vor dem Anfalle zu nehmen.

Anwend. Bei böartigen Wechselfiebern.

Neumann.

1248. *Ry.* Chinii sulphur. gr. xij — xvij

Tart. stibiat. gr. j — iß

Pulv. stomachici

Sacchari albi āā 3j — jß.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Viermal täglich ein halbes Pulver.

Anwend. Nebst Kalmusaufguss gegen Wechselfieber.

Hellmer.

1249. *Ry.* Chinii sulphur. gr. j

Cort. chinae opt. gr. xv

Rad. rhei

Elaeosacchari menth. āā gr. v.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. In der fieberfreien Zeit aller 2 Stunden ein Stück.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

M. E. A. Naumann.

1250. *Ry.* Chinii sulphur. gr. j

Pulv. rad. ipecacuanh. gr. $\frac{1}{3}$

Sacchari albi gr. v.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Täglich 3mal 1 Stück.

Anwend. Gegen habituellen Kopfschmerz, der mit Anomalieen der gastrischen Absonderungen, doch ohne Saburra und Verstopfung zusammenhängt.

M. E. A. Naumann.

1251. *Ry.* Chinii sulphur. gr. ij
 Ferri sulphur. cryst. gr. j.
 Semin. foenicul. $\mathfrak{z}$ j
 Olei chamomill. citrati gutt. j.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj in charta cerata.

S. *Aller 3 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Bei einem hartnäckigen Wechselfieber.

Phöbus.

1252. *Ry.* Chinii sulphur. gr. iij
 Ferri oxydat. fusc. $\mathfrak{z}\beta$
 Rad. liquirit. gr. xij
 Olei menth. crisp. gutt. j
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij. D. in charta cerata.

S. *Täglich 4mal ein Pulver.*

Anwend. Gegen Blennorrhoea urethrae secundaria mit allgemeiner Schwäche.

Otto.

1253. *Ry.* Chinii sulphur. gr. $\frac{1}{4}$
 Chocolat. gr. vij
 Sacchari lactis gr. ij.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

S. *Aller 3 Stunden 1 Stück.*

Anwend. Gegen Magenschwäche und Mangel an Esslust.

Kopp.

1254. *Ry.* Chinii sulphur. gr. j — ij.
 Natri carbon. gr. iv — v
 Sacchari albi $\mathfrak{z}$ j.
 M. f. pulv. Disp. tal. dos. vj ad chartam ceratam.

S. *Früh und Abends 1 Stück.*

Anwend. Gegen scrofulöse Augenentzündung.

v. Ammon.

1255. *Ry.* Chinii sulphur. gr. x — xv
 Acidi phosphor. sicc. ℥ij
 Pulv. rad. althaeae (rhei) ℥iv
 Extr. centaurei min. ℥ij.
 M. f. pil. No. Lx. Consp. irid. flor. D. ad
 vitrum.
*S. Täglich 2 — 3mal 3 — 4 — 6 Stück zu
 nehmen.*

Anwend. Bei Nervenschwäche mit Neigung zu Blutungen, wie
 z. B. nach Fehlgeburt öfters beobachtet wird.

Radius.

1256. *Ry.* Chinii sulphur. ℥j
 Succ. liquirit. ℥ij
 M. f. pil. No. xxx. Consp. lycop.
S. Aller 2 — 3 Stunden 1 — 2 Stück.

Anwend. Gegen nervöse Krankheiten, [Krampfhusten, Wech-
 selfieber.

1257. *Ry.* Chinii sulphur. gr. xij
 Extr. trifol. fibr. ℥j
 Pulv. rad. calam. aromat. q. s
 ut f. pil. No. xij. Consp. cinnam.
S. Aller 2 Stunden 1 — 2 Stück.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

v. Hildenbrand.

1258. *Ry.* Chinii sulphur. pulv. gr. xv
 Cinnam. acut. pulv. ʒß
 Extr. chinae reg. q. s.
 ut f. pil. xxx. Consp. cinnam.
D. S. Aller 2 — 4 Stunden 4 Stück zu nehmen.

Henschel.

1259. **R.** Chinii sulphur. gr. iij — vj
 Aquae rub. idaei l. chamom. $\bar{3}v$
 Syrup. rub. idaei l. ceras. nigr. $\bar{3}j$
 Acidi sulphur. dilut. $\bar{3}\beta$ — j — $\bar{3}\beta$.

S. S. *Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Bei Nervenschwäche, Neigung zu Blutflüssen aus Schwäche; Blutfleckenkrankheit.

Radius.

1260. **R.** Chinii sulphur. gr. iv — xvj
 Succ. citri gutt. x — xx
 Sacchari albi $\bar{3}\beta$
 Aquae destill. $\bar{3}ij$.

S. S. *Aller 2 Stunden 1 Theelöffel.*

Anwend. Gegen Wechselfieber bei Kindern von 2 — 5 Jahren.

Beach.

1261. **R.** Chinii sulphur. $\bar{3}j$.
 Elaeosacchari menth. pip. $\bar{3}ij$
 Acidi sulphur. dil. $\bar{3}\beta$
 Aquae laurocerasi $\bar{3}\beta$.

S. S. *Aller 2 Stunden 10 — 20 Tropfen in der fieberfreien Zeit zu nehmen.*

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Phöbus.

1262. **R.** Chinii sulphur. gr. vj
 Kali acetici $\bar{3}j$
 Aquae foenicul. $\bar{3}iiij$
 Syrup. flor. aurant. $\bar{3}j$.

K. D. S. *In der Apyrexie aller 1—2 Stunden 1 Theelöffel voll.*

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Sundelin.

1263. *Ry.* Chinii sulphur. gr. xij
 Mixt. sulphur. acid. ʒß
 Aquae cinnam. simpl. ʒvj
 Syrup. cinnam. simpl. ʒj.

M. D. S. Esslöffelweise zu nehmen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Henschel.

1264. *Ry.* Chinii sulphur. gr. xvj
 Syrup. sacchari ʒviij.

S. S. Esslöffelweise.

Magendie's Chininsyrup.

Anwend. Gegen Wechselfieber, Scrofelsucht, Sechs Esslöffel sollen hinreichen ein einfaches Wechselfieber zu heilen.

Magendie.

1265. *Ry.* Chinii sulphur. gr. xij
 Vini madeirae l. malac. ʒxxxij.

S. S. s. n.

Magendie's Chininwein.

1266. *Ry.* Chinii sulphur. gr. vj
 Alcohol. 34° ʒj.

S. S. s. n.

Magendie's Chininalkohol.

Setzt man ʒij dieser Tinktur eine Pinte Wein zu, so hat man einen guten Chininwein.

Anwend. Als Stärkungsmittel, besonders bei Neigung zu Intermissionen im Befinden; Schläffheit der Verdauung; Scrofeln.

Magendie.

1267. *Ry.* Chinii sulphur. $\mathfrak{z}\beta$
 Pulv. rad. liquirit. gr. xij
 Gummi tragacanth. gr. vj
 Syrup. diacodii q. s. ut f. boli iij.

D. S. Während der Apyrexie in gleichen Zwischenräumen zu nehmen.

Anwend. Bei Wechselfieber.

Richard.

1268. *Ry.* Aethiop. martial. $\mathfrak{z}\beta$
 Chinii sulphur. gr. viij
 Extr. marrubii q. s.
 Fiant boli vj.

D. S. Aller 3 Stunden 1 Stück.

Anwend. Bei Bleichsucht, wo zugleich Amenorrhöe und Schwäche vorhanden ist.

Brera.

1269. *Ry.* Chinii sulphur. gr. xij.
 Subige c. vitell. ovi j
 Infus. calam. aromat. $\mathfrak{z}\text{viij}$
 Laud. liquid. Syd. gutt. xij.

M. S. Klystier.

Anwend. Gegen hartnäckige Wechselfieber, oder in Fällen, wo die China durch den Mund nicht vertragen wird.

Former.

1270. *Ry.* Chinii sulphur. gr. xv
 Tabac. sternutator. commun. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 M. f. pulvis.

S. Schnupfpulver. Innerhalb 5 — 6 Tagen zu verbrauchen.

Anwend. Gegen intermittirende Kopfschmerzen.

D' Huc.

Chinium tannicum; gerbstoffsaures Chinin.

(*Tannas Chinii s. quinicus*; gerbsaures, tannin-saures Chinin.)

Form u. Gabe. Wie bei dem vorigen.

1271. *Ry.* Chinii tannici
 Piperis nigri pulv.
 Extr. absinth. $\overline{aa}$ 3ß.
 M. f. pil. xxx. Consp. lycop.
S. Aller 3 Stunden 3 Stück.
Anwend. Gegen Wechselfieber.

Ronander.

Chinioïdinum. Chinioïdin.

(*Chininum resinosum*; resinöses Chinin Sert.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lösung, zu gr. j—xx, einigemal täglich; Tinktur 30—40 Tropfen, 2—6mal.

Dieselben Verbindungen wie bei Chinium zu vermeiden.

1272. *Ry.* Chinioïdini 3ß
 Spirit. vini rectific. 3iv.
 Solve leni calore.
S. In der fieberfreien Zeit $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel voll
 aller 1—2 Stunden mit etwas rothem Wein zu
 nehmen.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Sertürner. Berndt.

1273. *Ry.* Chinioïdini 3j
 Spirit. vini alcohol. 3j.

S. S. Täglich einigemal einen mässigen Theelöffel mit etwas rothem Wein oder Zucker zu nehmen.

Tinctura Chinioïdini Ph. Hamb.

Anwend. Gegen Wechselfieber oft hülfreicher als das Chinin befunden.

Radius.

1274. *Ry.* Acid. Halleri 3j
 Tinct. chinioïdini
 Aquae menthae pip. aa 3j.

M S. Theelöffelweise nach Verordnung.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Bei eintägigem Fieber aller 2 Stunden 1 Theelöffel, nach vollständig ausgebrochenem Scheweisse zu beginnen; bei dreitägigem Fieber eben so aller 3 Stunden; bei viertägigem Fieber aller 4 Stunden eine solche Gabe. Bei Kindern statt des Wassers einen Saft.

Natorp.

1275. *Ry.* Chinioïdini ʒj
 Elaeosacch. carvi 3ß.
 M. f. pulv. Div. in part. xij aequal.

D. S. Aller 2—3 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Elwert.

1276. *Ry.* Chinioïdini ʒj
 Opii puri gr. j

Elaeosacch. calami l. carvi $\overline{3}\beta$.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

D. S. Wie das vorige.

Anwend. Gegen Wechselfieber. Bei Trägheit des Darmkanals mit Rad. rhei $\overline{3}j$.

Elwert.

1277. *Ry.* Chinii sulphur.
Chinioïdini $\overline{aa}$ gr. j
Pulv. rad. belladonn.
Laudan. crud. $\overline{aa}$ gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$
Pulv. aromat. gr. viij.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. xx.

S. In der fieberfreien Zeit aller 2 Stunden ein
Pulver.

Anwend. Bei Wechselfiebern.

Nevermann.

1278. *Ry.* Chinioïdini
Cort. chinae reg. $\overline{aa}$ $\overline{3}j$.
F. c. paux. Spirit. vini pil. No. xxx.
Consp. canell. albi.

S. Aller 2 Stunden 3—5 Stück.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

Radius.

Cinchonium; Cinchonin.

*(Cinchoninum, Cinchonia; Cinchonstoff.)*Form u. Gabe. *Wie bei dem vorigen.*Cinchonium sulphuricum; schwefel-
saures Cinchonin.*(Sulphas cinchonicus; Cinchoninsulphat.)*Form u. Gabe. *In Pulver, Pillen, Saft, Lösung,
zu gr. ij—x, einigemal täglich.*Man vermeide Verbindungen mit Salzbildern, Alkalien,
alkalischen Erden, Alkaloiden, weinsteins. Alkalien, salzs.
Gold, Gerbestoff.1279. *Ry.* Cinchon. sulphur. gr. xij

Sacchari albi ℥iv.

*M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.**D. S. Aller 2—3—4 Stunden 1 Pulver in 1/2—1
Löffel Citronensaftsyrup.**Anwend. Gegen Wechselfieber.*1280. *Ry.* Cinchon. sulphur. gr. vj

Syrup. sacchari ℥iv.

S. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Magendie's Cinchoninsyrup.

*Anwend. Gegen Wechselfieber.***Magendie.**

1281. *Ry.* Cinchon. sulphur. gr. xxiv
Vini madeir. l. commun. $\bar{3}$ xxxij.

S. S. Aller 2 Stunden 1 reichlichen Esslöffel.

Magendie's Cinchoninwein.

Anwend. Wie der Syrup.

Magendie.

1282. *Ry.* Cinchonin. sulphur. gr. xij
Alcohol. 34° $\bar{3}$ j.

S. S. Theelöffelweise in Wein oder Thee.

Anwend. Wie das vorige.

Magendie.

1283. *Ry.* Cinchon. sulphur. gr. vj—iil

Kali acetici

Sacchari albiss. āā $\bar{3}$ β.

Solve in

Aquae chamomill. $\bar{3}$ vj.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Wechselfiebern, die nicht frei von gastrischer Komplikation sind.

Sundelin.

Chlori aqua. Chlorwasser.

(*Liquor Chlori, Acidum muriaticum oxygenatum, Aqua oxymuriatica; flüssiges Chlor.*)

Form u. Gabe. Rein, zu $\bar{3}$ j—iv, in Mischung; Säften, zu $\bar{3}$ β—j täglich. Aeusserlich zu $\bar{3}$ j.

Man vermeide Verbindungen mit andern Säuren und Salzen, organischen Substanzen und Licht.

1284. *Rx.* Aquae chlori ℥ij
 „ destill. ℥iij .

S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. Im zweiten Zeitraume nervöser Fieber.

Clemens.

1285. *Rx.* Aquae chlori $\text{℥β} — j$
 „ destill. simpl. $\text{℥ij} — iv$
 Syrup. althaeae ℥j .

M. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Scrofeln.

Cerutti.

1286. *Rx.* Aquae chlori ℥ij
 „ rub. idaei ℥jβ
 Mucil. semin. cydonior.
 Syrup. althaeae $\text{āā} \text{℥vj}$.

M. S. Alle 1 — 2 Stunden 1 — 1½ Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Reizfieber, besonders Scharlach und Zahnfieber, Mundfäule; für Kinder von 3 — 5 Jahren.

Kopp.

1287. *Rx.* Aquae chlori ℥ij
 Syrup. moror. ℥x
 Aquae rosar. ℥ij

M. S. Aller 2 Stunden 1 Kaffeelöffel voll.

Anwend. Gegen Mundfäule der Kinder, Man wischt den Saft mit dem Finger oder Pinsel im Munde herum und lässt ihn dann erst niederschlucken.

Kopp.

1288. R_y. Aquae chlori $\bar{3}$ ij — iv
Decoct. rad. althaeae $\bar{3}$ iiß.

M. S. Stündlich $\frac{1}{2}$ Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Magenerweichung der Kinder.

Blasius. Most.

1289. R_y. Aquae chlori $\bar{3}$ ß
Syrup. althaeae $\bar{3}$ i.

M. S. Pinselsaft.

Anwend. Gegen Aphthen.

1290. R_y. Infus. herb. salviae ($\bar{3}$ ß) $\bar{3}$ vj
Aquae chlori $\bar{3}$ ß
Mellis rosati $\bar{3}$ j.

M. D. S. Zum Ausspülen und Ausspritzen des Mundes.

Anwend. Bei asthenischen Aphthen und ähnlichen Halsentzündungen der Kinder.

Berends.

1291. R_y. Gummi tragacanth. gr. x.
Solve in
Aquae destill. $\bar{3}$ iv.
Adde
Aquae chlori
Syrup. simpl. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ß.

M. S. Zum Gurgeln

Anwend. Bei Geschwüren und chronischen Entzündungen in der hinteren Mundhöhlengend.

Maison de Santé — Paris.

1292. R_y. Aquae chlori $\bar{3}j$
 „ commun. $\bar{3}\beta$.

M. S. *Mittelst eines Pinsels aufzutragen.*

Anwend. Gegen hartnäckige Flechten.

Alibert.

1293. R_y. Aquae chlori
 „ destill. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}iv$.

M. S. *Waschwasser.*

1294. R_y. Olei olivar. $\bar{3}j$
 Aquae chlori gutt. LX.
 M. f. liniment.

S. *Wohlumgeschüttelt einzureiben.*

Anwend. Gegen hartnäckige Krätze, Kopfgrind und Kupfer-
 ausschlag.

Deimann. G. A. Richter.

1295. R_y. Aquae chlori $\bar{3}j$
 Axung. porci $\bar{3}j$
 M. triturando, ut f. unguent.

S. *Salbe.*

Anwend. Gegen Krätze.

Cinae semina. Zittwersamen.

*(Santonici sem.; Wurmsamen. Von Artemisia
 santonica L., Artemisia Contra L.)*

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge,
 Schüttelmixtur, Morsellen, Plätzchen, Confekt, zu $\bar{3}\beta - j$,
 mehrmals täglich; Aufguss $\bar{3}ij - iv$ auf $\bar{3}iv$ esslöffelweise.
 Aetherisches Extrakt in weiniger Lösung, Pillen, Bissen, zu
 gr. v — xv, einigemal. Aeusserlich Klystier, $\bar{3}ij - iv$.

1296. Ry. Pulv. sem. cinae 3j
 „ rad. Jalapae ʒß
 Hydrargyr. muriat. mit. gr. ij.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. iij.

S. *Früh und Abends ein halbes Pulver.*

Anwend. Gegen Spulwürmer. Für ein Kind von 6 Jahren drei Tage lang fortgesetzt.

Hufeland.

1297. Ry. Pulv. semin. cinae
 „ rad. jalapae āā ʒj
 Ferri sulphurici gr. ij.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. iij.

S. *Früh und Abends 1 Pulver.*

Anwend. Gegen Spulwürmer.

Hufeland.

1298. Ry. Semin. cinae 3ij
 Rad. jalapae
 Sacchari albi āā 3j.
 M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

D. S. *Aller 3 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Gegen Spulwürmer.

Schubarth.

1299. Ry. Ferr. sulphur. cryst. gr. iv
 Semin. cinae
 Rad. jalapae
 „ valerian. āā gr. vj
 Olei tanacet. aether. gutt. j.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. *Täglich 3mal 1 Pulver.*

Pu vis vermifugus Scholae clin. Lips.

Anwend. Gegen Spulwürmer.

Clarus.

1300. *Ry.* Ferri sulphur. gr. j—ij
 Rad. jalap. gr. iv
 „ valerian. min.
 Kali sulphuric. dep. āā ʒß
 Sem. cinae ʒj.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

D. S. Fünf- bis sechsmal täglich ein halbes Pulver.

Anwend. Gegen Spulwürmer. — Etwa für ein Kind von 6—8 Jahren; mit Syrup oder Saft anzurühren.

G. A. Richter.

1301. *Ry.* Flor. tanaceti
 Semin. cinae āā ʒj
 Ferr. sulphur. cryst. ʒij
 Olei valerian. gutt. x.

M. f. pulv. Div. in x part. aequal. D. in charta cerata.

S. Morgens und Abends 1 Pulver.

Anwend. Gegen Spulwürmer.

Rosenstein.

1302. *Ry.* Mellis puri
 Rad. jalap. āā ʒj
 Semin. cinae gr. x
 Ferri sulphur. gr. iv.

M. S. Auf einmal zu nehmen.

Electuarium anthelminthicum Rosensteinii.

Anwend. Gegen Wurmkrankheit.

Kindern giebt man nur einen Theelöffel voll am ersten Tage oder so viel, dass einigemal Oeffnung erfolgt.

Rosenstein.

1303. *Ry.* Semin. cinae $\bar{3}vj$
 Ferri sulphuric.
 Extr. cort. peruv. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
 Syrup. cinnam. q. s.
 ut f. electuar.

D. S. Zwei- bis dreimal täglich 1 Theelöffel voll zu geben.

Electuarium anthelminthicum Selii.

Anwend. Gegen Würmer.

Selle.

1304. *Ry.* Semin. cinae $\bar{3}\beta$
 Rad. valerian. minor. $\bar{3}j\beta$
 „ jalapae $\bar{3}j$
 Kali tartarici $\bar{3}ij$
 Oxymell. scillit. $\bar{3}vj$
 Syrup. commun. q. s.
 ut f. electuar.

D. S. Aller 2 — 3 Stunden 1 Theelöffel voll bis zur Wirkung.

Electuarium anthelminthicum Hufelandi.

Anwend. Gegen Würmer.

Hufeland.

1305. *Ry.* Rad. jalap. pulv. $\bar{3}\beta$ — $\bar{3}ij$
 „ valerian. min. pulv. $\bar{3}ij$
 Sem. cinae gr. pulv. $\bar{3}\beta$;
 Kali sulphuric. dep. pulv. $\bar{3}j\beta$ — $\bar{ij}$
 Oxymell. scillit. q. s.
 ut f. electuarium.

D. S. Umgerührt, 2 — 3mal täglich 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Electuarium anthelminthicum Bremseri.

Anwend. Gegen Würmer.

Bremser.

1306. *Ry.* Pulv. rad. valerian. min.
 „ „ filicis excort.
 „ sem. cinæ āā 3ij
 Mellis commun. q. s.
 ut f. electuar.

D. S. Umgerührt, 3stündlich 1 — 2 Theelöffel bis die ganze Portion 2 mal verbraucht ist; zugleich in den ersten 4 Tagen gegen Abend gr. j Calomel mit Zucker; nach Beendigung der Lattwerge aber ein starkes Purgans aus *Rad. jalapae*.

Electuarium anthelminthicum Ph. Hannov.

Anwend. Gegen Würmer.

1307. *Ry.* Rad. jalap. pulv. 3ß
 „ valerian. min. pulv. 3jß
 Sem. cinæ pulv. 3ß
 Extr. taraxac. liqu q. s.
 ut f. boli No. xxiv. Consp. pulv. macidis.

D. S. Täglich 4 mal 2 Stück. — Für ein Kind von 8 Jahren.

Anwend. Gegen Würmer.

Phöbus.

1308. *Ry.* Extr. tanacetī
 Sem. cinæ āā gr. vj
 Ferri sulphuric. gr. iv
 Resin. jalap gr. vj
 Olei tanacetī gutt. j.
 M. f. c. extr. absinth. pil. gr. ij—iij. Consp. cinnam.

D. S. Auf 1 — 2 mal zu nehmen.

Anwend. Gegen Wurmkrankheit Kindern giebt man 2 — 3 Stück bis zu erfolgender Wirkung.

Rosenstein.

1309. *Ry.* Pulv. sem. cinae $\mathfrak{z}\text{j}$
 Sacchari albi ad consist. tabulandi coct. q. s.
 F. morsuli xij.

S. Früh und Abends 1 Stück.

Tode's wurmtreibende Morsellen.

Anwend. Gegen Spulwürmer.

Tode.

1310. *Ry.* Semin. cinae
 Herb. tanacet. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Aethiop. mineral.
 Rad. jalap. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\mathfrak{z}\text{j}\beta$
 Cinnamomi $\mathfrak{z}\text{j}$.
 In pulverem redacta immisceantur
 Sacchari albi in aquae ros. solut. et ad con-
 sist. tabul. coct. $\mathfrak{z}\text{iiij}\beta$.
 Form. inde morsuli pond. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

S. Erwachsenen täglich 1—2 Morsellen zu geben.

Anwend. Gegen Würmer.

J. A. Schmidt.

1311. *Ry.* Pulv. semin. cinae $\mathfrak{z}\text{v}$
 „ rad. jalap. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Chocolat. pulv. $\mathfrak{z}\text{iiij}$
 Mucilag. gumm. mimos. q. s.
 F. trochisci No. LX.

S. Täglich 4mal 2—3 Stück zu geben.

Anwend. Als Wurmmittel für ein Kind von 10 Jahren.

Vogl.

1312. *Ry.* Semin. cinae pulv.
 Chocolat. pulv. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$
 Sacchari albi pulv. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Mucilag. gumm. tragacanth. q. s.
 ut f. l. a. trochisci, consp. pulv. cass. cinnam.,
 No. cxx.

D. S. Dreistündlich 4—6 Stück zu geben.

Anwend. Gegen Würmer. Etwa für Kinder von 4—6 Jahren.

Phöbus.

1313. *Ry.* Semin. cinae $\overline{3}\beta$.

Infunde aquae ferv. q. s. ad col. $\overline{3}\text{ij}$.

Syrup. cort. aurant. $\overline{3}\text{ij}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Würmer.

Radius.

1314. *Ry.* Semin. cinae

Rad. valerian. $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{3}\text{ij}$.

Infunde aquae ferv. q. s. ad col. $\overline{3}\text{iv}$. Adde

Extr. nuc. jugland.

Spirit. sulph.-aether.

Tinct. cort. aurant. $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{3}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Kinderlöffel voll.

Anwend. Gegen Würmer.

Henke.

1315. *Ry.* Semin. cinae cont. $\overline{3}\beta$

Rad. valerian. conc. $\overline{3}\text{j}\beta$

Aquae ferv. q. s.

In colat. $\overline{3}\text{ij}$ solve

Tart. natron. $\overline{3}\text{ij}$

Extr. absinth. $\overline{3}\text{j}$

Syrup. cort. aurant. $\overline{3}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden einen halben Esslöffel.

Anwend. Gegen Würmer.

Vogt.

1316. *Ry.* Sem. cinae $\bar{3}\text{j}\beta$
 Musci helminthochort. $\bar{3}\text{j}$.
 Infunde aquae fervid. $\bar{3}\text{ij}$.
 Colat. adde
 Syrup. cort. aurant. $\bar{3}\text{ij}$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Löffel voll zu geben.

Anwend. Gegen Würmer.

F. Jahn.

1317. *Ry.* Semin. cinae
 Rad. valerian. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.
 Infunde cum
 Aquae fervid q. s.
 per $\frac{1}{4}$ hor. ad colat. $\bar{3}\text{vj}$, cui admisce
 Asae foetid. vitell. ovi subacti $\bar{3}\text{ij}$.

D. S. Zu 2 Klystieren.

Anwend. Gegen Madenwürmer.

Richter.

1318. *Ry.* Extr. oleoso-aether. cinae gutt. xvj
 Pulv. semin. cinae q. s
 ut f. pil gr. ij Consp. pulv. lycop.

S. Zwei Morgen nach einander jedesmal früh nüchtern 8 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Madenwürmer.

1319. *Ry.* Extr. oleoso-aether. semin. cinae gr. viij.

S. Zwei Morgen nach einander die Hälfte früh nüchtern in Syrup zu geben.

Anwend. Gegen Madenwürmer.

Kopp. Billroth. Schupmann.

Cinnamomum. Zimmt.

(*Canella Ceylanica*; *Caneel*. Von *Cinnamomum Ceylanense* Nees.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, Aufguss, zu ʒß—ij, einigemal täglich. Geistige
Tinktur zu 20—60 Tropfen. Wasser, esslöffelweise, 3—6
mal. Oel, ½—2 Tropfen, 2—3mal.

1320. Rx. Cort. cinnamom.
Kino āā ʒj
Rad. caryophyllat.
Gummi mimos. āā ʒiij
Sacchari albi. ʒß.

M. f. pulvis.

D. S. Zwei bis dreistündlich einen Theelöffel voll
mit Wasser.

Anwend. Gegen atonische Diarrhöe.

Vogel.

1321. Rx. Pulv. cort. cinnamom. ʒj
„ „ chinae fusc. ʒj
Extr. gentian. ʒß
Syrup. cort. aurant. q. s. ut f. pil. gr. ij.
Consp. cinnamom.

D. S. Täglich 4mal 15 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Wechselfieber.

1322. Rx. Croci pulv. gr. vj
Cinnamomi gr. iij
Magnes. ustae gr. viij
Syrup. cort. aurant. q. s. ut f. bolus.

D. S. Auf einmal zu nehmen.

Richard.

1323. Ry. Pulv. cinnamomi acut. $\mathfrak{z}$ ij
 „ alumin. $\mathfrak{z}$ j
 „ rad. ratanhia^e $\mathfrak{z}$ ij
 Mellis rosati $\mathfrak{z}$ j β .
 M. f. electuarium.

D. S. Täglich 4mal einen Kaffeelöffel voll.

Anwend. Gegen Metrorrhagie

Vogt.

1324. Ry. Cort. cinnamom. $\mathfrak{z}$ ij
 Flav. cort. aurant. $\mathfrak{z}$ β .
 Infunde cum
 Aquae serv. q. s. ad colat. $\mathfrak{z}$ vj.
 Refrigeratae adde
 Tinct. rhei vinos. $\mathfrak{z}$ ijj
 Spirit. sulphurico-aeth. $\mathfrak{z}$ ij
 Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{z}$ j.

M. S. Stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Nach erschöpfenden Krankheiten als stärkendes und belebendes Mittel.

1325. Ry. Aquae menthae pip. $\mathfrak{z}$ ij
 Tinct. cinnamom. $\mathfrak{z}$ ij
 Alumin $\mathfrak{z}$ j
 Syrup. papav. alb. $\mathfrak{z}$ j.

*M. S. Stündlich 1—1½ Esslöffel, und wenn Be-
 lebung erfolgt, in verminderter Gabe.*

Anwend. Gegen erschöpfenden Mutterblutfluss.

van Swieten.

1326. Ry. Tinct. cinnamomi $\mathfrak{z}$ j β
 Aquae cinnamomi $\mathfrak{z}$ vij

Aether. acetici $\bar{3}j\beta$
 Syrup. diacodii $\bar{3}j$.

M. S. Alle viertel- auch halbe Stunden einen Ess-
 löffel.

Anwend. Gegen starke Blutflüsse und Ohnmachten bei der
 Entbindung.

Schneider.

1327. *Ry.* Alumin. crudi gr. xv.

Solve in

Aquae menthae crisp. $\bar{3}iv$.

Adde

Tinct. cinnamomi

Syrup. papav $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.

D. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ oder ganze Stunden 1 Ess-
 löffel voll.

Anwend. Bei habituellen Metrorrhagieen.

Rust.

Citrus Medica. Citrone.

(*Limone. Von Citrus Medica L.*)

Form u. Gabe. Ausgepresster Saft in Mischung,
 Plätzchen, zu $\bar{3}ij$ — vij und mehr täglich. Samen zu
 Emulsion, $\bar{3}ij$ — iv auf $\bar{3}vj$ — vij . Das Gelbe der Schale
 in Aufguss, Pulver, gr. v — xv, 2 — 3mal — Aether.
 Oel 2 — 3 Tropfen, 2 — 3mal. Aeussertlich als Rubefaciens;
 zum Einreiben der Theile, welche vom Liegen wund zu
 werden drohen; zur Haarpomade.

Man vermeide Salzbilder, salzs. Eisen, schwefels.
 Eisenoxydul.

1328. *Ry.* Succi citri recent. $\bar{3}$ ij
 Aquae font. $\bar{4}$ iv
 Syrup. rub. idaei $\bar{3}$ ij.

M. D. S. Zum Getränk.

Anwend. Zur Abkühlung und Erquickung in entzündlichen und typhösen Fiebern.

Richter.

1329. *Ry.* Cort. peruvian. $\bar{3}$ j.
 Coque ex aquae $\bar{3}$ xij ad col. $\bar{3}$ iv.
 Adde

Succi citri rec. expr. $\bar{3}$ ij

Vini rhenani opt.

Syrup. rubi idaei $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j.

M. S. Stündlich 1 Esslöffel.

Anwend. In Faulfiebern.

R. A. Vogel.

1330. *Ry.* Succi citri $\bar{3}$ j
 Olei amygdal. dulc rec. $\bar{3}$ jß
 Syrup. althaeae $\bar{3}$ ß

S. Umgeschüttelt, aller 3 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen hartnäckige, chronische Durchfälle, Fluxus coeliacus u. s. w.

G. A. Richter. Steinheim.

1331. *Ry.* Sacchari albi $\bar{3}$ ij
 Aquae q. s.
 Succi citri rec. expr. $\bar{3}$ ij
 Elaeosacch. flav. citri $\bar{3}$ j.
 F. rotulae. D. in scat.

S. Stückweise zu nehmen.

Anwend. Als kühlendes Mittel.

Schubarth.

1332. *Ry.* Semin. citri ʒij
 Aquae font. ʒj.
 F. l. a. emulsio. Colat. adde
 Sacchari albi ʒij.

M. S. Aller 2 Stunden $\frac{1}{2}$ Tasse.

Anwend. Ein für Hysterische passendes Mittel.

Sch. clin. Vindob. v. Hildenbrand.

1333. *Ry.* Kali carbonic. dep. ʒj
 Succu citri rec. expr. q. s. ad saturationem.
 Adde
 Aquae melissae ʒij
 Syrup. althaeae ʒj.

M. S. Zweistündlich einen Esslöffel voll.

Berends.

Coccionella septempunctata.

Sonnenkäfer.

(Von Chrysomela septempunctata L.)

Johanniskäfer.

Form u. Gabe. In Pulver, zu Zahnlattwerge; Tinktur zu 20—80 Tropfen. Aeusserlich zu Zahnlattwerge.

1334. *Ry.* Tinct. coccionell. ʒß.

S. Zwei- bis dreimal täglich 20—30 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Gegen Zahnschmerz, Gesichts- und halbseitigen Kopfschmerz.

Sauter.

Coccionella. Cochenille.*(Von Coccus Cacti L.)*

Form u. Gabe. In Pulver, zu ʒß—j.

1335. Ry. Coccionell. gr. xv—xx
 Kali carbonic. gr. x—xv
 Aquae fervid. ʒiij
 Syrup. flor. aurant. ʒj.

M. S. Täglich 4 mal 1 Theelöffel voll — später
 aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu geben.

Anwend. Bei Keuchhusten und bei heftigem Krampfhusten
 der Kinder sehr nützlich gefunden.

Dieudonné. Walther.
Cochleariae Armoraciae radix.
 Meerrettig.

(Raphani rustici s. marini radix Kren.
Von Cochlearia Armoracia L.)

Form u. Gabe. In Substanz als Kaumittel; aus-
 gepresster Saft, zu ʒij—iv, einigemal täglich; Aufguss
 mit Wasser, Wein, Bier, ʒj—ij auf ʒj, täglich einige
 Tassen. Aeusserlich, gerieben als Rubefaciens; ausge-
 presst zu Waschungen und aufgegossen zu Fussbädern.

1336. Ry. Succi rec. expr. rad. armorac. ʒvj
 „ „ „ herb. nasturt. aquat.
 „ „ „ fol. acetosae āā ʒj.
 Succos colatos et decantatos misce.

D. S. Mit etwas Rheinwein zu nehmen.

Anwend. Gegen Skorbut. Im Frühlinge zu verordnen.

Phöbus.

1237. *Ry.* Rad. armorac. rec. rasae $\mathfrak{Z}^v$
Cerevisiae $\mathfrak{g}^{ij}$.

Digere frigide in vase clauso, cola et adde
Syrup. commun. l. cinnamom. $\mathfrak{Z}^j$.

M. S. Tassenweise täglich 1—2 Pfund.

Anwend. Zur Beförderung der Harnabsonderung bei Harnverhaltung, Wassersucht, Verschleimung der Urinwege, schleimigem Asthma.;

Hufeland.

Auch gegen Merkurialskorbut und Mundsäule nützlich
befunden — ohne Syrup und nur $\mathfrak{Z}^{ij}$ Meerrettig — von

Radius.

1338. *Ry.* Rad. armorac. rec. $\mathfrak{Z}^{ij}$
Aquae font. $\mathfrak{Z}^{iv}$.

Macer. per hor. aliquot. Colat. expr. adde
Sacchari albi q. s.
ad dulc. saporem.

S. Esstöffelweise.

Anwend. Gegen skorbutische Uebel.

Schubarth.

1339. *Ry.* Rad. armorac. rec. conc. $\mathfrak{Z}^j$
Aquae ferv. $\mathfrak{Z}^{ij}$.

Digere. Colat. adde
Sacchari albi q. s.
ad grat saporem.

S. Von Zeit zu Zeit 1 Theelöffel voll langsam
hinunterzuschlucken.

Anwend. Gegen chronische Heiserkeit.

Thomson.

1340. *Ry.* Rad. armorac. ras. $\bar{3}$ ij
 Semin. sinapis cont. $\bar{3}$ j
 Cerevisiae $\mathfrak{L}$ ij.
 Macera per hor. viij. Colat. adde
 Syrup. cort. aurantior. q. s.
 ad saporem dulcem.

M. S. Tassenweise.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Schubarth.

1341. *Ry.* Rad. armorac. in taleol. diss. q. v.
 Acet. fort. q. s.
 ut digito uno peremineat.
 In vitro bene obturato repone infra terram per
 xiv dies.
 Decantetur acetum.

S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Sommersprossen.

Stoll.

Cochleariae officinalis herba recens. Löffelkraut.

*(Löffelkresse, Scharbockskraut. Von Cochlearia
 officinalis L.)*

Form u. Gabe. Frisch ausgepresster Saft, zu $\bar{3}$ j—
 ij täglich, mit Wasser, Molken, Fleischbrühe, weiss. Weine.
 Konserve, $\bar{3}$ j—ij täglich. Spiritus, $\bar{3}$ j—ij, 2—3 mal.
 Aeusserlich zu Mund- und Gurgelwässern. Der Presssaft
 auf skorb. Geschwüre.

1342. *Ry.* Succ. rec. expr. herb. cochlear.
 „ „ „ „ nasturt. aquat.

Succi rec. expr. herb. beccabung.

„ „ „ „ trifol. fibrin. āā 3vj.
Succos colatos et decantatos misce.

D. S. *In einem Tage (mit etwas Rheinwein) zu verbrauchen.*

Anwend. Als Unterstützungsmittel bei Skorbut.

Phöbus.

1343. **Ry.** Herb. rec. cochlear.

„ „ nasturt. aquat.

„ „ taraxaci āā 3ß

Seri lactis dulc. bullient. ℥iij.

Digere per hor. xij. In colat. solve

Sacchari albiss. 3ij.

M. D. S. *Den Tag über zu verbrauchen.*

Anwend. Wie das vorige.

Schubarth.

1344. **Ry.** Herb. cochlear. floresc. rec. 3ij

Semin. sinapeos cont. 3ß

Vini gall. alb. ℥ij.

Macera per triduum. Adde

Spirit. muriatico-aether. 3ij.

M. D. S. *Täglich 3mal ein halbes Weinglas voll.*

Anwend. Gegen Skorbut.

Sundelin.

1345. **Ry.** Herb. rutae

„ salviae āā 3ij.

Infunde cum

Aquae ferv. 3xij.

Colat. refriger. adde
 Spirit. cochleariae $\bar{3}$ ij
 Tinct. laccae $\bar{3}$ j.

M. S. Mundwasser.

Anwend. Bei Auflockerung und Geschwürigkeit der Schleimhaut des Mundes und des Zahnfleisches.

J. A. Schmidt.

1346. *Rx.* Aquae flor. sambuci $\bar{3}$ vj
 Spirit. cochlear. $\bar{3}\beta$
 Succ. citri rec.
 Syrup. flor. papav. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ ij.

M. S. Aller 3 Stunden 2 Esslöffel voll.

Anwend. Bei skorbutischen Leiden.

Vogel.

1347. *Rx.* Tinct. myrrhae
 „ cinnamom. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}$ j
 „ guajac. $\bar{3}$ ij
 Spirit. cochlear. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Einen Theelöffel voll mit 2 Esslöffel Wasser gemischt, umgeschüttelt, damit den Mund auszuspülen.

Anwend. Bei skorbutischem Zahnfleische.

Rust.

1348. *Rx.* Tinct. chinae $\bar{3}$ ij
 „ myrrhae $\bar{3}\beta$
 „ kino $\bar{3}$ ij
 Spirit. cochleariae $\bar{3}$ j.

M. S. Das Zahnfleisch damit zu bestreichen und damit getränkte Baumwolle in die hohlen Zähne zu bringen.

Anwend. Gegen schlaffes, oft blutendes Zahnfleisch, wackelnde Zähne und Caries derselben.

F. Wendt.

Colchicum autumnale L. Herbstzeitlose.

A. Colchici bulbus s. radix.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Aufguss, zu gr. j—v, einigemal täglich. Tinktur, zu 20—40 Tropfen. — Wein, 1—2 Theelöffel. — Essig, ℥j—iv. Sauerhonig, ℥ij—iv, 2—3mal täglich.

Man vermeide Verbindungen mit Jod, Alkalien, besonders kaustischen fixen, salzs. Gold, salpeters. Silber und Quecksilber, Sublimat, essigs. Blei, Gerbestoff, Thierkohle, Kochhitze.

1349. Ry. Pulv. bulb. colchic. gr. xxx—l

Sapon. medic. q. s.

F. pil. No. x. Consp. cassia.

S. Täglich 2mal 1 Stück.

Anwend. Gegen Gicht, weissen Fluss.

Ritton.

1350. Ry. Magnes. sulphur. ℥j—ij

Aquae menth. crisp. ℥x.

Solut. adde

Aceti colchici ℥j—jß

Syrup. croci ℥j

Magnes. ustae ℥viiij.

M. S. Umgeschüttelt, täglich einigemal 3 Esslöffel, so dass innerhalb 24 Stunden 4—6 Stuhlgänge erfolgen.

Anwend. Gegen eben auftretende Gichtanfälle.

Scudamore.

1351. *Ry.* Tinct. colchic. vinos. $\bar{3}$ j.

S. 60 — 70 Tropfen vor Schlafengehen und nöthigenfalls des andern Tages ein oder mehreremale dieselbe Gabe zu wiederholen.

Eau médicinale d'Husson.

Anwend. Bei Podagra.

Consbruch.

1352. *Ry.* Pulv. bulb. colchic. gr. iij—vj

Pulv. ipecacuanh. opiat.

Elaeosacch. menthae pip. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj ad chartam ceratam.

S. Morgens und Abends ein Pulver.

Anwend. Bei rheumatischer Gelenkaffektion.

Wallis.

1353. *Ry.* Extr. colchic. acet. gr. iij

Pulv. Doweri

Extr. colocynthid. comp. $\bar{a}\bar{a}$ gr. j—ij.

M. f. pil. j.

Anwend. Gegen festsitzende Gicht, nachdem erst einige Tage Vinum colchici zu 35—45 Tropfen früh und Abends gereicht worden ist. Am Ende der Kur folgt ein gelindes Abführungsmittel.

Halford.

1354. *Ry.* Terrae foliat. tartari $\bar{3}\beta$

Spirit. nitri dulc. $\bar{3}$ ij

Oxymell. colchici $\bar{3}$ v.

M. S. Stündlich 1 Kaffeelöffel voll.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Störk.

B. Colchici flores.

Form u. Gabe. Aufguss, Tinktur, in gleichem Verhältniss wie Zwiebel oder Samen.

C. Colchici semina.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu gr. $j - iij$. — Tinktur zu 15 — 60 Tropfen. — Wein $1 - 1\frac{1}{2}$ Theelöffel. — Essig, $\mathfrak{z}j - ij$. — Sauerhonig, $3j - ij$, 2 — 3mal täglich.

1355. Rx. Tinct. semin. colchic.
 „ digital. purp. $\bar{a}\bar{a}$ $3ij$
 Spirit. aether. nitric. $\mathfrak{z}j$.

M. S. Früh und Abends 20 Tropfen auf Zucker zu nehmen.

Anwend. Gegen Brustwassersucht.

v. Hildenbrand.

1356. Rx. Tinct. semin. colchic.
 „ guajaci simpl. $\bar{a}\bar{a}$ $5iij$.

M. D. S. Täglich dreimal 30 — 40 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Gegen chronischen Rheumatismus.

Blasius.

1357. Rx. Extr. aconiti $\mathfrak{z}j - 3\beta$.

Solve in

Vini semin. colchic. 3β .

M. D. S. Täglich dreimal 15 — 40 Tropfen zu nehmen.

Anwend. Gegen inveterirten chronischen Rheumatismus mit wässerigen Exsudaten und krankhaften Ablagerungen in den Gelenkapparaten, und in rheumatischer Gicht.

Weber.

1358. *Ry.* Vini colchici $\bar{3}$ ij
 Extr. taraxac. liqu. $\bar{3}$ j
 Spirit. nitrico-aether. $\bar{3}$ ij
 Aquae rubi idaei $\bar{3}$ ij.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen Löffel voll.

Anwend. Gegen gichtische Beschwerden.

Vogt.

Colocynthis pulpa. Koloquintenmark.

(*Fructus, Pomum. Von Cucumis Colocynthis L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge, zu gr. β —ij als Reizmittel, als gelind eröffnendes zu gr. iv—x, einigemal täglich; in Aufguss oder Abkochung mit Wasser oder Bier zu $\bar{3}\beta$ —j auf $\bar{3}$ vj, täglich 3mal esslöffelweise. — Extrakt zu gr. ij—v. — Tinktur zu 5—20 Tropfen, einigemal täglich. (Zu Pulvern und pulveraufnehmenden Formen nehme man *Colocynthis praeparata s. Pulv. colocynth. gummosus, Trochisci Alhandal.*) Aeusserlich zum Klystier $\bar{3}\beta$ — $\bar{3}\beta$ abgekocht; zu Salben und Linimenten u. s. w.

Man vermeide Salzbilder, Alkalien, schwefels. Eisen und Kupfer, salpeters. Silber und Quecksilber, Eisen- und Quecksilber-Chlorid, Bleizucker, Gerbestoff.

1359. *Ry.* Pulv. colocynth. a semin. purgat. et conc. $\bar{3}$ j
 Aquae comm. bullient. $\bar{3}$ vj
 Ebulliant per vj minut. Colat. refriger. adde
 Spirit. sulphurico.-aether. $\bar{3}$ j
 Syrap. cort. aurant. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Täglich 3mal 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Wassersucht, besonders der Brust und des Bauches mit torpidem Zustande.

Sydenham. Buchhave.

1360. *Ry.* Pulv. colocynth. ℥ij .
Coque ex cerevis. ℥xxiv ad col. ℥xij .

S. Täglich 3mal 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen torpide Wassersucht.

Hufeland.

1361. *Ry.* Pulv. colocynth. ℥β .
Coque ex aquae font. q. s. ad colat. ℥iij .
Syrup. cort. aurant. ℥vj
Spirit. nitrico-aether. ℥β .

M. S. Esslöffelweise.

Anwend. Gegen torpide Wassersucht, Nerven- und Geisteskrankheiten mit Torpидität des Darmkanals.

Choulant.

1362. *Ry.* Extr. colocynth.
Aloes lucid. $\overline{\text{aa}}$ ℥j
Ferri pulv. ℥β
Mucilag. gummi mimos. q. s.
F. pilulae xl. Consp. lycop.

S. Abends 1—2 Stück.

Pilulae aperientes Stahl.

Anwend. Bei habitueller Verstopfung.

Stahl.

1363. *Ry.* Pulv. colocynth. ℥j
Lact. sulphur.
Extr. millefol. $\overline{\text{aa}}$ ℥iv .
M. f. pil. lxxx. Consp. pulv. rad. Zingib.

D. S. Täglich viermal 1—2 Stück.

Anwend. Für Dickbäuchige.

Kopp.

1364. R. Tinct. colocynth. ℥j
 „ asae foetid. ℥ij .

M. D. S. Morgens und Abends 30 Tropfen.

Anwend. Gegen chronische Unterleibsverstopfung.

Heim.

1365. R. Tinct. colocynth. gutt. vj—xij
 Aquae cinnamon. simpl.
 „ menthae crisp āā ℥ij
 Spirit. muriatico-aether. ℥j .

M. S. Aller 2—3 Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Torpor des Darmkanals und gegen Lähmungen.

Berends.

1366. R. Tinct. colocynth.
 „ nucis vomic. āā ℥ij
 „ pyrethri ℥β .

M. S. Täglich dreimal 40 Tropfen mit Arnika-thee.

Anwend. Gegen Lähmungen der unteren Extremitäten.

Vogt.

1367. R. Aquae menthae pip. vin. ℥iv .
 Extr. absinth. ℥β
 „ colocynth. ℥β—j—jβ .

M. S. Täglich dreimal 1—2 Theelöffel voll auf den Unterleib einzureiben.

Anwend. Gegen Verstopfung bei Kindern, die schlecht einnehmen.

Vorher eine Seifenbähung zu machen; dürfte besonders bei Wurmliden nützlich sein.

Kraus.

1368. *Ry.* Tinct. colocynth. $\mathfrak{z}\beta$
Olei ricini $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.

D. S. Morgens und Abends einen Theelöffel voll
in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Gegen Drüsenanschwellungen und Verhärtungen,
wie auch zur Erregung des Stuhlganges,

Heim.

1369. *Ry.* Colocynth. pulv. $\mathfrak{z}\text{j}$
Axung. porc. $\mathfrak{z}\text{j}$.
M. f. unguentum.

S. Zu $\mathfrak{z}\text{ij}$ auf den Unterleib einzureiben.

Unguentum purgans.

Anwend. Gegen Verstopfung.

Chrestien.

1370. *Ry.* Extr. colocynth. $\mathfrak{z}\text{j}$
Natri muriat. $\mathfrak{z}\text{ijj}$
Infus. chamomill. $\mathfrak{z}\text{v}$
Mellag. gramin. $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.

D. S. Zum Klystier.

Anwend Heftig reizend bei Coma, Stupor, serösem Schlag-
fluss, Melancholie und Gehirnaffektionen in Folge von ört-
lichen Verletzungen.

Abernethy. Sundelin.

Columbo radix. Kolumbo.

(*Calumba, Colombo. Von Menispermum palmatum Lam.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu $\mathfrak{z}\beta - j$, mehrmals täglich; in Aufguss und Abkochung, $\mathfrak{z}ij - iv$ auf $\mathfrak{z}iv$, esslöffelweise. — Extrakt in Pillen, Mixturen, zu $\mathfrak{z}\beta - j$, einigemal täglich.

1371. *Ry.* Pulv. rad. columbo

Tartari natronati $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}j$.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

D. S. Aller 4 Stunden ein Pulver mit Wasser zu nehmen.

Anwend. Bei Säure und Verschleimung der ersten Wege.

Percival.

1372. *Ry.* Pulv. rad. columbo $\mathfrak{z}ij$

Opii puri gr. ij

Elaeosacch. menth. crisp. $\mathfrak{z}j$.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

D. S. Täglich 3 — 4 Pulver in Wasser zu nehmen.

Anwend. Gegen Durchfall.

Vogel.

1373. *Ry.* Pulv. rad. columbo $\mathfrak{z}ij$

Elaeosacch. macidis $\mathfrak{z}j$.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

D. S. Aller 4 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen atonischen Durchfall.

P. Frank.

1374. *Ry.* Rad. columbo gr. x
 Lapid. cancror. gr. vj
 Rad. rhei opt. gr. iij
 (Cort. peruvian. ʒj).
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Täglich drei Stück zu verbrauchen.

Pulveres absorbentes stomachici et resolventes Brerae.

Anwend. Gegen Magenschwäche mlt Säure in den ersten Wegen und Flatulenz.

Brera.

1375. *Ry.* Rad. columbo ʒß
 Macidis ʒj
 Natri sulphurici sicci ʒij.
 M. f. pulvis.

D. S. Zweistündlich eine Messerspitze voll zu nehmen.

Anwend. Bei Verschleimung der ersten Wege als Digestivmittel.

G. A. Richter.

1376. *Ry.* Extr. columbo
 „ gentianae
 „ quassiae
 Fellis tauri āā ʒij
 Pulv. gentian. q. s. ut f. pil. gr. iij.
 Consp. cinnamon.

D. S. Ein oder zwei Stück unmittelbar nach dem Mittagessen.

Pilulae moscoviticae s. tonicae.

Anwend. Bei fehlerhafter Gallenabsonderung.

1377. *Ry.* Pulv. rad. columbo $\bar{3}\beta$
 „ cort. cascarill. $\bar{3}ij$
 Macidis $\bar{3}j$.

M. f. cum syrup. cort. aurant. q. s. electuar.

S. Täglich dreimal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen atonische langwierige Diarrhöen.

Sundelin.

1378. *Ry.* Rad. columbo $\bar{3}j$
 „ salep gr. x.
 Coque c. aquae font. per $\frac{1}{4}$ hor.
 Colat. $\bar{3}iij$ adde
 Syrup. chamomill. $\bar{3}\beta$.

M. S. Alle Stunden einen Kindertöffel voll zu geben.

Anwend. Gegen langwierige Diarrhöe der Kinder.

Goelis.

1379. *Ry.* Decoct. salep (gr. viij) $\bar{3}ij$
 Pulv. rad. columbo gr. viij—x
 Laudan. liquid. gutt. ij
 Syrup. diacodii $\bar{3}\beta$.

M. S. Wohlungeschüttelt alle Stunden einen Kinderlöffel voll.

Anwend. In gleichen Fällen.

Goelis.

1 80. *Ry.* Rad. columbo $\bar{3}\beta$.
 Coque ex aquae $\bar{3}x$ ad colat. $\bar{3}vj$.
 Sub finem coct. adde
 Cort. cascarill. $\bar{3}ij$.

Colaturae admisce

Tinct. cort. aurantior. $\mathfrak{Z}\text{ij}$

Syrup. cinnamon. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. S. Aller 3 Stunden einen reichlichen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Atonie des Darmkanals, atonische Diarrhöe.

Berends.

1381. *Ry.* Rad. columb. $\mathfrak{Z}\beta$.

Inf. c. aquae ferv. $\mathfrak{Z}\text{v}$.

Ebulliant paulisper.

Colaturae refrigeratae adde

Syrup. cydonior. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. D. S. Aller 2—3 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Durchfall.

Vogel.

1382. *Ry.* Extr. columbo

„ cascarill. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{Z}\text{j}\beta$.

Solve in

Aquae menthae pip. $\mathfrak{Z}\text{v}$.

Adde

Tinct. cinnamom. $\mathfrak{Z}\text{ij}$

Syrup. cort. aurantior. $\mathfrak{Z}\text{j}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Bei Diarrhöen.

Vogel.

1383. *Ry.* Extr. columbo $\mathfrak{Z}\text{j}$

Decoct. salep tenuior. $\mathfrak{Z}\text{iiij}$

Elaeosacch. foenicul. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

M. S. Stündlich zwei volle Theelöffel.

Anwend. Gegen anhaltende, erschöpfende Durchfälle der Kinder. Nebenbei gewürzhalte Umschläge auf den Leib.

Wendt.

1384. *Ry.* Extr. columbo $\overline{3}$ ij
Aquaе cinnamom. $\overline{3}$ j.

S. S. Dreimal täglich 30—80 Tropfen.

Anwend. Bei Durchfällen.

Berends.

Conii herba. Schierlingskraut.

(*Herba Cicutae.* Von *Conium maculatum*;
grosser Landschierling, Fleckenschierling.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, zu gr. $\overline{j}$ —xx, einigemal täglich; selten in Press-
saft; in Aufguss, zu $\overline{3}\beta$ — $\overline{3}$ j auf $\overline{3}$ iv, esslöffelweise. —
Extrakt, zu gr. $\overline{j}$ —x, einigemal täglich. — Tinktur, zu
5—15 Tropfen, einigemal. Aeusserlich als Species, Um-
schlag, Salbe, Pflaster; Aufguss zu Augewässern und
Klystieren.

Man vermeide concentrirte Mineralsäuren, Salzbilder,
Alkalien, salzs. Gold, Sublimat, salpeters. Silber und Queck-
silber, Bleisalze, Vitriol und Gerbestoffe.

1385. *Ry.* Pulv. herb. conii macul. $\overline{3}$ ij
Extr. conii macul. q. s.
F. pil. gr. ij. Consp. lycopod.

S. Täglich 3mal 1—20 Pillen.

Anwend. Gegen Drüsengeschwülste u. s. w.

Störk. Berends.

Diese Pillen sind auch zu 5—6 Stück gegen hart-
näckige Flechten, neben Gebrauch der Hungerkur, sehr nütz-
lich.

1386. *Rx.* Pulv. herb. conii macul.
 Aethiop. antimonial. āā gr. viij
 Sacchari albi 3j.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Täglich 2—3 mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Meyer.

1387. *Rx.* Natr. carbon. sicci gr. iv
 Herb. conii macul. gr. ij
 Hydrargyr. stibiat. sulphur.
 Carbon. spong. āā gr. vj
 Sacchari albi 3ß.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. Dreimal täglich 1 Pulver.

Anwend. Gegen Kropf.

Schubarth.

1388. *Rx.* Herb. conii macul. 3ij
 Mellis puri 3ij.

M. S. Theelöffelweise zu nehmen.

Anwend. Gegen chronische Hautkrankheiten, Krätze u. s. w.

Baldinger.

1389. *Rx.* Pulv. herb. conii macul.
 Ferri carbonic. āā 3j
 Extr. gentian. rubr. q. s.
 F. pil. cxx. Consp. lycop.

S. Abends vor Schlafengehen 2—4 Stück zu nehmen und allmähig auf 12—16 zu steigen.

Anwend. Gegen chronischen Reizhusten, besonders in der zweiten Periode des kindlichen Lebens, wenn er mit entzündlicher Stimmung der Athmungswerkzeuge nicht zusammenhangt.

M. E. A. Naumann.

1390. *Ry.* Extr. conii macul. $\bar{3}j$
 Flor. sulphur. $\bar{3}ij$
 Sulph. antimon. aurat. $\mathfrak{z}\beta$
 Syrup. althaeae q. s.
 ut f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 2—5 Stück.

Anwend. Bei hartnäckigem, nach Masern zurückgebliebenem Husten.

Hufeland.

1391. *Ry.* Extr. conii macul.
 Sulphur. dep. $\bar{a}\bar{a}$ gr. vj
 Extr. hyoscyam. gr. ij
 Sacchari albi gr. xij.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Täglich 3mal 1 Pulver.

Anwend. Bei mit Heiserkeit verbundenem und Uebergang in Lungenschwindsucht drohendem Krampf- und Reizhusten nach den Masern.

G. A. Richter.

1392. *Ry.* Infus. flor. papav. rhoead. ex $\bar{3}\beta-j$ par. $\bar{3}v$
 Extr. hyoscyam. nigri
 „ conii macul. $\bar{a}\bar{a}$ gr. x—xx
 Liquor. ammon. acet. $\bar{3}j$
 Sacchari albi q. s. ut edulcetur.

S. S. Täglich 4mal 1 Esslöffel und mehr.

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht.

Parrish. Ebers.

1393. *Ry.* Extr. conii macul. $\mathfrak{z}ij$.
 Solve in
 Aquae foenicul. $\bar{3}ij$.
 Adde
 Tinct. opii benzoic. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt, theelöffelweise.

Anwend. Beim Keuchhusten.

G. A. Richter.

1394. *Rx.* Sapon. venet.
 Gummi ammon.
 Extr. conii macul.
 „ taraxac. āā 3j
 Mellis opt. q. s. (l. pulv. rad. althaeae q. s.).
 F. pil. gr. iij. Consp. lycop.

D. S. *Aller 3 Stunden 1 Stück.*

Anwend. Bei Drüsenverstopfung und Verhärtung drüsiger Gebilde, besonders des Unterleibes.

Brera.

1395. *Rx.* Sapon. venet. 3ß
 Extr. conii macul. 3ij
 Hydrargyr. stibiat. sulphur. 3j
 Gummi galbani
 Fellis tauri inspiss. āā 3ß
 (Pulv. rad. althaeae q. s.).
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Täglich 3—4mal 8—10 Stück.*

Anwend. Gegen Verhärtung des Pfortners.

Pezold.

1396. *Rx.* Hydrargyr. muriat. mit. gr. vj
 Extr. conii macul. 3ß
 „ hyoscyam. 3j
 Pulv. rad. rhei 3ß.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Aller 3 Stunden 1 Stück.*

Anwend. Bei Leberverhärtung.

Rust.

1397. *Rx.* Sapon. venet. 3ij
 Extr. conii macul. 3ß
 Galbani dep.
 Fellis tauri inspiss. āā 3j

Bismuth. nitric. praec. $\mathfrak{zj}$
(Pulv. rad. althaeae q. s.).

M. f. pil. gr. iij. Consp. lycop.

S. Täglich 4mal 3 Stück zu nehmen und allmählich auf 6 und mehr zu steigen.

Anwend. Gegen Verhärtung und Verengung des Pylorus und der Cardia.

Günther.

1398. *Ry.* Extr. cort. peruvian. $\mathfrak{zij}$

„ conii macul. $\mathfrak{zij}$

Calomel. gr. xv

Kermet. mineral. gr. x

(Pulv. cort. peruvian. q. s.).

M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnam.

S. Täglich 3—4mal 6—10 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Nachtripper.

Weikard.

1399. *Ry.* Extr. conii macul. $\mathfrak{zj}$.

Solve in

Aquae cinnamom. vinos. $\mathfrak{z}\beta$.

D. S. Kindern von 2—4 Jahren täglich 3mal 4 Tropfen und täglich jedesmal mit 1 Tropfen bis 30—35 gestiegen.

Anwend. Gegen skrofulöse Lichtscheu.

Dabei äusserlich Vesicans hinter die Ohren und mit Tinct. opii simpl. befeuchtete Kompressen auf die Augen gelegt.

Kopp. Schindler.

1400. *Ry.* Extr. conii macul. gr. ij—vj

Aquae meliss. $\mathfrak{zij}$

Tinct. rhei aquos. $\mathfrak{zj}$.

S. S. Täglich 3mal $\frac{1}{2}$ Esslöffel.

Anwend. Gegen skrofulöse Atrophie.

Hecker.

1401. *Ry.* Extr. conii macul.
 Fellis tauri inspiss. $\overline{aa}$ $\mathfrak{v}$ j
 Extr. opii gr. $\mathfrak{v}$ j
 Spirit. Minder. $\mathfrak{z}$ ij
 Aquae rosar. $\mathfrak{z}$ ij.

M. S. Mit 1 Pinsel auf die Hornhaut zu bringen.

Anwend. Gegen Hornhautverdunkelungen.

G. A. Richter.

1402. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. $\mathfrak{v}$ j
 Extr. conii macul.
 „ flor. chamom. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}$ ij
 Tinct. opii simpl. $\mathfrak{z}$ j
 Mellis rosat. $\mathfrak{z}$ j.

S. S. Mittelst eines Pinsels täglich 3—4mal auf die Geschwüre zu bringen.

Anwend. Gegen syphilitische Halsgeschwüre.

Rust.

1403. *Ry.* Herb. conii macul.
 „ hyoscyam. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}$ iv.
 Infund. c. aquae ferv. q. s. ad colat. $\mathfrak{g}$ ij.
 Sapon. domest. $\mathfrak{z}$ ij.

S. S. Flanell damit zu befeuchten und warm überzulegen.

Anwend. Als schmerz- und krampfstillende Fomentation.

Berends.

1404. *Ry.* Infus. herb. conii macul. ($\mathfrak{z}\beta$) $\mathfrak{z}$ vj
 Liqu. kali carbonic. $\mathfrak{z}$ ij.

M. S. Zum äusserlichen Gebrauch.

Anwend. Gegen Leberflecke.

Walther.

1405. *Ry.* Herb. conii macul. pulv. $\bar{3}j$
 Succ. dauci inspiss. crud. $\&\beta$
 Tinct. opii croc. $\bar{3}j\beta$.
 M. f. cataplasma.

S. Zum Umschlag.

Cataplasma ad cancerum apertum Disp. Fuld.

Anwend. Bei offenem Krebs.

1406. *Ry.* Herb. conii macul.
 „ hyoscyam. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}iij$
 Flor. chamomill.
 „ sambuc. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}vj$
 Farin. sem. lini $\bar{3}x$.
 M. f. pulvis.

S. Zum Umschlag.

Anwend. Bei phlegmonösen Entzündungen, Abscessbildungen, um die entzündliche Spannung zu mildern und die Reife zu befördern.

Carus.

1407. *Ry.* Herb. conii macul.
 „ hyoscyami
 Farin. sem. lini $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$.
 Coque ad consist. cataplasmatiss.

S. Lauwarm überzulegen.

Anwend. Gegen Schwielen der Augenlider und Gerstenkörner.

v. Gräfe.

1408. *Ry.* Herb. conii macul. manip. j
 Semin. lini $\bar{3}j$.
 Coque c. suff. q. aquae ad consist. catapl.
 Sub finem coct. adde
 Camphor. subact. $\bar{3}\beta$.

M. S. Umschlag.

Anwend. Gegen Tylosis.

Beer.

1409. *Ry.* Fol. malv. gross. pulv. ℥ij .

Coque cum

Lact. vaccin. q. s.

Sub finem coct. adde

Herb. conii macul. gross. pulv. ℥β

Butyri recent. ℥jβ .

F. cataplasma molle.

D. S. Lauwarm auf den Kopf zu legen.

Anwend. Gegen Erbgrind.

P. Frank.

1410. *Ry.* Herb. conii macul.

„ millefol.

„ tussilag. āā ℥ij

Flor. chamomill. ℥jβ .

Conc. S. Ein Pfötchen voll zum Klystier.

Anwend. Gegen Striktur und skirrhöse Verdickung des Mastdarms mit 2 Löffel voll Leinöl.

Radius.

1411. *Ry.* Extr. conii macul. ℥j

„ hyoscyami ℥β

Pulv. herb. belladonn. ℥j

Liqu. ammon. acet. q. s.

F. cataplasma tenuius.

S. Die Hälfte auf Leder gestrichen aufzulegen.

Anwend. Bei offenem Krebs; auch bei Leberverhärtungen.

A. G. Richter.

1412. *Ry.* Extr. conii macul. ℥β

„ hyoscyami

Tinct. thebaic. āā ℥ij .

M. S. Auf Leder zu streichen und mittelst eines Tragbeutels zu befestigen.

Anwend. Gegen Hodenweh.

Althof.

1413. *Ry.* Pulv. herb. conii macul. $\mathfrak{z}\beta$
 Axungiae $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.
M. f. unguent.

S. Zwei bis vier Drachmen zum Einreiben.

Pott's beruhigende Salbe.

Anwend. Bei skrofulösen Leiden mit Entzündung und beim Pott'schen Uebel.

1414. *Ry.* Emplastr. conii macul. $\mathfrak{z}\text{j}$
 „ belladonnae $\mathfrak{z}\text{j}$
 „ ceruss. $\mathfrak{z}\text{iv}$.

Mal. S. Pflaster.

Anwend. Gegen Aufreibung der Augenliderdrüsen und gegen Gerstenkörner auf die Augenlider zu legen.

v. Gräfe.

1415. *Ry.* Emplastr. belladonnae $\mathfrak{z}\beta$
 „ conii macul.
 „ digital. purp.
 „ galbano-crocat.
 „ saponat. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{iiij}$
 „ mercurial. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Mal. M. f. Emplastrum.

D. S. Auf Leder messerrückenstark zu streichen.

Anwend. Zur Zertheilung chronischer Drüsenverhärtungen.

Walther.

Contrayervae radix. Giftwurzel.*(Von Dorstenia Contrayerva L.)*

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Lattwerge, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{j}$, einigemal täglich; in Aufguss, zu $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ auf $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, esslöffelweise. — Aeusserlich zu Gurgelwässern und Klystieren.

1416. *Rx.* Radic. contrayerv. cont. $\mathfrak{z}\beta$

Aceti vini $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$

Aquae font. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Stent in digestionem vase clauso in baln. Mariae per horam.

D. S. Täglich 1—3mal 1 Tasse voll.

Anwend. In typhösen und exanthematischen Fiebern.

F. X. Hartmann.

1417. *Rx.* Avenae excort. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Coque cum

Aquae font. q. s.

Sub finem coct. adde

Rad. contrayerv. $\mathfrak{z}\beta$.

F. ebullit. Colat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ adde

Acet. destill.

Tinct. myrrhae $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$

Mellis depur. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen brandige Bräune.

Fothergill.

Cortex adstringens brasiliensis.

Zusammenziehende brasilianische Rinde.

(Von Acacia cochliacarpa Mart., Mimosa virginialis Pohl.)

Form u. Gabe. In Pulver, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\beta$, 3—4 mal täglich; in Abkochung, $\mathfrak{z}j$ auf $\mathfrak{z}viij$, esslöffelweise. Tinktur, 1—2 Theelöffel, 3—4 mal täglich.

1418. *Ry.* Decoct. cort. adstring. brasil. $\mathfrak{z}vij$
 Bals. copaiv. c. vitell. ovor. subact.
 Tinct. ferri pomat. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}ij$
 Syrup. balsamici $\mathfrak{z}j$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll.

Anwend. Bei hartnäckigem Tripper und Fluor albus.

Merrem.

1419. *Ry.* Cort. adstring. brasil. $\mathfrak{z}\beta$.
 Coque cum
 Aquae font. q. s.
 Sub finem coct. adde
 Herb. sabinae $\mathfrak{z}\beta$.
 Colat. $\mathfrak{z}viij$ adde
 Syrup. cort. aurantior. $\mathfrak{z}j$.

M. D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Beim Mutterkrebs und daher entstehenden Blutflüssen.

Merrem.

Crocus. Safran.*(Von Crocus sativus L.)*

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lattwerge, Bissen, zu gr. v—xx, mehrmals täglich; in Aufguss zu ℥j—iij auf ℥iv. Tinktur 20—60 Tropfen. Aeusserlich zu Augenbähungen und Kataplasmen, zu Pflastern.

1420. Rx. Croci ℥viij
 Flor. aurantior. ℥β
 „ chamomill. vulg. ℥jβ.
 Conc. M. f. species. D. in vitro.

S. Einen gehäuften Esslöffel mit 3 Tassen Wasser anzubrühen.

Anwend. Ein feines Nervinum.

Berends.

1421. Rx. Rad. iridis florent.
 „ paeoniae
 „ liquirit. āā 3j
 Croci gr. x—xx
 Sulphur. antimon. gr. ij.
 M. f. pulvis.

D. S. Messerspitzenweise zu geben.

Anwend. Gegen chronischen Husten der Kinder.

F. Jahn.

1422. Rx. Croci gr. viij
 Semin. anisi vulg. 3β
 Magnes. ustae
 Rad. valerian. āā 3j

Rad. iridis florent. 3jß
 „ liquirit. 3ij.
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich mehrmals 2 — 3 Messerspitzen voll zu geben.

Anwend. Bei Unterleibskrämpfen der Kinder.

Hufeland.

1423. *Ry.* Croci gr. xv
 Rad. iridis florent. 3j
 Sem. carvi 3jß
 Magnes. carbon. 3ij.
 M. f. pulv. D. in vitro.

S. Täglich 5 — 6 mal eine kleine Messerspitze in Fenchelthee zu geben.

Pulvis infantum Rosensteinii.

Anwend. Bei Unruhe der Kinder und Krämpfen, aus dem Unterleibe entstanden.

Rosenstein.

1424. *Ry.* Croci pulv.
 Myrrhae
 Sulphur. dep. āā 3j
 Fell. tauri inspiss. q. s.
 F. pil. cl. Consp. pulv. croci. D. in vitro.

S. Täglich 1—2mal 12 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Unterleibsstockungen, unterdrückte Menstruation.

G. A. Richter.

1425. *Ry.* Croci pulv. gr. vj
 Cinnamomi gr. iij

Magnes. ustae gr. viij
 Syrup. cort. aurantior q. s.
 F. bolus. Consp. cinnamom.

S. Auf einmal.

Anwend. Gegen mangelnde monatliche Reinigung aus Atonie.

Richard.

1426. *Ry.* Extr. hellebori nigr.

Aloes lucid.

Ammon. muriat. martiat. āā 3j

Croci 3ß

Opil gr. v.

M. f. c. tinct. rhei pil. gr. j. Consp. pulv. rad.
 liquirit.

S. 8—12 Stück auf einmal zu nehmen.

Pilulae balsamicae Sellii.

Anwend. Zur Beförderung des Menstrual- und Hämorrhoidal-
 flusses.

Selle.

1427. *Ry.* Flor. verbasci 3j

Croci 3j.

Ebull. leniter c. lact. vaccin. q. s. ut f. catapl.
 molle.

S. Ueber die Augen zu legen.

Anwend. Gegen Augenentzündung mit Blepharospasmus.

1428. *Ry.* Micae panis albiss. 3iv.

Coque c. lact. q. s. ad catapl. consist.

Sub finem adde

Croci 3ß.

*M. S. Warm zwischen einem feinen Tuche auf
 die Augen zu legen.*

Anwend. Gegen Gerstenkörner, Tylosis u. s. w.

Beer.

1429. *Ry.* Pulv. croci $\mathfrak{z}$ j
 Camphor. $\mathfrak{z}$ ij
 Olei hyoscyam. $\mathfrak{z}$ ij
 Ungt. saturn. $\mathfrak{z}$ vj.
M. exact. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen schmerzhaftes Hämorrhoidalknoten.

Crotonis oleum. Krotonöl.

(Aus den Samen von Croton Tiglium L.)

Granatillöl.

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Pillen, Plätzchen, Emulsion, mit mildem Oel gemischt, zu $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$ —1 Tropfen, alle 3—4 Stunden. Aeusserlich zu Einreibungen zu 5—20 Tropfen, und Klystieren zu 1—2—4 Tropfen.

Man vermeide concentrirte Mineralsäuren, Chlor, Jod und Jodalkalien, starke Basen, salpeteters. Quecksilber, Wärme.

1430. *Ry.* Olei croton. gutt. j
 „ papav. alb. $\mathfrak{z}$ j.

M. S. Die Hälfte oder auch das Ganze auf einmal.

Oleum Ricini artificiale Hufelandi.

Anwend. Als kräftige Abführung statt des theuren Ricinusöls.

Hufeland.

1431. *Ry.* Olei croton. gutt. ij.
 Terendo bene misce c.
 Sapon. medic. pulv. $\mathfrak{z}$ ß.

Adde

Pulv. sem. foenicul. 3ß

Extr. taraxac. liqu. q. s. ut

f. pil. xxiv. Consp. sem. foenicul.

D. S. Aller 2—3 Stunden 2—4 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Leibesverstopfung.

Phöbus.

1432. *Ry.* Butyr. cacao 3j

Pulv. rad. salep ʒj.

Conterantur c. paux. aquae destill., ut f. magma consist. mellis rec.

Olei croton. gutt. x

„ anisi aether. gutt. xx

Pulv. rad. althaeae q. s.

M. exacte. F. pil. lx. Consp. irid. flor.

S. Eine Stunde nach dem Frühstück 2—6 Pillen.

Anwend. Mildes, aber sicheres Abführungsmittel.

Sundelin.

1433. *Ry.* Olei croton. gutt. v

Sapon. medic.

Gummi arab. āā ʒj.

M. f. l. a. pil xx. Consp. lycop.

D. S. Ein bis drei Stück auf einmal zu nehmen.

Anwend. Abführungsmittel.

Sundelin.

1434. *Ry.* Olei croton. gutt. ij

Sacchari albi

Mucil. gummi tragacanth. q. s.

ut f. trochisci, non torrendi, viij. Consp. pulv. sem. foenicul.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Stück zu nehmen, bis Wirkung eintritt.

Seiler.

1435. *Ry.* Olei croton. gr. v
 Pulv. rad. althaeae $\text{℥}\beta$.
 F. c. suff. mucil. tragacanth. pil. x. Consp.
 canell. alba.

S. Ein bis zwei Stück früh zu nehmen.

Anwend. Als Abführung.

Radius.

1436. *Ry.* Olei croton. gutt. iij
 „ amygdal. $\text{℥}\beta$.
 Gummi mimos. pulv. $\text{℥}\text{ij}$.
 Terendo sensim misce cum
 Syrup. flor. aurantior. $\text{℥}\text{j}$
 Aquae chamomill. $\text{℥}\text{v}$.

D. S. Umgeschüttelt, zweistündlich 1 Theelöffel
 bis zur Wirkung.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Phöbus.

1437. *Ry.* Olei croton. gutt. j—ij
 „ chamomill. simpl. gutt. ij.
 Terendo misce cum
 Mucil. gummi mimos.
 Syrup. amygdal. aa $\text{℥}\beta$.

D. S. Umgeschüttelt, zweistündlich einen Thee-
 löffel voll zu nehmen.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Lockstädt.

1438. *Ry.* Olei croton. gutt. ij
 Sacchari albi $\text{℥}\text{ij}$
 Gumm. arabici

Tinct. cardam. minor. āā 3β

Aquae destill. q. s. ut f. l. a. Potio 3jβ.

M. D. S. Aller 3—4 Stunden 2 Kaffeelöffel voll zu geben.

Anwend. Als Abführungsmittel für Kinder, wo es darauf ankommt, schnell Ausleerung zu bewirken.

Cory.

1439. *Ry.* Olei croton. part. ij

Lixiviae saponarior. part. j.

Tritura frigide et mixturam aliquanto spissam redditam in modulos chartaceos infunde, e quibus post aliquot dies exime.

S. Gr. ij—iij in Pillen oder in Lösung mit Zuckerwasser zu nehmen.

Sapo olei crotonis.

Anwend. Als kräftiges Abführungsmittel.

Caventou.

1440. *Ry.* Olei croton. gutt. ij

„ foenicul. gutt. iv

Sacchari albi 3viij.

M. f. pulv. Div. in viij part. aequal. D. in charta cerata.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Abführungsmittel.

Schubarth.

1441. *Ry.* Olei croton. gutt. j

Alcohol. 3β.

S. S. Zwanzig Tropfen bis zur Wirkung.

Anwend. Als Abführungsmittel.

Pope.

Weniger zu empfehlen.

1442. *Ry.* Olei croton. gutt. iij
 Gummi mimos. pulv. $\bar{3}$ jß
 Infus. herb. nicotian. ($\bar{3}$ j) $\bar{3}$ v.

S. Klystier.

Anwend. Gegen Kothbrechen.

Moll.

1443. *Ry.* Olei croton. gutt. vj
 Olei nuc. jugland. $\bar{3}$ j.

M. D. S. Dreimal täglich auf den Unterleib einzureiben.

Anwend. Abführungsmittel für Kinder, welche keine Arznei nehmen.

Schneider.

1444. *Ry.* Olei croton. gutt. x—xx
 „ terebinth. $\bar{3}$ ijß.

M. S. 5—10 Tropfen zum Einreiben.

Anwend. Zur Erregung eines künstlichen Ausschlages, namentlich bei Krankheiten des Kehlkopfes, Heiserkeit.

Romberg.

Cubēbae. Cubeben.

(Cubebenpfeffer. Von *Piper Cubeba* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Pillen, Lattwerge, zu $\bar{3}$ j—iv, mehrmals täglich. — Aether. Extrakt in Pillen, Bissen, zu gr. v—xv. — Aether. Oel 3—4 Tropfen, 3—4mal.

1445. *Ry.* Cubebar. pulv. $\text{℥}\beta$
 Mellis despum. q. s.
 F. electuar.

S Täglich 3—4mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Schleimflüsse der Harnblase, Harnröhre, und gegen nicht zu veraltete Schleimflüsse überhaupt.

Radius.

1446. *Ry.* Cubeb. pulv.
 Sacchari albi $\overline{\text{aa}}$ $\text{℥}\beta$.
 M. f. pulv. D. ad scat.

S. Des Morgens die Hälfte und Abends die andere Hälfte mit Wasser zu nehmen.

Anwend. Gegen Tripper.

Delpech.

1447. *Ry.* Cubeb. pulv. ℥ij
 Balsam. tolut. gr. vj
 Syrup. balsam. peruvian.
 Succ. liquirit. $\overline{\text{aa}}$ ℥j
 Gummi mimos. q. s.
 F. l. a. trochisci pond. gr. x. Consp. pulv. cinnam.

S. Zum beliebigen Gebrauch.

Anwend. Gegen Stockschupfen.

Spitta.

1448. *Ry.* Massae cacaotin. ℥vj
 Cubeb. pulv. ℥iv
 Balsam. indic. nigri ℥ij .
 M. f. l. a. tabulae xx.

S. Eine Tafel mit Wasser und Zucker zur Chocolate zu bereiten und täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen chronischen Durchfall.

Neumann.

1449. *Ry.* Extr. cubeb. aether. $\overline{3}j$
 Pulv. gummi mimos. $\overline{3}\beta$
 Aquae destill. $\overline{3}j$
 Magnes. albae $\overline{3}j\beta$.
M. f. pil. xc. Consp. lycop.
S. Täglich 3mal 10 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen Nachtripper.

Hausmann.

1450. *Ry.* Pulv. cubebar. $\overline{3}vj$
 Decoct. althaeae $\overline{3}vj$.
M. D. S. Klystier.
Anwend. Bei Blennorrhoe.

Hôp. de Perfect.

Cuprum. Kupfer.

A. Cuprum aceticum basicum; basisches
 essigsaures Kupferoxyd.

(*Aerugo, Viride Aeris, Cuprum subaceticum;*
Grünspan.)

Form u. Gabe. Innerlich ausser Gebrauch. Aeusser-
 lich in Augewässern, Linimenten, Salben, Ceraten, Pfla-
 stern.

1451. *Ry.* Aeruginis
 Hydrargyr. muriat. mit. $\overline{aa}$ $\overline{3}j$
 Ungt. rosat. rec. $\overline{3}x$.
M. f. unguentum.
S. Morgens und Abends die Ränder des Grindes
damit einzureiben.
Anwend. Gegen Erbgrind.

Fritz. Bicker.

1452. *Rx.* Aeruginis pulver. gr. v
 Ammon. muriat. dep. $\mathfrak{Z}$ ij.
 Solve in
 Aquae calcariae $\mathfrak{Z}$ xij.

M. D. S. Augenwasser.

Aqua ophthalmica coerulea s. saphirina,
 s. coelestis.

Anwend. Bei Blennorrhöen und Schlaffheit der Bindehaut
 und der Augenlider.

Scarpa.

1453. *Rx.* Emplastr. citrin. (diachyl. comp.) $\mathfrak{Z}$ jß
 Mellis $\mathfrak{Z}$ ß
 Tart. emetici
 Aeruginis $\overline{\text{aa}}$ gr. ij.

Mal. exact. S. Pflaster.

Anwend. Als gelind reizendes Mittel bei leicht rheumatischen
 Leiden.

Fricke.

1454. *Rx.* Aeruginis
 Aluminis $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{Z}$ ß
 Mellis $\mathfrak{Z}$ j
 Vini albi $\mathfrak{Q}$ ij.

S. S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen brandige Geschwüre.

Weickard.

1455. *Rx.* Aeruginis pulver. $\mathfrak{Z}$ j
 Adipis suilli rec. $\mathfrak{Z}$ ß.
 M, f. unguent.

D. S. Erbsengross aufzustreichen.

Anwend. Gegen Hühneraugen, Condylome u. s. w.

1456. *Ry.* Olei olivar. ℥iß
 Terebinth. ℥iij.
 Liqua leni igne et refrigeratis adde
 Aeruginis pulver. ℥ivß
 Olei caryophyllor. ℥jß.
 M. exacte.

D. S. Zum Verband.

Balsamum viride s. Metensium.

Anwend. Gegen unreine, wuchernde, schlaffe Geschwüre.

1457. *Ry.* Aeruginis pulv.
 Alumin. usti
 Pulv. herb. sabinae āā ℥ij.
 M. f. pulvis.

D. S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Gegen Condylome.

1458. *Ry.* Aeruginis
 Alumin. pur. āā ℥ij
 Mellis dep. ℥ß
 Vini gallici ℥j.

M. S. S. Zum Verbande.

Aqua viridis Hartmanni.

Anwend. Gegen unreine, schlaffe Geschwüre, brandigen Decubitus.

Martens.

1459. *Ry.* Galbani ℥j
 Terebinthinae ℥ij
 Resin. pini ℥ß.
 Liquatis adde
 Farin. frumenti

Pulv. gallarum
„ aeruginis āā 3j.
M. f. emplastrum.

S. Auf Leder zu streichen.

Emplastrum ad lupiam s. resolvers.

Anwend. Zur Zertheilung von Lupien, besonders in der Nähe von Gelenken. Vor der Anwendung soll der Theil 14 Tage lang mit einer starken Auflösung von Seesalz mehrmals täglich gewaschen werden.

Oxymel Aeruginis; Grünspansauerhonig.

(Unguentum aegyptiacum.)

Form u. Gabe. Zu Pinselsäften, Verband.

Man vermeide Verbindungen mit reinen und kohlen-sauren Alkalien.

1460. R_y. Oxymell. aerugin.
Mellis rosat. āā 3j.
M. f. Liniment.

D. S. Zum Bepinseln.

Anwend. Gegen fressende, chancreöse Geschwüre der Zunge.

Fischer.

B. Cuprum aceticum neutrale; neutraler
Grünspan.

(*Acetas cupricus cum aqua, Aerugo crystalli-
sata, Flores Aeruginis, Crystalli Veneris; kry-
stallisirter Grünspan, essigsaures Kupfer.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu gr.
 $\frac{1}{4}$ —j, einigemal täglich. Aeusserlich wie das vorige.

Man vermeide Mineralsäuren, Klee-, Blau-, Hydrothion-
säure, Arsenik, Zink, Eisen, Blei, Schwefelmetalle, viele
Salze, Gerbestoff, Zucker, Manna, Honig, Eiweiss.

1461. Rx. Cupri acetici cryst. gr. viij.

Solve in

Liqu. ammon. caust. 3ß.

Solutioni admisce

Aquae flor. aurantior.

„ menth. pip.

Syrup. althaeae aa 3ij.

M. D. S. Umgeschüttelt, Morgens und Abends
 $\frac{1}{2}$ —2 Esslöffel voll, in eine Tasse voll Wasser
gerührt, zu nehmen.

Anwend. Gegen hartnäckige syphilitische Affektionen.

Schlegel.

1462. Rx. Cupri acetic. cryst. gr. xv.

Solve in

Aquae destill. q. s.

Adde

Opii pulv. gr. v

Succi liquirit. dep. 3j

Pulv. rad. liquirit. q. s.
ut f. pil. CLXXX. Consp. cass. cinnam.

D. S. *Täglich 3mal 3—12 Stück zu nehmen.*

Phöbus.

1463. R_y. Cupri acet. cryst. gr. j—ij
Aquae destill. $\bar{3}$ iv—viiij
Extr. saturn. gutt. vj—viiij
Laudan. liquid. $\bar{3}$ j—iv.

M. S. *Augenwasser.*

Anwend. Bei eiterigen Absonderungen der Augenlider.

Benedict.

1464. R_y. Cupri acetic. cryst. gr. iv
Aquae rosar. $\bar{3}$ vj
Tinct. opii croc. $\bar{3}$ jß.

S. S. *Täglich 2—3mal die Augen zu baden.*

Anwend. Bei Blennorrhöen und Schloffheit der Bindehaut.

Montmahou.

C. Cuprum aluminatum; Kupferalaun.

*(Lapis divinus s. ophthalmicus; göttlicher Stein,
Beer's Augenstein, Wundstein.)*

Form u. Gabe. Nur äusserlich in Lösungen, gr. j—iv zu Augewässern auf $\bar{3}$ j, zu Einspritzungen und Wundwässern gr. v—xx auf $\bar{3}$ j.

Man vermeide (mit einigen sanktion. Ausnahmen) Metallsalze, Gerbestoff, Eiweiss, Quittenschleim.

1465. *Ry.* Cupri aluminat. gr. xij.
Solve in
Aquae commun. destill. $\bar{3}$ iv.
Adde
Tinct. opii croc. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Augenwasser.

Anwend. Gegen torpide katarrhalische Augenentzündung mit vermehrter Schleimabsonderung.

Beer.

1466. *Ry.* Lapid. divin. Beer. gr. ij
Aquae rosar. $\bar{3}$ vij
Mucilag. semin. cydonior. $\bar{3}$
Tinct. opii croc. $\bar{3}\beta$.

M. Cola. S. Augenwasser.

Anwend. Gegen asthenische Entzündung der Bindehaut und torpiden Schleimfluss des Auges.

v. Gräfe.

1467. *Ry.* Lapid. divin. Beer. gr. iv
Aquae destill. $\bar{3}$ iv
Acidi pyrolignos. gutt. x.

M. S. Augenwasser

Anwend. Gegen Pannus von chronisch-katarrhalischer Augenentzündung.

Fr. Jäger.

1468. *Ry.* Cupri aluminat. gr. v
Ammon. muriat. dep. gr. ijß.
Solve in
Aquae destill. $\bar{3}$ j.

D. S. Umgeschüttelt, Augentropfwasser.

Anwend. Zu gleichem Zwecke.

Richter.

1469. *Ry.* Cupri aluminat. gr. iij—iv.

Solve in

Aquae sambuci $\mathfrak{z}$ j.

Adde

Tinct. opii simpl. gutt. xij

Acet. plumb. gutt. v.

M. D. S. Umgeschüttelt, als Augentropfwasser.

Anwend. Zur Vernarbung von Hornhautgeschwüren.

Rust.

1470. *Ry.* Lapid. divin. gr. ix

Aquae destill. $\mathfrak{z}$ ij

Tinct. anod. $\mathfrak{z}\beta$

Acet. lythargyr. gutt. ij.

S. Augewasser.

Anwend. Gegen torpide katarrhalische Augenentzündung mit sehr vermehrter Schleimabsonderung und Exkorationen.

Fischer.

1471. *Ry.* Cupri aluminati gr. viij—xij.

Solve in

Aquae destill. $\mathfrak{z}$ iv β .

Adde

Aceti plumb. gutt. xij—xx

Tinct. opii croc. $\mathfrak{z}$ j— $\mathfrak{z}$ j.

M. D. S. Augewasser, umgeschüttelt, mit Läppchen überzuschlagen.

Anwend. Gegen torpide Augenentzündungen, z. B. gegen Triefauge, und im letzten Stadium der Tripper-Augenentzündung.

Benedict.

1472. *Ry.* Lapid. divin. Beer. $\mathfrak{z}$ j

Aquae destill. $\mathfrak{z}$ iv

Laud. liquid. $\mathfrak{z}$ j β .

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Zur Beschränkung der krankhaften Schleimabsonderung und Aufwulstung der Schleimhaut im Nasenkanale.

Fischer.

1473. *Ry.* Cupri aluminat. $\bar{3}j$.

Solve in

Decoct. rad. althaeae ($\bar{3}j\beta$) $\bar{3}vj$.

Adde

Tinct. opii simpl. $\bar{3}j$

Mellis. rosat. $\bar{3}j$.

M. D. S. Umgeschüttelt, Gurgelwasser.

Anwend. Bei Residuen von Anginen.

Schönlein.

D. Cuprum ammoniatum; Ammoniakkupfer.

1474. *Ry.* Cupri limati $\bar{3}j$

Liqu. ammon. caustic. $\bar{3}j\beta$.

Digere leni calore in vase amplo clauso per triduum. Filtra.

S. Täglich 3mal 4—10 Tropfen mit Haferschleim.

Tinctura Veneris volatilis.

Anwend. Als harntreibendes und Nervenmittel.

Boerhaave.

E. Cupri ammoniato-muriatici liquor;
salzsaure Kupferammoniakflüssigkeit.

Form u. Gabe Mischung 1—5 Tropfen, 1—3 mal. — Aqua antimiasmatica, $\bar{3}ij$ —iv, 2—3mal.

1475. *Ry.* Liqu. cupri ammoniato-muriat. $\bar{3}ij$

Aquae destill. simpl. $\bar{3}xx$.

M. S. Anfangs blos Mittags nach dem Essen, später auch Abends 1 Esslöffel.

Aqua antimiasmatica Koechlini s. Beisseri.

Anwend. Gegen veraltete Kachexieen, besonders eingewurzelte, mit Geschwürbildung verbundene, durch Quecksilbermiss-

brauch entartete Syphilis. Gegen Scrofulosis (Hufeland). Gegen Flechten (Heineken). Gegen Wassererbrechenⁿ mit kardialgischen Beschwerden; Neigung zu Unterleibsabzehrung Erwachsener, skrofulöser Atrophie der Kinder, Physkonie, andere Unterleibsleiden von gestörter Assimilation.

Kopp.

1476. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. j.

Solve in

Aquae antimiasmat. simpl. $\bar{3}$ iv.

S. Erwachsenen einen Esslöffel und Kindern einen Theelöffel voll täglich zweimal nach der Mahlzeit, und 1 — 2 Esslöffel Wein nachzutrinken.

Aqua antimiasmatica composita.

Anwend. Gegen Skrofelkachexie mit phagedänischer Geschwürbildung; gegen Ozaena und Caries syphilitica und andere syphilitische Symptome mit gänzlicher Atonie und Kachexie, auch im zweiten Stadium des Keuchhustens, innerlich und äusserlich angewendet.

Gölis. Schubarth.

1477. *Ry.* Liqu. cupri ammon.-muriat. $\bar{3}$ j

Tinct. sacchari (Alkohol mit gebranntem Zucker) $\bar{3}$ j

Aquae melissae $\bar{3}$ vj.

M. S. Mittags und Abends $\frac{1}{2}$ Stunde nach dem Essen einen Esslöffel.

Anwend. Bei Atrophie der Kinder aus Unterleibsfehlern. Für Erwachsene auf $\bar{3}$ v Wasser $\bar{3}\beta$ —j des Liquor.

Kopp.

1478. *Ry.* Liqu. cupri ammoniato-muriat. $\bar{3}$ j

Aquae flor. aurant. $\bar{3}$ ix

Tinct. sacch. gutt. viij.

M. S. Mittags und Abends $\frac{1}{2}$ Stunde nach dem Essen 6—12—20 Tropfen auf Zucker.

Anwend. In gleichen Fällen für Kinder.

Kopp.

1479. *Ry.* Liqu. cupri ammoniato-muriat. 3j—ij
Aquae cinnamon. spirit. 3vj.

M. S. Umgeschüttelt, 3 — 4 mal täglich 1 Ess-
löffel.

Anwend. Gegen Flechtenausschlag.

Heineken.

F. Cuprum ammoniato-sulphuricum;
schwefelsaures Ammoniakkupfer.

(*Ammoniacum cuprico-sulphuricum.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lö-
sung, zu gr. $\frac{1}{8}$ —2—3, zwei bis dreimal täglich; äusser-
lich zu Gurgelwässern und Einspritzungen.

Man vermeide Alkalien und alkalische Erden, Säuren,
Salze, Schwefelmetalle, Gerbestoff, Zucker, Manna, Honig,
Eiweiss, Weingeist, viel Wasser, gemeines Wasser, Luft.

1480. *Ry.* Cupri ammon.-sulphur. gr. ij—iv
Pulv. rad. belladonnae gr. j—iv
Sacchari albi 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Epilepsie.

v. Hildenbrand.

1481. *Ry.* Cupri ammon.-sulphur. gr. xvj
Micae panis albi 3iv

Liqu. ammon. caustic. q. s.
F. pil. xcvj. Consp. lycop. D. ad vitr.

S. Täglich 2—4 Stück; späterhin mehr.

Pilulae coeruleae Edinburg., welche jedoch sorgfältig von den blauen Pillen der Engländer zu unterscheiden sind.

Anwend. Gegen Epilepsie und Gesichtsschmerz.

Wendt.

1482. *Ry.* Cupri ammon.-sulphur. gr. ij
Rad. liquirit. ʒj (gr. xij)
Syrup. simpl. q. s.
M. f. pil. viij. Consp. lycop.

S. Aller 4 Stunden ein Stück.

Pilulae cupri ammoniacalis Brerae.

Anwend. Gegen hartnäckige und unordentliche Wechselfieber bisweilen nützlich. In solchen, wo beträchtliche Unterleibsstockungen und Drüsenleiden zugegen sind.

Brera.

1483. *Ry.* Micae panis albi gr. XLviij
Cupri ammon.-sulphur. gr. viij
Ammon. carbon. q. s.
F. pil. XLviij. Consp. cinnam. D. in vitro.

S. Zwei bis drei Stück des Tages.

Anwend Gegen Epilepsie, hartnäckige Blutflüsse.

Swediaur.

1484. *Ry.* Cupri ammon.-sulphur. gr. iv.
Solve in
Aquae destill. q. s.

Adde

Micae panis albi

Sacchari albi āā gr. xij.

M. f. pil. gr. j. Dent in vitro bene clauso.

S. Morgens und Abends 1—4—8 Stück zu nehmen.

Anwend. In der Epilepsie.

Bichter.

1485. *Ry.* Cupri ammon.-sulphur.

Opii puri āā gr. x

Extr. taraxaci

Pulv. rad. althaeae āā ʒij.

M. f. pilulae gr. ij. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 5 Stück.

Anwend. Gegen Honigharnruhr, zur Umstimmung der fehlerhaften Thätigkeit der Verdauungswerkzeuge.

Berndt.

1486. *Ry.* Cupri sulphur. puriss.

Liqu. ammon. pur. ʒj—ij.

Solutis adde

Aquae destill. simpl. l. valerian. l. chamom.

q. s. ut totum efficiat. ʒj.

S. Täglich 2—4mal 10—20 Tropfen mit Hafer-schleim.

Anwend. Gegen die vorgenannten Krankheiten.

Kraus.

1487. *Ry.* Cupri ammon.-sulphur. gr. iv

Aquae destill. ʒß

Liqu. ammon. succin. ʒij.

S. S. Aller 3 Stunden 25 Tropfen.

Anwend. Gegen mehrere krampfhafte Krankheiten, besonders Epilepsie.

Vogt.

1488. *Ry.* Cupri ammon.-sulphur. gr. 3ß
Aqua destill. (cinnam.) 3j.

S. S. Täglich 3mal 5 Tropfen.

Anwend. Gegen Veitstanz; auch gegen Epilepsie. In der Gabe allmählig zu steigen.

Niemann.

1489. *Ry.* Cupri ammon.-sulphur. gr. viij
Aqua destill. sabinae 3vj.

S. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen chronische Bräune.

Kopp.

G. Cuprum sulphuricum; schwefelsaures
Kupfer.

(*Vitriolum coeruleum, V. de Cypro s. Veneris, Sulphas cupricus cum aqua; Kupfer-
vitriol, blauer, cyprischer, spanischer Vitriol,
Blaustein.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lösung, zu gr. $\frac{1}{4}$ —j, zwei- bis dreimal täglich; als Brechmittel, zu gr. ij—vj, auf einmal. Aeusserlich in Substanz als Aetzmittel, in Augen-, Mund-, Gurgel-, Verband-Wässern, Einspritzungen, Pinselsäften u. s. w., zu gr. j—ij auf 3j.

Man vermeide Salz-, Blau-, arsenichte Säure, Alkalien, Salze, Seifen, Phosphor, Gerbestoff, Zucker, Manna, Eiweiss, Schleime, Honig, Weingeist; Gefässe von Eisen, Zink, Blei.

1490. *Ry.* Cupri sulphur. cryst. gr. xij
 Sacchari albi ℥iv.
M. f. pulv. Div in iv part. aequal.

S. Nach Verordnung.

Anwend. Gegen Croup zuerst von Heinr. Hoffmann empfohlen. Man giebt erst ein ganzes Pulver, dann löst man eins in 3 Esslöffeln Wasser und giebt alle Stunden 1 Esslöffel von dieser Auflösung. Kehren die Erstickungszufälle wieder, so reicht man abermals ein Pulver.

Hoffmann.

1491. *Ry.* Cupri sulphur. gr. j—jß—ij
 Sacch. lactis ℥ij.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Alle Viertelstunden ein Pulver, bis Erbrechen folgt.

Anwend. Beim Croup 1—7jähriger Kinder. Ist am folgenden Tage die Stimme noch heiser, die Brust bewegt u. s. w., so werden dieselben Gaben in 1½ stündigen Zwischenräumen gereicht.

Kopp.

1492. *Ry.* Cupri sulphuric. gr. iv
 Sacch. lactis ℥viij.
M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Täglich zweimal ein Pulver.

Anwend. Gegen hartnäckigen Durchfall.

Elliotson.

1493. *Ry.* Cupri sulphurici
 Opii puri āā gr. iij
 Pulv. canell. albae

Sacchari albi āā ʒj.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Morgens und Abends ein Pulver zu nehmen.

Anwend. In eingewurzelten Neurosen, zumal Epilepsie.

Richter.

1494. *Rx.* Cupri sulphur. ʒß

Solve in

Aquae destill. q. s.

Adde

Opii pulverat. gr. ij

Extr. conii macul. ʒj

Pulv. rad. liquirit. q. s.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycopod. D. in vitro.

S. Täglich dreimal 4 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Phthisis pulmonalis.

F. Jahn.

1495. *Rx.* Cupri sulphur. gr. xv—xxx

Infus. fol. salviae (ʒß) ʒvj

Tinct. myrrhae

„ catechu

„ kino āā ʒj

„ pimpinell. ʒv

Mellis crudi ʒvj.

S. M. S. Umgeschüttelt, stündlich den Mund damit auszuspülen. (Unchemisch, doch kräftig wirkend.)

Anwend. Bei hartnäckigem Speichelfluss.

Kopp.

1496. *Rx.* Pulv. gummi mimos. ʒij

Cupri sulphur. ʒß

Kino $\overline{3}$ ij.

M. f. pulvis.

D. S. Streupulver.

Anwend. Bei parenchymatösen Blutungen.

G. A. Richter.

1497. *Ry.* Pulv. Gummi mimos. $\overline{3}\beta$
 Cupri sulphur. subt. pulv. $\overline{3}$ ij
 Gummi kino pulv. $\overline{3}$ j
 Lapid. haematit. $\overline{3}\beta$.
 M. f pulvis.

S. Blutstillendes Pulver.

Pulvis haemostaticus Gräffii.

Anwend. Wie das vorige zu gleichem Zwecke.

v. Gräfe.

1498. *Ry.* Cupri sulphur. in aquae destill. q. s. soluti
 Zinci oxydat. $\overline{aa}$ gr. v
 Camphor. c. paux. olei oliv. trit. gr. ij
 Butyri recent. insuls. $\overline{3}$ ij.

F. l. a. unguentum. M. exact. D. in olla alba.

S. Jeden Abend einer Linse gross zwischen die Wimpern mit den Fingern einzureiben.

Anwend. Bei Psorophthalmie.

Rust.

1499. *Ry.* Cupri sulphur.
 Alumin. crud. $\overline{aa}$ $\overline{3}$ j.

Solve in

Aquae destill. $\overline{3}$ ij.

D. S. Mit Charpie aufzulegen.

Anwend. Gegen schwammige Chankergeschwüre, mit über die Oberhaut erhabenem, fungösem, rothblauem Grunde ohne Ränder und ohne Entzündung.

Fricke.

Lapis divinus Pharm. Sax.; göttlicher
Stein St. Yves's.

Form u. Gabe. In Lösung als Augenwasser zu
gr. j — iij, als Einspritzung, Verbandwasser gr. v — x
auf $\bar{3}j$.

1500. Ry. Lapid. div. St. Yv. gr. i — ij
Aquaе rosar. $\bar{3}j$.

S. S. Täglich 3 — 4 mal einige Tropfen in das
Auge zu lassen.

Anwend. Gegen torpide Entzündung und Schleimfluss des
Auges, Hornhautflecke, Pannus u. s. w.

1501. Ry. Lapid. divin. gr. x
Ammon. muriat. gr. v
Aquaе rosar. $\bar{3}ij$.
M. Filtra.

S Augenwasser.

Anwend. Gegen atonische Ophthalmieen und gegen rheuma-
tische Augenentzündung torpider Subjekte.

Theden. Richter.

1502. Ry. Balsam. arcaeī $\bar{3}ij$
Lapid. divin. pulv. $\bar{5}j\beta$.

M. S. Zum Verband.

Anwend. Zur Heilung schwammiger Wunden und Geschwüre.

Schmucker.

Cydonium. Quitte.

(Von *Cydonia vulgaris Pers.*, *Pyrus Cydonia L.*)

Die Früchte sind fast völlig ausser Gebrauch, nur die Samen werden zur Bereitung eines Schleimes angewendet.

Form u. Gabe. Innerlich zu $\mathfrak{z}\beta-j$; mehr äusserlich zu Augenwässern u. s. w., $\mathfrak{z}\beta-ij$ auf $\mathfrak{z}j$ Wasser.

Man vermeide Verbindungen mit Metallsalzen, namentlich Bleizucker, mit Spiritus.

1503. Rx. Mucil. sem. cydonior. $\mathfrak{z}j$
Vitell. ovor. ij
Mellis rosat. $\mathfrak{z}iij$.

M. S. Täglich 4—6mal einen Kaffeelöffel voll.

Anwend. Bei Schwämmchen im Schlunde, Trockenheit des Halses und Heiserkeit der Schwindsüchtigen.

de Haen.

1504. Rx. Mucil. sem. cydonior. $\mathfrak{z}ij$
Syrup. althaeae $\mathfrak{z}j$.

M. S. Theelöffelweise.

Anwend. Bei katarrhalischen Brustaffektionen, heftigem Husten der Kinder, besonders in den Masern.

1505. Rx. Mucil. sem. cydonior. $\mathfrak{z}ij$
Aquae rosar. $\mathfrak{z}ij$

M. S. Augewasser.

Reil.

1506. *Ry.* Extr. opii gr. iij.

Solve in

Aquae destill. ℥ij.

Adde

Mucil. sem. cydonior. ℥j.

D. S. Mehrmals täglich erwärmt einzuspritzen.

Anwend. Schmerzstillend bei heftigem Tripper.

Wendt.

D.

Dictamni albi radix. Diptamwurzel.

(*Fraxinellae radix.* Von *Dictamnus albus* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, zu gr. iv—x, im Aufguss, ʒj—ij auf ʒß, 2—4mal.

1507. R̄. Cortic. radic. dictamni albi ʒj
Pulv. zedoariae ʒjß.

M. f. pulv.

S. Zweimal täglich 2 Skrupel in Lindenblüthen-
thee zu nehmen.

Anwend. Gegen Epilepsie. In schlimmeren Fällen viermal;
dann mit der Hälfte Zedoaria.

Sloet v. Oldbruitenborg.

1508. R̄. Radic. dictamni albi
„ paeoniae
Visci quern. āā ʒijß
Ligni aloes
Lapid. cancror. ppt. āā ʒj
Succini albi ʒß

Carbonis puri ℥ij.
M. f. pulv. subtiliss.

D. S. Täglich einigemal zu gr. v — x kleinen Kindern, Erwachsenen mehr zu geben.

Pulvis epilepticus niger.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Struve.

1509. R_x. Pulv. rad. dictamn. albi ℥β
Conserv. menth. pip. ℥ij
Syrup. q. s.
ut f. electuar.

S. Allér 3 Stunden 1 Kaffeelöffel voll.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Wiener Aerzte.

Digitalis purpureae folia s. herba. Blätter des rothen Fingerhuts.

(*Digitalis purpurea* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu gr. β—ij—iv, einigemal täglich; in Aufguss und (selten) Abkochung, zu ℥j—iij auf ℥vj, esslöffelweise. — Extrakt, gr. j—iv. — Einfache oder äther. Tinktur, zu 10—30 Tropfen, 2—5mal täglich. Aeusserlich zu Bähungen, Waschungen, Linimenten, Salben, Pflastern.

Man vermeide Salzbilder, empfindliche Metallsalze, Gerbestoff.

1510. R_x. Pulv. fol. digital. purp. gr. j—ij
„ clavell. cinnam. gr. iv

Sacchari albi gr. x.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. *Täglich 2—3mal 1 Pulver.*

Anwend. Gegen organische Herzfehler, Wassersucht u. s. w.

1511. *Ry.* Pulv. fol. digital. purp. ʒj
Kali nitric. ʒj—iij.

M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

S. *Aller 2—4 Stunden 1 Pulver.*

Pulveres diuretici Brerae.

Anwend. Bei entzündlicher oder plethorischer Konstitution oder bei gleichzeitiger örtlicher Entzündung im Unterleibe als harntreibendes Mittel.

Brera.

1512. *Ry.* Herb. digital. purp. gr. ij
Hydrargyr. muriat. mit. gr. iv—viij
Sacchari lactis ʒiv.

M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. *Aller 2 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. In der hitzigen Gehirnhöhlenwassersucht.

Goelis.

1513. *Ry.* Pulv. fol. digital. purp.
„ rad. scill. gr. vj
Calomel. gr. ix
Opii puri gr. iij
Elaeosacch. foenicul. ʒj.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. *Täglich 3—4 Pulver zu nehmen.*

Anwend. Bei drohender Wassersucht im Stadium Desquamations des Scharlachs.

Hufeland.

1514. *Ry.* Pulv. fol. digital. purp. gr. vj
Sulphur. antim. aurant.
Hydrargyr. muriat. mit. āā gr. iij

Sacchari albi 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. *Aller 3 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Gegen Lungenentzündung.

v. Hildenbrand.

1515. Rx. Pulv. fol. digital. purp. gr. x—xv

Hydrargyr. mur. mit. gr. iv—vj

Sacchari albi 3v.

M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

S. *Stündlich 1 Pulver zu nehmen.*

Anwend. Gegen Rose, besonders wenn sie epidemisch und bei Scharlachepidemieen vorkommt, mit starkem Andrang nach dem Kopfe verbunden ist. Später Digitalis allein.

Kopp.

1516. Rx. Herb. digital. purp. gr. j

Hydrargyr. muriat. mit. gr. ij

Rad. jalapae 3ß.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. *Aller 3 Stunden 1 Pulver und so lange fortgegeben, bis wässerige Stühle erfolgen.*

Anwend. Im Hydrothorax.

Wolff.

1517. Rx. Herb. digital. purp. gr. j

Rad. scillae. pulv. gr. ij

Tart. depur. 3ß.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. *Dreimal täglich 1 Pulver.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

Osiander.

1518. Rx. Fol. digital. purp. gr. $\frac{1}{4}$ —ß—j

Chinii sulphur. gr. ß—j—ij

Semin. foenicul. gr. vj.

Sacchari lactis $\mathfrak{z}\beta$.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. *Täglich 3—4mal 1 Pulver mit Galeopsis grandiflora als Thee.*

Anwend. Gegen Lungenschwindsucht mit vorherrschender Irritabilität.

Günther.

1519. Ry. Pulv. fol. digital. purp. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
Extr. amari (cent. min.) $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. f. pil. xl. Consp. lycop.

D. S. *Anfangs 2, später 4—6 Pillen täglich zu nehmen.*

Anwend. Gegen Wassersucht, organische Herzfehler u. s. w.

J. A. Schmidt.

1520. Ry. Pulv. fol. digital. purp.

Rad. scillae $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$

Extr. gentian. rubr. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$

Olei juniperi gutt. viij.

M. f. c. Syrup. simpl. q. s. pil. xij. Consp. lycop.

S. *Dreimal täglich 1 Pille.*

Anwend. Bei Wassersucht.

Pearson.

1521. Ry. Fol. digital. purp. pulv. gr. vj

Mucil. gumm. arab. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. f. boli vj.

S. *Aller 2 Stunden 1 Stück.*

Boli deprimentes Brerae.

Anwend. Um die Blutthätigkeit herabzustimmen.

Brera.

1522. Ry. Herb. digital. purp. pulv. gr. iij

Opii crudi gr. $\mathfrak{j}\beta$

Pulv. cort. cascarill. $\mathfrak{z}\beta$

Syrup. simpl. q. s.

ut fiant l. a. boli tres.

S. *Früh und Abends 1 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Wassersucht.

J. A. Schmidt.

1523. *Ry.* Fol. digital. purp. $\mathfrak{z}\text{j}$ — $\mathfrak{z}\beta$.
 Infunde cum
 Aquae ferv. q. s.
 Digere per $\frac{1}{4}$ hor. Colat. $\mathfrak{z}\text{iv}$ adde
 Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{z}\text{ij}$ — iiij .

S. *Aller 4 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Brust- oder Herzbeutelwassersucht, Herzklopfen.

Radix.

1524. *Ry.* Fol. digital. purp. conc. $\mathfrak{z}\beta$
 Rad. ipecacuanh. conc. gr. xv.
 Infunde aquae font. ferv. q. s. ad col. $\mathfrak{z}\text{iv}$.
 Digere per $\frac{1}{4}$ hor. Colat. adde
 Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\text{vj}$
 Liqu. ammon. anis. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.*

Anwend. Ausser andern Fällen, besonders bei krampfhaften Leiden des Nervus vagus dienlich.

Choulant.

1525. *Ry.* Fol. digital. purp. $\mathfrak{z}\beta$.
 Infunde cum
 Aquae ferv. q. s.
 per $\frac{1}{2}$ hor. Colat. $\mathfrak{z}\text{iiij}$ adde
 Vini stibiat. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Kinderlöffel voll.*

Anwend. Gegen floride Skrofeln.

Wendt.

1526. *Ry.* Herb. digital. purp. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Aquae commun. ferv. q. s.

Repone ad refriger. Colat. $\bar{\text{z}}\text{vj}$ adde
Tinct. aromat. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden 1 Ess-
löffel.

Dabei täglich 3mal Pulv. rad. scillae gr. j.

Anwend. Bei Wassersucht.

Horn.

1527. *Ry.* Fol. digital. purp. $\bar{\text{z}}\text{j}$
Rad. calami arom. $\bar{\text{z}}\text{iiij}$.
Inf. aquae ferv. q. s. ad colat. $\bar{\text{z}}\text{v}$.
Tart. boraxati
Succi juniperi $\bar{\text{z}}\text{ij}\beta$.

M. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen asthenische Wassersucht.

Sundelin.

1528. *Ry.* Fol. digital. purp. $\bar{\text{z}}\text{j}$.
Inf. per $\frac{1}{4}$ hor. aquae ferv.
Colat. $\bar{\text{z}}\text{iv}$ adde
Essent. absinth.
Spirit. muriat.-aeth. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{ij}$
Syrup. althaeae $\bar{\text{z}}\beta$.

M. S. Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Jahn.

1529. *Ry.* Herb. digital. purp. $\bar{\text{z}}\beta$ —j
Semin. phellandr. $\bar{\text{z}}\beta$
Aquae commun. ferv. q. s.
Repone ad refriger. Colat. $\bar{\text{z}}\text{tv}$ adde
Spirit. nitrico-aether. $\bar{\text{z}}\text{j}$
Syrup. althaeae $\bar{\text{z}}\beta$.

M. D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei pituitöser Lungensucht.

Jahn.

1530. *Ry.* Fol. digital. purp. $\mathfrak{3}\beta$
 Cort. cascarill. l. Ras. lign. quass. $\mathfrak{3ij}$.
 Coque cum
 Aquae font. $\mathfrak{3vj}$ ad colat. $\mathfrak{3iv}$.
 Cui adde
 Spirit. Mindereri
 Syrup. simpl. $\overline{aa}$ $\mathfrak{3}\beta$.

M. S. Täglich 3—4 mal $\frac{1}{2}$ Esslöffel voll und allmählig bis zu einem ganzen Esslöffel voll zu steigen.

Anwend. In Brust- und Bauchwassersuchten.

Harless.

1531. *Ry.* Tinct. digital. purp. $\mathfrak{3ij}$
 „ scillae $\mathfrak{3j}$.

M. S. Aller 2—4 Stunden 30 Tropfen.

Anwend. Gegen Wassersucht.

Horn.

1532. *Ry.* Tinct. digital. purp. $\mathfrak{3ij}$
 „ chinae Huxhami $\mathfrak{3vj}$.

M. S. Dreimal täglich 15—30 Tropfen.

Anwend. Gegen Wassersucht, besonders Brustwassersucht bejahrter Individuen.

Berends.

1533. *Ry.* Extract. digital. purp. $\mathfrak{3}\beta$
 Aquae lauracerasi $\mathfrak{3}\beta$.

S. S. Täglich 2—3mal 20—30 Tropfen.

Anwend. Bei Brustbräune.

1534. *Ry.* Herb. digital. purp. $\mathfrak{3}\beta$
 Aceti $\mathfrak{3iv}$.

Digere leni calore per nychthemeron.

In colat. solve

Sacchari albiss. $\mathfrak{z}\text{v}$.

D. S. Einen Theelöffel voll und mehr auf einmal zu nehmen.

Oxysaccharum liquidum herbae digitalis.

Anwend. In der Wassersucht.

Martius.

1535. *Ry.* Herbae digital. purp. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Infunde cum

Aquae ferv. q. s. ad rem. colat. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Refriger. adde

Olei terebinth. $\mathfrak{z}\text{j}$

Vitell. ovar. ij .

F. l. a. emulsio, cui adde

Extr. scillae $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S. Zum Einreiben auf den Unterleib.

Anwend. In der Wassersucht.

G. A. Richter. Schubarth.

1536. *Ry.* Herb. digital. purp. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Aceti $\mathfrak{z}\text{j}$.

Coque sub cont. agitat. ad consumt. tertiae part.

Colat. evapora leni igne ad extracti consist. Adde

Hydrargyr. muriat. mit. $\mathfrak{z}\beta$

Ungt. elemi $\mathfrak{z}\text{viij}$.

M. f. ungt.

D. S. Auf Leinwand dick aufgestrichen 2mal täglich überzulegen.

Anwend. Gegen chronische Drüsengeschwülste.

Sundelin.

Diosmae crenatae folia. Buccublätter.

(*Von Diosma crenata L. Barosma serratifolia Willd.*)

Buchu- oder Buccoblätter.

Form u. Gabe. In Pulver, zu $\mathfrak{z}\beta$ —j, 2—3 mal täglich; in Aufguss oder Abkochung, zu $\mathfrak{z}\beta$ —j auf $\mathfrak{z}\nu j$ —viij. Tinktur, zu $\mathfrak{z}j$ —ij.

1537. Rx. Diosmae crenat. fol. $\mathfrak{z}j$
 Aquae destill. ferv. octarium.
 Macera per hor. iv in vase leviter clauso et cola.
 D. S. Alle Stunden oder aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Reizung der Urinwege, Blasenkatarrh, Harn-gries u. s. w.

Pharm. Lond.

1538. Rx. Fol. diosm. crenat.
 „ uvae ursi $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\beta$
 Aquae ferv. $\mathfrak{z}\nu iij$.
 Digere leni calore in vase clauso per $\frac{1}{2}$ hor.
 Colat. adde
 Syrup. senegae $\mathfrak{z}\beta$.

S. Aller 2 Stunden 1—2 Esslöffel.

Anwend. Bei Blennorrhöe. Atonie und Lähmung der Harnblase.

Clarus.

Dulcamarae caules. Bittersüsstengel.

(*Stipites fälschlich. Von Solanum Dulcamara L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\beta$, täglich einigemal; in Aufguss oder leichter Abkochung, $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{ij}$ auf $\mathfrak{H}\mathfrak{ij}$, täglich zu verbrauchen. Extrakt in Lösung, Pillen u. s. w., zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{j}$, mehrmals täglich.

Man vermeide Salzbilder, viele Metallsalze, Chlorkalk, zum Theil auch Alkalien und alkalische Erden, Gerbestoff.

1539. **Ry.** Sulphur. antimon. aurant.

Hydrargyr. muriat. mit.

Extr. aconiti $\overline{\text{aa}}$ gr. $\mathfrak{ij}$

Pulv. caul. dulcamar.

Sacchari albi $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. Morgens und Abends 1 Pulver.

Anwend. Gegen chronische Gicht.

Richter.

1540. **Ry.** Caul. dulcamar.

Rad. liquirit. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\beta$

Herb. althaeae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Conc. M. f. species.

S. Zum Thee, welcher leicht aufgekocht werden muss.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Goelis.

1541. *Ry.* Caul. dulcamar. 3ij—iij
 Specier. pectoral. 3ß.
C. C. M. f. species.

D. S. Mit 6 Tassen Wasser auf die Hälfte einzukochen und davon täglich 3 mal eine Tasse zu trinken.

Anwend. Bei chronischen Katarrhen.

Berends.

1542. *Ry.* Extr. dulcamar. 3jß
 „ senegae 3j
 „ conii mac. 3ß
 Vini stibiat.
 Aquae cinnamom. āā 3ß.

M. S. Täglich 4mal 40—80 Tropfen.

Anwend. Gegen weisse Kniegeschwulst. Dieses Mittel muss Monate lang fortgebraucht werden; dabei aller 8 Tage eine Abführung aus Kalomel und Jalape; äusserlich Einreibung aus grauer Quecksilbersalbe und Digitalis, und Emplastrum camphoratum Mynsichti aufgelegt; täglich ein Halbbad von ungelöschem Kalke und Schwefel (von jedem 3jß mit einander aufgekocht und die Lauge zum Bade). Ein Fontanell in die Nähe. — Auch gegen Schleimswindsucht oder krampfhaften Husten.

Hufeland.

1543. *Ry.* Extr. dulcamar. 3ß
 Infus. liquirit.
 Decoct. althaeae āā 3jß
 Laud. liquid. gutt. ij
 Oxymell. simpl. 3iij.

M. S. Theelöffelweise.

Anwend. Bei langwierigem Husten der Kinder.

Goelis.

1544. Ry. Decoct. rad. althaeae (3ij) 3iv
 Nitri depur. gr. xij
 Extr. dulcamar. gr. vj
 Syrup. diacod. 3j.

M. D. S. Stündlich einen Kinderlöffel.

Anwend. Beim Keuchhusten oder einem heftigen Husten.

Goelis.

1545. Ry. Extr. dulcamar. 3jß
 „ marrub. 3ij
 Aquae foenicul. 3v
 Liqu. ammon. anis. 3ij
 Syrup. althaeae 3jß.

S. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Gegen chronische Blennorrhöen und veralteten Katarrh.

Berends.

1546. Ry. Extr. dulcamar. 3ij
 Hydrargyr. antimon. sulphur.
 Resin. guajac. nativ. pulv. aa 3j
 Pulv. herb. violae tricol. q. s. ut f. pil. cxx.
 Consp. pulv. rad. liquirit.

S. Täglich 2mal 8 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Gichtkachexie und chronische Hautausschläge.

1547. Ry. Extr. dulcamar. 3j
 Pulv. dulcamar.
 Antimon. crudi aa 3ß.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 2mal 15—20 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen verschiedene Hautkrankheiten, besonders Flechten. Dabei eine starke Abkochung der Bittersüßstengel.

Althof.

E.

Elaterium. Elaterium.

(*Von Momordica Elaterium L.*)

Succus inspissatus s. Extractum Elaterii; Esels-Gurken-, Esels - Kürbis - Saft oder Extrakt.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Mixturen, zu gr. $\frac{1}{4}$ —j—iij, täglich mehrmals.

Man vermeide concentrirte Mineralsäuren, Salzbilder, Metallsalze, Gerbestoff.

1548. Ry. Elaterii gr. j
Aquae petroselin. $\bar{\text{z}}$ vj
Spirit. nitrico - aether. $\bar{\text{z}}$ ij
Oxymell. scillit.
Syrup. rhamni cathart. $\bar{\text{a}}$ a $\bar{\text{z}}$ j
Tinct. aromat. $\bar{\text{z}}$ j.

M. S. Aller 2—3 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen, je nachdem die Wirkung auf die Ausleerungen stärker oder schwächer ist.

Mixtura hydragoga Hufelandi.

Anwend. Gegen Wassersuchten, besonders mit Verstopfung der Unterleibseingeweide.

Hufeland.

1549. Ry. Elaterii gr. xv
 Extr. panchymag. Croll. $\mathfrak{z}$ j
 Olei cinnamom. gutt. ij.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

D. S. *Auf einmal zu nehmen.*

Anwend. Bei hartnäckiger Verstopfung und Wassersucht.

Sydenham.

1550. Ry. Elaterii gr. vj
 Extr. gentian. rubr.
 Mass. pil. sapon. $\overline{\text{āā}}$ gr. ix.
 M. pil. xij. Consp. cass. lign.

S. *Früh, oder früh und Abends 1—4 Stück.*

Anwend. Gegen hartnäckige Verstopfung.

Duncan.

Elaterina; Elaterine.

Form u. Gabe. In Pulver, Lösung, zu gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{12}$.

1551. Ry. Elaterinae gr. j.
 Solve in
 Alcohol. vini $\mathfrak{z}$ j.
 Adde
 Acidi nitrici gutt. iv.
 M. S. 36—40 Tropfen mit $\mathfrak{z}\beta$ Zimmtwasser zu
 nehmen.

Anwend. Abführungsmittel.

Duncan.

Elemi. Oelbaumharz.

(*Resina Elemi; Elemiharz. Von Amyris
elemifera L.*)

Form u. Gabe. Aeusserlich zu Salben, Pflastern
u. s. w.

1552. *Ry.* Elemi
Terebinth. venet.
Sevi vervecin. dep.
Adip. suill. āā 3j.
Leni igne colliquata cola per linteum.

S. Elemibalsam. Zum Verbande.

Balsamum Arcaei s. Unguentum elemi
compositum.

Anwend. Bei schlaffen, unreinen Geschwüren und Wunden.

1553. *Ry.* Unguent. elemi 3j
Pulv. cort. peruvian. 3j.
M. f. Unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. Zur Verhütung fauliger Zersetzungen in tendinösen
Wundflächen.

v. Gräfe.

Enulae radix. Alantwurzel.

(*Radix inulae s. helenii*; *Helenenkraut*, *Brust-*
alandwurzel. Von *Inula Helenium* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lattwerge, zu
℥β — 3℥; Aufguss oder Abkochung, zu 3℥ — j auf 3vj,
esslöffelweise; eben so weiniger Aufguss. — Extrakt in
Pillen, Lösung, zu ℥β — 3℥, einigemal. — Tinktur, 3℥
— j, einigemal. — Aeusserlich zu Waschpulver, abgekocht
zu Waschwasser und Salbe.

1554. Rx. Pulv. rad. enulae 3jβ

Elaeosacch. anisi 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. *Früh und Abends ein Stück zu nehmen.*

Anwend. Bei chronischem katarrhalischen Husten.

1555. Rx. Pulv. rad. enulae 3j

„ „ irid. flor. 3℥

„ „ zingiber. 3ij

Mellis despum. q. s. ut f. electuarium.

S. *Früh und Abends einen halben Esslöffel.*

Anwend. Bei Husten und Engbrüstigkeit.

J. A. Schmidt.

1556. Rx. Extr. enulae

„ liquirit.

Flor. sulphur. āā 3j

Gummi ammoniac. 3ij

Pulv. rad. irid. flor. 3ß.

M. f. pil. gr. ij. Consp. liquirit.

S. *Acht bis zehn Stück auf einmal zu nehmen.*

Anwend. Gegen asthmatische Beschwerden von erschlafte
Lungen und Ansammlungen von Feuchtigkeiten.

Quarin.

1557. Rx. Extr. enulae 3j

Pulv. herb. digital. purp.

„ rad. ipecacuanhae āā 3ß

Opil pur. gr. v—vj.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Aller 3 Stunden ein Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen veralteten oder krampfhaften Husten.

Heim.

1558. Rx. Rad. enulae 3j.

Inf. (coque) aquae ferv. q. s. ad col. 3iv.

Adde

Kali carbon. aceto scillit. satur. 3ß

Syrup. flor. aurant. 3ß.

M. S. *Zweistündlich einen Esslöffel voll.*

Anwend. Gegen asthenische Wassersucht nach Scharlach.

Wendt.

1559. Rx. Rad. enulae 3j

„ senegae 3j.

Infunde aquae ferv. 3ij.

Colatur adde

Ammon. muriat. dep. 3j

Tartari stibiat. gr. j
Syrup. diacod. $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Löffelweise zu nehmen.

Anwend. In Brustkrankheiten, wenn entweder das Fieber schleimig - nervöser Art ist, oder sich durch Schleimaussäuerungen aus den Lungen entscheiden will.

F. Jahn.

1560. *Ry.* Rad. enulae $\mathfrak{z}j$.
Coque per $\frac{1}{4}$ hor. in aquae $\mathfrak{z}ij$.
Infunde
Summitat. hyssopi
Fol. hederæ terr. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}ij$.
Filtrā et. edulcora cum
Melle l. syrup. sacchar. $\mathfrak{z}ij$.

S. Tassen - oder Glasweise.

Anwend. Gegen Verschleimung der Bronchien.

Charité zu Paris.

1561. *Ry.* Rad. enulae $\mathfrak{z}ij$.
Coque c. aquae font. $\mathfrak{z}viii$ ad colat. $\mathfrak{z}vj$
Ammon. muriat. dep. $\mathfrak{z}j$
Tartari stibiat. gr. j
Syrup. opiat. $\mathfrak{z}\beta$.

M. S. Aller 2—3 Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen veraltete katarrhalische Husten, Verschleimungen der Bronchien.

Radius.

1562. *Ry.* Extr. enulae $\mathfrak{z}ij$
Vini stibiat. $\mathfrak{z}j$
Syrup. flor. aurant. $\mathfrak{z}\beta$.

S. S. Umgeschüttelt, aller 3 Stunden 20 — 30 Tropfen.

Anwend. Gegen chronischen Katarrh, Asthma.

Nach Jahn. Radius.

1563. Rx. Rad. enulae ℥iij .

Coque c. aquae font. q. s. ad mucilaginem.

Cola et adde

Adip. suill. q. s. ut f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Unguentum enulae Hufelandi.

Anwend. Gegen Krätze, besonders bei kleinen Kindern. Man reibt früh und Abends die ausgeschlagenen Stellen ein, und wäscht sie nach mehreren Stunden mit Seifenwasser ab.

Brückmann. Hufeland.

Equisetum arvense L. Schafthalm, Scheuerkraut.

Form u. Gabe. Abkochung, ℥ij — ij auf ℥j Wasser.

1564. Rx. Equiseti arvens. ℥ij — ij .

Coque c. aquae fluvial. ℥j per $\frac{1}{4}$ hor.

Col. S. Aller 2 Stunden eine halbe bis ganze Tasse.

Anwend. Als harntreibendes Mittel. Kindern 1—2 Esslöffel auf einmal.

Nach Linné's und Fr. Hoffmann's Vorgange.

Lenhossek.

1565. Rx. Equiseti arvens. ℥j .

Coque cum s. q. aquae font. per $\frac{1}{2}$ hor. ad colat. ℥j .

S. Aller 2 Stunden eine halbe Tasse.

Anwend. Gegen Wassersucht.

v. Hildenbrand.

1566. *Ry.* Equiseti arvens.
 Rad. gramin. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.
 Conc. coque cum s. q. aquae font. per $\frac{1}{2}$ hor.
 Colat. $\mathcal{Q}$ adde
 Kali nitrici $\overline{3\beta}$
 Tartari depur. $\overline{3\beta}$.

M. S. Alle Stunden eine halbe Tasse.

Anwend. Gegen Wassersucht.

v. Hildenbrand.

Euphorbium. Euphorbiumharz.

(Von Euphorbia officinarum L.)

Form u. Gabe. Nur noch äusserlich als Streu-
 (selten als Schnupf-) Pulver, zu Pflaster, Salbe. Tink-
 tur zum Bestreichen oder Charpie damit getränkt.

1567. *Ry.* Euphorbii $\overline{3ij}$
 Emplastr. melilot. $\overline{3j}$.
M. f. emplastrum.

S. Pflaster.

Anwend. Statt des Kantharidenpflasters, wenn man Ursache
 hat dieses zu meiden.

Sundelin.

1568. *Ry.* Emplastr. picis comp. Ph. Lond. $\overline{3iv}$
 Euphorbii $\overline{3\beta}$
 Terebinth. q. s.

Mal. S. Pflaster.

Anwend. Gegen Krankheiten des Hüftgelenkes.

Cheselden.

1569. *Rx.* Euphorbii ℥iij
 Colophonii ℥iij
 Mastiches ℥j .

F. pulvis.

S. Auf ein Kissen von Werg gestreut und dann mit Cognac befeuchtet um's Knie zu legen.

Anwend. Gegen weisse Geschwulst.

Vogt.

1570. *Rx.* Cerae albae ℥j
 Terebinth. ℥β .
 Leni igne colliquefactis adde sensim
 Pulv. euphorbii ℥j—℥β .
M. f. emplastrum.

S. Auf Leder zu streichen.

Emplastrum ischiadicum.

Anwend. Bei rheumatischen, gichtischen Beschwerden, kalten Geschwülsten, Hüftweh u. s. w. Stark reizend.

Disp. Lipp.

1571. *Rx.* Gummi ammoniac.
 Olibani
 Mastiches
 Tutiae āā ℥j
 Euphorbii
 Pyrethri
 Salis culinaris āā ℥ij
 Picis navalis ℥iij
 Terebinthinae ℥j
 Cerae flavae ℥iij .

Liquatis lente pice, terebinthina et cera, adde sensim reliqua pulverata et mixta.

F. l. a. emplastrum.

S. Auf Leder zu streichen.

Emplastrum capucnorum.

Anwend. Zertheilend und hautröthend. Die Capuciner be-

dienten sich desselben ehemals gegen Kniegeschwülste, welche bei ihnen sehr häufig vorkamen.

Pharm. Wirt.

1572. Rx. Tinct. capsici
„ euphorbii āā 3ij.

M. S. Zum Bepinseln.

Anwend. Bei nicht entzündlichen Geschwülsten der Tonsillen.

Fricke.

F.

Farfarae folia. Huflattigblätter.

(Von Tussilago Farfara L.)

Form u. Gabe. In Pulver, zu $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iiij}$, einmal; in Aufguss, $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iiij}$ auf $\mathfrak{viij}$ Wasser.

1573. Ry. Pulv. fol. farfar.
Sacchari candi $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{3}\beta$.
M. f. pulvis.

S. Täglich 3—4mal 1 Theelöffel.

Anwend. Gegen Brust- und andere Katarrhe mit grosser Ge-
reiztheit der Schleimhäute und schwierigem Auswurfe.

Radix.

1574. Ry. Fol. farfar. $\mathfrak{3}\beta$
Rad. althaeae $\mathfrak{3}\beta$
Semin. foenicul.
„ anisi $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{3ij}$.

C. M. S. Brustthee.

Anwend. Gegen Brustkatarrhe mit schwerer Expektion
und andere chronische Brustübel.

Choulant.

Fel Tauri. Ochsen-galle.

(*Fel Bovis, Bilis taurina; Rindsgalle. Von Bos Taurus L.*)

Form u. Gabe. Frisch, zu $\text{℥ij} - \text{iv}$ mit Wein oder aromat. Wasser. Eingedickt in Pillen, Bissen, Lösung, zu $\text{℥ß} - \text{℥β}$, einigemal täglich. Aeusserlich zu Augewässern, Linimenten, Salben, Einspritzungen und Klystieren.

Man vermeide Säuren, Alkalien, Metallsalze, innerlich in flüssiger Form Aloë.

1575. *Ry.* Fellis tauri rec. ℥β
Aquae cinnamom. ℥ijß .

M. S. In getheilten Gaben den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. Bei Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden.

Reil.

1576. *Ry.* Natri muriat. ℥β
Fellis tauri rec. ℥ij .

Solve in

Aquae cerasor. ℥iv .

Adde

Spirit. sulphurico-aeth. ℥ij .

M. D. S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Vogt.

1577. *Ry.* Fellis tauri inspiss. ℥β
Extr. centaur. min.
„ gentian. rubr. āā ℥ij

Pulv. rad. rhei q. s.
ut f. pil. gr. ij. Consp. pulv. cinnam.

D. S. Sieben bis zehn Stück auf einmal.

Anwend. Gegen hypochondrische Beschwerden.

Weickard.

1578. *Ry.* Fellis tauri inspiss.

Asae foetidae

Rad. rhei pulv. āā 3ß.

M. f. pil. gr. ij. Consp. pulv. cinnam.

D. S. Morgens und Abends 10 Stück.

Anwend. Bei durch Säure in den ersten Wegen bedingten Krampfbeschwerden.

Richter.

1579. *Ry.* Fellis tauri inspiss.

Sapon. med. pulv.

Extr. taraxac.

Rad. rhei pulv. āā 3ij.

M. f. pil. gr. ij. Consp. pulv. cass. cinnam.

D. S. Täglich 3mal 8 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen habituelle Leibesverstopfung in Folge von Torpor der Gedärme.

Hufeland.

1580. *Ry.* Fellis tauri inspiss.

Gumm. asae foetid. āā 3ij

Extr. chelidon. 3ß

Pulv. rad. rhei 3j.

M. f. c. pulv. flaved. cort. aurant. q. s. pil. gr. ij.

D. S. Täglich einigemal 10 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei chronischen Leberaffektionen mit hämorrhoidalischen und hypochondrischen Beschwerden.

Schwartze.

1581. *Ry.* Fellis tauri inspiss. $\overline{3}\beta$
 Boracis
 Sacchari albi $\overline{aa}$ $\overline{3}j$
 Aquae rosar.
 „ foenicul. $\overline{aa}$ $\overline{3}ij$
 Extr. aloes aquos. gr. xij.

S. S. Augewasser, mit Läppchen überzulegen und einzutröpfeln.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Reil.

1582. *Ry.* Fellis tauri inspiss. $\overline{3}\beta$
 Olei amygdal. dulc. $\overline{3}ii\beta$.

M. S. Drei bis fünf Tropfen ins Ohr zu giessen.

Anwend. Gegen verhärtetes Ohrenschmalz.

Tode.

1583. *Ry.* Fellis tauri rec. $\overline{3}ij$
 Ammon. carb. pyro-oleos. $\overline{3}\beta$
 Aquae destill $\overline{3}ij$
 Spirit. vini saponat. $\overline{3}iiij$.

M. S. Täglich 3mal warm in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei Atrophie der Kinder.

Vogt.

1584. *Ry.* Fellis tauri $\overline{3}iv$
 Sal. culinar. $\overline{3}vj$
 Olei nuc. jugland. $\overline{3}j$.
 Digere leni calore. F. liniment.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Stockungen, besonders gegen skrofulöse Drüsengeschwülste.

St. Marie.

1585. Rx. Ungt. althaeae ʒij—iv
 Fellis tauri rec.
 Sapon. med. āā ʒjβ
 Petrolei
 Ammon. carbon. pyro-oleos. āā
 Camphorae ʒβ.
 M. f. unguent.

S. *Aller 3 Stunden 1 Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben.*

Anwend. Gegen Mesenterialschwellungen.

Hufeland.

1586. Rx. Fellis tauri inspiss.
 Extr. digital. āā ʒβ
 Aquae laurocerasi ʒij.
 M. f. liniment.

S. *Zum Einreiben.*

Anwend. Gegen skrofulöse Anschwellungen.

1587. Rx. Fellis tauri cochlear. ij
 Tuber. solani coct. et excortic. pugill. j
 Aceti ʒβ.
 Coque leni calore ad consist. cataplasma.

S. *Umschlag.*

Anwend. Auf harte schmerzlose Geschwülste, die man zu zertheilen strebt.

Cadet de Gassicourt.

1588. Rx. Fellis tauri inspiss. ʒj
 Mellis despum. ʒiij.
 M. f. unguent.

S. *Mittelst eines Haarpinsels täglich einigemal in das Auge zu bringen.*

Anwend. Gegen Verdunkelung der Hornhaut.

Bichter.

1589. *Rx.* Olei nuc. jugland. ℥ij
 Fellis tauri inspiss. ℥β
 Ammon. carbon. pyro-oleos. gr. ij.
 M. f. unguent.

S. Täglich 2mal mittelst eines Pinsels in das Auge zu bringen.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Conradi.

1590. *Rx.* Fellis tauri inspiss.
 Elaeosacch. absinth. $\overline{\text{aa}}$ ℥ij
 Mellis commun. ℥vj .
 Solve in
 Infus. herb. absinth. (℥β) ℥v .

D. S. Umgeschüttelt, zu zwei Klystieren.

Anwend. Für Kinder bei Askariden.

Sundelin.

Ferrum. Eisen.

(*M a r s.*)

A. Ferrum aceticum oxydatum; essig-
 saures Eisen.

(*Acetas Ferri.*)

Form u. Gabe. Nur äusserlich, $\text{℥β}—j$ auf ℥viij Wasser.

Im Allgemeinen *vermeide* man bei allen Eisenpräparaten Verbindungen mit Säuren, sauren Salzen, reinen, kohlensauren u. s. w. Alkalien, salpeters. Silber und Quecksilberoxydul, essigs. Blei, Borax, Seifen, Schwefelleber, Gerbestoff.

1591. Ry. Ferri acetic. $\bar{3}\beta$
Aquae fontan. $\bar{3}\text{viiij}$.

S. S. Zu Fomentationen.

Anwend. Skirröse Stellen und deren Umgebungen damit zu fomentiren.

Carmichael. Rust.

Ferri acetic Tinctura aetherea s. Liquor anodynus martialis Klaprothii
s. Naphtha Aceti martiata; ätherische
essigsauere Eisentinktur.

Form u. Gabe. Auf Zucker, in Mischung, zu
10—60 Tropfen, einigemal täglich.

1592. Ry. Tinct. ferri acet. aether. $\bar{3}\text{ij}$
„ vanillae
„ cort. aurant. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{j}$.

M. S. Aller 2 Stunden 20 Tropfen in einem Ess-
löffel Wasser zu nehmen.

Anwend. Gegen Chlorose.

Pitschaft.

1593. Ry. Bals. copaivae $\bar{3}\text{ij}$
Gumm. mimos. pulv. $\bar{3}\text{j}$
Vini rhenani $\bar{3}\text{ij}$.
F. emuls., cui adde
Tinct. ferri acet. aether. $\bar{3}\text{j}$
Syrup. bals. peruv. $\bar{3}\text{j}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, täglich 3mal einen Ess-
löffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Nachtripper.

Lockstädt.

1594. *Ry.* Tinct. ferri acet. aether. $\overline{3}$ ij
 Aquae cinnam. simpl. $\overline{3}$ ij
 Syrup. cort. aurant. $\overline{3}\beta$.

M. D. S. Täglich 4mal 1 Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Dyspepsie; in der Rekonvalescens, namentlich nach Wechselfiebern, gegen Atonie der drüsigen Unterleibseingeweide, besonders der Leber, gegen Helminthiasis u. s. w.

L. W. Sachs.

B. Ferrum ammoniatum; eisenhaltiger Salmiak.

(*Flores Salis ammoniaci martiales, Ammonium muriaticum ferratum s. ferruginosum s. martiatum, Ferrum ammoniacale, Ens Martis; Eisensalmiak.*)

Form u. Gabe. Nicht gern in Pulver, Bissen, Pillen, weil er Feuchtigkeit anzieht, eher in Lattwergen, Auflösungen, Mixturen, gr. ij—x, einigemal täglich.

Die zu vermeidenden Verbindungen siehe unter Ferrum aceticum.

1595. *Ry.* Ferri ammoniat. $\overline{3}\beta$
 Pulv. ligni quassiae
 Sacchari albi $\overline{aa}$ $\overline{3}j$.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal. D. ad chartam cerat.

S. Täglich 4mal 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. In der Bleichsucht.

Richter.

1596. *Ry.* Cort. peruvian. $\mathfrak{z}$ j
 Ferri ammoniat. gr. ij
 Flor. cassiae gr. j.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. Täglich 3—4mal 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. In hartnäckigen Wechselfiebern, wenn Verstopfung des Unterleibes zum Grunde liegt.

Bagliv. Selle.

1597. *Ry.* Ferri ammoniati gr. iv
 Pulv. calami aromat.
 Sacchari albi $\overline{\text{aa}}$ gr. vj.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. Täglich 3—4mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen chronische Leiden der Schleimhäute (Verschleimung) der Respirationsorgane und des obern Theils des Darmkanals.

Fricke.

1598. *Ry.* Ferri ammoniati
 Pulv. cort. chinae fuscae
 „ radicis gentianae $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ j
 Oxymell. scillit.
 Syrup. cort. aurant. $\overline{\text{aa}}$ q. s.
 ut f. electuar.

S. Aller 2 Stunden 1 — 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. In der Wassersucht, wenn ein verstecktes Wechsel-
 fieber zum Grunde liegt.

Quarin.

1599. *Ry.* Extr. taraxaci
 „ graminis $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ ij
 Gummi ammon. vitell. ovi soluti
 Ferri ammoniati $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ j

Mellis optimi q. s.
ut f. electuarium.

S. Täglich 2—3mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Electuarium tonicum resolvens Brerae.

Anwend. Bei Leberkrankheiten mit Schwäche und Verstopfung.

Brera.

1600. *Ry.* Ferri ammoniati
Galbani āā 3j
Asae foetidae 3ij
Castor. sibir. ʒj.
M. f. c. tinct. valerian. pil. gr. iij. Consp. lycop.
D. in vitro.

Morgens und Abends 2—3 Stück.

Anwend. Mit diesen Pillen leitete Berends den anhaltenden Gebrauch des Eisens gegen atonische Nervenkrankheiten ein.

Berends.

1601. *Ry.* Ferri ammoniati
Extr. aloes aquos. āā ʒj
„ chelidonii ʒiv
Galbani
Sapon. medic. āā 3ij.
M. f. pil. gr. ij. Consp. cass. lign. D. ad vitrum.
S. Früh und Abends 6 Stück.

Pilulae tonico-resolventes Clari.

Anwend. Bei Physkonie der Unterleibsorgane mit Erweichung, besonders der Milz, nach langwierigen Wechselfiebern u. s. w.

Clarus.

1602. *Ry.* Ferri ammoniati
Aluminis
Pulv. aromat.
Extr. cort. peruv. frig. par. āā 3β

Olei cinnam. aether. gutt. xij.
M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnam. D. in vitro.

S. *Früh und Abends 5—10 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen asthenische Metrorrhagie.

Formey.

1603. R_y. Ferri ammoniat. subtiliss. pulv. ʒijß
Cort. cinnamom. subtiliss. pulv. ʒß
Sacchari albi ad consist. tabul. cocti q. s.
F. rotulae xl.

S. *Zweimal des Tages 2—3 Stück zu nehmen.*

Tode's eröffnende Zeltchen.

Anwend. Gegen mangelnde monatliche Reinigung aus Atonie.

Tode.

C. Ferrum arsenicicum; arsensaures Eisenoxyd.

Form u. Gabe. *Aeusserlich als Aetzmittel.*

1604. R_y. Ferri arsenicici ʒß
„ phosphorici ʒij
Unguent. cetacei ʒvj.
M. f. unguent.

S. *Messerrückendick auf Charpie zu streichen.*

Anwend. Als Zerstörungsmittel statt des Cosme'schen. Wird
von Werneck dem Arsenikoxyde vorgezogen.

Carmichael.

D. Ferrum bromatum; Bromeisen.

(*Ferrum hydrobromicum oxydatum s. perbromatum; bromwasserstoffsäures Eisenoxyd, Eisenbromid.*)

Form u. Gabe. In Lösung und Pillen, zu gr. j —iv, 2—3mal täglich.

1605. Rx. Ferri bromat. pulv. gr. x—xij
Conserv. rosar. gr. xvij—xx
Gummi arab. gr. x—xij.
M. exacte. F. pil. xx. Consp. cinnamom.

S. *Früh und Abends 2 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Skrofeln, Unterdrückung des Monatsflusses, Hypertrophie des Herzens.

Magendie.

1606. Rx. Ferri bromati 3j
Extr. liquirit. q. s.
F. pil. lx. Consp. cinnamom.

S. *Früh und Abends 1—2 Pillen.*

Anwend. Gegen Skrofeln, Hypertrophieen, besonders des Fruchthälters.

Werneck.

E. Ferrum chloratum; salzsaures
Eisenoxydul.

(*Ferrum oxydulatum muriaticum, Chloretum
Ferri; grünes salzsaures Eisen.*)

Form u. Gabe. In Lösung, Pillen, Lattwerge,
Tinktur, gr. ij—vj, 3—4mal täglich.

1607. R_y. Ferri chlorati ʒj.

Solve in

Aquae destillatae ʒj.

D. S. Täglich 4mal 30—60 Tropfen.

Anwend. Gegen Skrofeln. In Verbindung mit Baryt.

Hufeland.

1608. R_y. Ferri chlorati ʒij—iij

Aquae cort. aurant. ʒj.

M. S. Täglich 2—3mal 20 Tropfen.

Anwend. Gegen Bleichsucht, Muskelschwache, Mangel an
Blutenergie von übermässigen Ausleerungen, erschlaffenden
Krankheiten.

Radius.

1609. R_y. Ferri chlorati

Aloes

Extr. marrubii āā ʒβ

Asae foetidae ʒjβ.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 3mal 4—5 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Leukorrhöe und Hysterie mit Neigung zu
Verstopfung.

Whytt.

1610. *Ry.* Liqu. ferri chlorati $\bar{3}\beta$ — $j\beta$.
D. in quadruplo.

S. Einen Theil dem Bade beizumischen.

Anwend. Gegen Bleichsucht, Schleimflüsse, Muskel- und Blutschwäche.

F. Ferrum perchloratum; salzsaures
Eisenoxyd.

(*Ferrum oxydatum muriaticum, Ferrum oxydatum muriaticum rubrum, Sesquichloretum Ferri; rothes salzsaures Eisen.*)

Form u. Gabe. In Lösung, Pillen, Lattwerge, Tinktur, gr. ij — v , 2—3mal täglich.

1611. *Ry.* Rad. althaeae $\bar{3}ij$.
Coque ex aquae font. q. s. ad colat. $\bar{3}ij$. Adde
Gummi mimos. pulv. $\bar{3}ij$
Ferri muriat. rubri $\ni\beta$
Syrup. althaeae $\bar{3}j$.

M. S. Wohlungeschüttelt, alle Stunden 2 Theelöffel.

Anwend. Gegen Magenerweichung.

v. Pommer.

Ferri perchlorati Liquor; salzsaure
Eisenoxylösung.

(*Liquamen Martis, Oleum Martis per deli-*
quium; Eisenöl.)

Form u. Gabe. Selten innerlich in Mischung zu
5—15 Tropfen, 2—3mal. Zu Bädern, $\mathfrak{z}\text{j}$ — $\mathfrak{ii}\text{j}$.

1612. R_y. Liqu. ferri muriat. oxydat. $\mathfrak{z}\text{ß}$ — $\mathfrak{z}\text{j}\text{ß}$.
D. in quadruplo.

S. Ein Theil zum Bade.

Anwend. Gegen Bleichsucht, Schleimflüsse, Muskel- und
Gefässschwäche.

Spiritus sulphurico-aethereus ferrugi-
nosus; eisenhaltiger Schwefelätherweingeist.

(*Liquor anodynus martiatus, Tinctura ner-*
vina Bestucheffii, Tinct. aurea nervino-tonica
Lamottii; Bestucheff'sche Nerventinktur, La-
motte's Goldtropfen.)

Form u. Gabe. Auf Zucker, in Wein oder aromat.
Wasser, in Mixturen, zu 10—30 Tropfen, einigemal
täglich.

1613. R_y. Spirit. sulphurico-aether. mart. $\mathfrak{z}\text{ij}$
Extr. hyoscyami $\mathfrak{z}\text{j}$

S. S. Stündlich 15 Tropfen.

Anwend. Gegen hysterischen Kopfschmerz.

F. Jahn.

1614. *Ry.* Infus. rad. valerian. min. (̄β) ̄v
 Aquae cinnamom. simpl. ̄j
 Spirit. sulphur.-aether. mart. ̄ij
 Syrup. cort. aurant. ̄j.

M. D. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden 2 Ess-
 löffel.

Anwend. Bei nervöser Asthenie.

Sobernheim.

G. Ferrum cyanogenatum; Blaustoffeisen.

(*Ferrum oxydulatum hydrocyanicum, Coeruleum parisiense; blausaures Eisenoxydul, Pariserblau.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, gr. β — vj,
 mehrmals täglich. Aeusserlich zu Salben.

1615. *Ry.* Ferri cyanogenati gr. iij—xxxvj
 Sacchari albi ̄ij.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Täglich 2—3mal ein Pulver.

Anwend. Gegen Epilepsie.

Kirkhoff.

Gegen Wechselfieber und Ruhren.

Zollikofer.

1616. *Ry.* Ferri cyanogenati gr. j—vj—xij
 Sacchari albi ̄j.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Aller 2 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen Epilepsie.

v. Hildenbrand.

1617. *Ry.* Gummi ammon.
 Rad. rhei
 Extr. taraxaci āā 3j
 Ferri cyanogenati gr. xvij—xxxvj.
 M. f. pil. xc Consp. can. alba.

S. Täglich 2mal 4—6 Stück.

Anwend. Gegen Verstimmungen des Gangliennervensystems, daher rührenden Gastricismus u. s. w. Nach

L. W. Sachs.

1618. *Ry.* Ferri cyanogenati 3j
 Axung. porc. 3j.
 M. f. unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen unreine, dyskrasische und kankröse Geschwüre.

Hesselbach.

H. Ferrum iodatum; Jodeisen.

(*Ferrum hydrïodicum; hydrïonsaures Eisenoxydul und Eisenoxyd.*)

Form u. Gabe. In Lösung, Pillen, Plätzchen, gr. ij—v, 3—4mal täglich. Syrup, 3ij—iv auf 3vj, esslöffelweise, einigemal. — Einspritzung, 3ij auf 3xij; Bad 3j—ij.

1619. *Ry.* Ferri iodati gr. ij—iij
 Aquae destill. 3ix
 Tinct. aurant. 3j.
 M. f. haustus.

S. Täglich 3mal ein solches Tränkchen.

Anwend. Gegen Skrofeln, Bleichsucht, veraltete Lustseuche, selbst Krebs.

Thomson.

1620. R_y. Ferri iodati ʒj
Tinct. cort. aurant.
„ gentianae āā ʒjß.

S. S. *Aller 3 Stunden 20—25 Tropfen.*

Anwend. Gegen torpide Skrofeln.

Fuchs.

1621. R_v. Ferri iodati ʒj
Natri bromati ʒß
Extr. liquirit. q. s.
F. pil. gr. ij. Consp. cinnamon. D. in vitro.

Früh und Abends 1—3 Stück.

Anwend. Bei Skrofeln und Hypertrophie der Gebärmutter
sehr wirksam bei längerem Gebrauch.

Werneck.

1622. R_v. Ferri iodati ʒj
Extr. liquirit. q. s.
F. pil. lx. Cousp. cinnamom. D. in vitro.

S. *Früh und Abends 2—4 Pillen.*

Anwend. Ein sehr sicheres Mittel gegen Bleichsucht, welche
mit Skrofeln verbunden oder aus ihnen entsprungen ist.

Werneck.

1623. R_y. Syrup. ferri iodati ʒij—iv
Aquaе font. ʒvj
Syrup. sacch. ʒß.

M. S. *Viermal täglich einen Esstöffel voll.*

Anwend. Gegen Skrofeln und Lupus.

Fricke.

1624. *Ry.* Syrupi ferri iodati ℥j—j℥
 Aquae destill. simpl. ℥j—j℥
 Syrup. sacchari ℥℥ .

M. S. Früh und Abends 1 Kaffeelöffel.

Anwend. Gegen frühzeitige Bleichsucht, bleichsüchtigen Magenschmerz, abdominelle Neuralgien der Kinder.

Für Erwachsene ℥ij — iv auf ℥vj , 2—3 mal einen Esslöffel.

Krieg.

1625. *Ry.* Vini bordegalensi ℥j
 Ferri iodati ℥℥ .

S. S. Früh und Abends einen Esslöffel voll.

Vinum ferri hydriodati Pierquini.

1626. *Ry.* Ferri iodati ℥ij
 Alcohol.
 Aquae destillatae $\text{aa } \text{℥ij}$.

M. S. Morgens und Abends einen Esslöffel voll zu nehmen.

Tinctura ferri hydriodati Pierquini.

1627. *Ry.* Ferri iodati gr. cxv
 Chocolatae ℥j .
M. f. pasta.

S. Anfangs eine halbe, später eine ganze Tasse voll.

Chocolata cum ferro hydriodato Pierquini.

1628. *Ry.* Ferri iodati $\bar{3}\beta$ —j
 Croci pulv. $\bar{3}ij$ —iv
 Sacchari $\bar{3}iv$ —viii.
M. f. trochisci No. cxx—ccxl.

S. 8—10 Stück täglich, später alle 3—4 Tage um ein Stück zu steigen.

Trochisci cum hydriodate ferri Pierquini.

1629. *Ry.* Ferri iodati $\bar{3}\beta$
 Aquae destill. $\bar{8}ij$.

S. S. Zu Klystieren, Waschungen, Einspritzungen, mehrmals täglich.

Aqua hydriodata Pierquini.

Sämmtliche Formen, 1625—1629, gegen Amenorrhöe und weissen Fluss.

1630. *Ry.* Ferri iodati $\bar{3}\beta$ —j—ij
 Aquae destillatae $\bar{3}viii$.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Tripper.

Ricord.

1631. *Ry.* Ferri iodati $\bar{3}\beta$ —ij
 Aquae destillat. $\bar{8}j$.

S. S. In ein ganzes Bad zu giessen.

Balneum hydriodatum Pierquini.

578 FERRI NITRICI LIQU. FERRUM OXYD. FUSCUM

1632. Rx. Ferri iodati $\mathfrak{z}\text{ij}$
Adipis suilli $\mathfrak{z}\text{j}$.
M. f. unguentum.

S. Eine Haselnuss gross früh und Abends auf den oberen inneren Theil des Schenkels einzureiben.

Unguentum hydriodatis ferri Pierquini.

I. Ferri nitrici Liquor; salpetersaure Eisenflüssigkeit.

(Liquor Ferri sesquinitratis, Nitratis Ferri Liquor; flüssiges salpetersaures Eisenoxyd.)

Form u. Gabe. In Wasser oder Haferschleim zu 10—20—30 Tropfen, 2mal täglich. Klystier bei Kindern 8—10 Tropfen auf $\mathfrak{z}\text{vj}$ — viij Wasser.

Anwend. Gegen Durchfälle nervöser oder lymphatischer Personen.

W. Kerr u. Kopp.

Gegen Leukorrhöe und Mutterblutfluss aus Erschlaffung und Schwäche.

Adams.

K. Ferrum oxydatum fuscum; braunes Eisenoxyd.

(Ferrum carbonicum s. subcarbonicum, Carbonas Ferri, Crocus Martis aperitivus, Hydras ferricus; kohlensaures Eisen, eröffnender, brauner Eisensafran.)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, Pillen, Lattwerge, gr. ij — x — xx , 3—4mal täglich. Aeusserlich als Streupulver oder mit wenig Wasser zum Brei gemacht.

1633. *Ry.* Ferri oxydati fusci $\mathfrak{z}\beta$
 Sacchari albi $\mathfrak{z}j$
 Elaeosacch. anisi $\mathfrak{z}ij$.
 M. f. pulvis.

S. Täglich 2—4mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Atonie des ganzen Körpers, besonders der Verdauungswerkzeuge, übermässige Schleimerzeugung, nach vorheriger Entfernung der Unreinigkeiten; auch gegen Nervenschmerzen.

Radius.

1634. *Ry.* Ferri oxydati fusci $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}ij$ —iv.
 Dent. tal. dos. xij.

S. Aller 4—6 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen Veitstanz. Nach vorher gereichten Abführungen.

Elliotson.

1635. *Ry.* Ferri oxydati fusci $\mathfrak{z}ijj$
 Morphii acetici gr. j
 Drag. aromat. $\mathfrak{z}j$.
 M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

S. Aller 3 Stunden ein Pulver.

Anwend. Gegen Gesichtsschmerz. Dabei äusserlich eine Salbe aus Veratrin. gr. ij auf unguent. pomad. $\mathfrak{z}\beta$.

Fuchs.

1636. *Ry.* Ferri carbonici gr. iv
 Elaeosacch. macidis $\mathfrak{z}\beta$
 M. f. pulv. Dent. tal. dos xij.

S. Täglich 2—4mal ein Pulver.

Anwend. Bei Gebärmutterkrebs.

Rust.

1637. *Ry.* Ferri carbonici ʒij
 Pulv. cort. cinnamom.
 „ rad rhei āā ʒß.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Täglich 3—4mal 1 Pulver.

Anwend. In der Bleichsucht.

Bang.

1638. *Ry.* Ferri carbonici ʒij—ʒj
 Elaeosacch. calami ʒß.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj ad chartam ceratam.

S. Täglich 2—3mal 1 Pulver.

Anwend. In Prosopalgie.

1639. *Ry.* Ferri oxydati fusci ʒj
 Cort. cascarill.
 Extr. ligni campech. sicc. ʒjß.
 M. f. c. extr. gent. rubr. q. s. pil. gr. ij. Consp.
 lycop.

S. Täglich 3mal 5—10 Stück.

Anwend. Gegen atonische Leukorrhoe.

Sundelin.

1640. *Ry.* Ferri oxydati fusci ʒj
 Extr. liquirit. q. s.
 F. pil. cxxl. Consp. liquirit.

S. Täglich 2—4 Stück, und täglich um 2 Stück zu steigen, bis auf 10 Stück.

Anwend. Gegen Magenschmerzen bei Frauenzimmern, besonders wenn das Uebel mit Chlorose, Leukorrhoe, Störung der Regeln u. s. w. verbunden ist.

Foy.

1641. Ry. Ferri oxydati fusci
 Extr. calendulae
 „ conii macul. āā 3ij
 Pulv. herb. et flor. calendul. 3jβ.
 F. pil. gr. ij. Consp. cass. cinnam.

D. S. Täglich 3mal 5—8 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Krebsgeschwüre.

Rust.

1642. Ry. Ferri oxydat. fusci 3β
 Theriac. 3j.

M. S. Mit einer Tasse Fleischbrühe verdünnt zu geben.

Anwend. Gegen Starrkrampf. — Gesichtsschmerz.

Elliotson.

1643. Ry. Ferri sulphurici crystall.
 Natri bicarbon. āā gr. j
 Sacchari albi gr. vj.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Täglich 2—3mal ein Pulver in einem Glase Zuckerwasser zu nehmen.

Anwend. Gegen Chlorose, Magenkrampf, Menstruationsfehler.

Buchner.

1644. a. Ry. Ferri sulphuric. cryst. gr. ij—iij
 Sacchari albi 3j.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij. S. No. I.

1644. b. Ry. Natri bicarbonic. gr. ij—iij
 Sacchari albi 3β.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. No. II. Von jedem Päckchen ein Pulver auf

zulösen, dann zusammenzugießen und sogleich zu trinken.

Anwend. Gegen Atonie, Bleichsucht u. s. w., wo man das kohlensaure Eisen in Anwendung bringen will.

Meurer. Münchmaier.

1645. *Ry.* Ferri sulphurici cryst.
Kali bicarbon. āā 3β.
Mixtis adde
Pulv. gumm. mimos. 3j
„ rad. althaeae 3β.
F. pil. xcvj. Consp. lycop.

Blaud's von Guibourt verbesserte Eisenpillen.

Anwend. Gegen Nervenschwäche, Leukorrhöe und andere Schleimflüsse.

1646. *Ry.* Ferri sulphur. ad modum Bonsd. parat. gr. D.
Solve in
Aquae saccharat. (l. Syrup. sacchari 3j ad 3xxij) q. s. Cui admisce
Natri carbon. in aquae sacchari sol. gr. DLxxxviiij.
Praecipitatum aqua sacchari ablue et tum decantha. Admisce
Mellis albi part. cccvj
et in balneo Mariae ad consist. pilul. evapora.

Vallet's Eisenoxydulpillen.

Ferrum oxydatum hydricum ad modum Bertholdi paratum; Eisenoxydhydrat.

Form u. Gabe. Schütteltrank, 3j—iiij.

1647. *Ry.* Ferri oxydati hydrat. q. s. (3vj—xij.)
S. In warmem Wasser suspendirt 1—2 Drachmen zu geben.
Anwend. Nach Berthold und Bunsen gegen Vergiftung mit arseniger Säure.

Auf einen Theil muthmasslich genommenen Arseniks nimmt man 10—20 des ferri oxyd. hydrici. Vorher Brechmittel zu geben ist nur dann nöthig, wenn grosse Mengen Speisen im Magen sind.

Liquor Ferri oxydati hydrato-acetici;
essigsaures Eisen mit Eisenoxydhydrat.

(*Ferrum hydrico-aceticum in aqua Ph. Bor.*
ed. vj.)

Gegen Vergiftung mit arsenigsauren Salzen — welche häufig in der Technik Anwendung finden — als Antidotum empfohlen. In vielen Fällen ist es noch sicherer, als das blosse Eisenoxydhydrat.

L. Ferrum oxydatum rubrum; rothes
Eisenoxyd.

(*Crocus Martis adstringens, Colcothar Vitrioli,*
Oxydum ferricum; zusammenziehender, rother
Eisensafran.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge, zu gr. $\text{ij} - \text{xv}$, 2—4 mal täglich. Aeusserlich als Schnupf- und Streupulver.

1648. Ry. Ferri oxydat. rubr. ʒij
Alumicis
Boli armenae āā ʒj
Sanguinis draconis ʒß .
M. f. pulv. subtiliss.

S. Schnupfpulver.

Anwend. Gegen Nasenbluten.

Griffith.

1649. *Ry.* Ferri oxydati rubri 3j
Myrrhae 3ij.

M. f. pulvis.

D. S. Streupulver.

Anwend. Gegen laxe, nässende und faulige Geschwüre.

*M. Ferrum oxydulatum nigrum;
Eisenmohr.*

*(Aethiops martialis, Oxydum ferrosus; schwar-
zes Eisenoxydul.)*

*Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, Trochisken, zu gr. iij—x, einigemal täglich.*

1650. *Ry.* Ferri oxydulati nigri

Rad. columbo āā 3j

Cort. aurantior. 3β

„ cinnamom. 3j.

M. f. pulv. Div. in ix part. aequal.

S. Täglich 3 Pulver zu nehmen.

Pulveres tonico-martiales Brerae.

Anwend. Bei Chlorose mit allgemeiner Schwäche und Ame-
norrhöe.

Brera.

1651. *Ry.* Ferri oxydulati nigri 3β

Rad. ari 3j

Calcariae subcarbon. 3ij

Cinnamom. 3ij

Sacchari albi 3ij.

M. f. pulvis.

*S. Täglich 2—3mal gr. v—x—xx—xxx zu neh-
men.*

Anwend. Gegen Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen, Leu-
korrhöe, Rhachitis.

Swediaur.

1652. *Rx.* Ferri oxydulati nigri
 Cassiae cinnamom. āā 3ij
 Sacchari albi 3jß
 Mucil. gumm. tragacanth. q. s.
 ut f. trochisci LX, pulv. Cassiae cinnam. con-
 spargendi, torrendi.

D. S. Täglich 3—4mal 2 Stück zu geben.

Anwend. Gegen Skrofeln und Rhachitis.

Phöbus.

N. Ferrum phosphoricum oxydulatum;
 phosphorsaures Eisenoxydul.

(*Phosphas Ferri; Eisenphosphat.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
 werge, zu gr. ij—x, einigemal täglich. Als Salbe, 3j—ij
 auf 3j.

1653. *Rx.* Ferri phosphor. gr. viij
 Pulv. flaved. cort. aurant. 3ij
 Sacchari albi 3iv.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.
S. Täglich 2mal 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. In der Harnruhr

Venables.

1654. *Rx.* Ferri phosphor. 3j
 Unguent. cetacei 3j.
 M. f. unguent.
S. Zum Verbande.

Anwend. Bei trägen, schlaffen Geschwüren.

O. Ferrum pomatum; äpfelsaures Eisen.

(*Extractum Ferri pomati s. malici; äpfelsaures Eisenextrakt.*)

Bemerk. Ganz gleich in seiner Wirkung ist das Extractum und die Tinctura martis cydoniata.

Form u. Gabe. In Pillen, Lattwerge, Lösung, gr. v—xx, einigemal täglich. Tinktur, 30—60 Tropfen, einigemal.

1655. Rx. Ferri pomati $\bar{3}$ ij
Aquae foenicul. $\bar{3}$ j.

S. S. Täglich 3mal 10 — 15 Tropfen in Zuckerwasser.

Anwend. Als Stärkungsmittel bei Kindern.

Berends.

1656. Rx. Ferri pomati $\bar{3}\beta$
Extr. trifol. fibr. $\bar{3}$ j
Aquae menthae crisp. $\bar{3}$ vj.

M. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen.

v. Hildenbrand.

1657. Rx. Tinctura ferri pomati
„ aromat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$.

M. S. Täglich 3mal 10 — 20 — 30 Tropfen.

Anwend. Gegen Schwäche, Verschleimung des Darmkanals mit Magensäure, Blähungen, Diarrhōe, Schleimflüsse aus den Geschlechtstheilen, Würmer, für Kinder.

Tourtual.

P. Ferrum pulveratum; präparirte
Eisenfeile.

(*Limatura Ferri praeparata, Ferrum alcoholi-
satum, Alcohol Martis; gepulvertes Eisen.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, Plätzchen, Wein, gr. j—x, einigemal täglich.

1658. Ry. Ferri pulverati ̄j
Lapid. cancrorum ̄β
Sacchari albi ̄ij .
M. f. pulvis.

S. Täglich 3—4mal einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Rhachitis.

Goelis.

1659. Ry. Ferri pulverati gr. iij—xij
Conch. ppt.
Elaeosacch. flaved. citri $\text{āā } \text{̄β}$
M. f. pulv. Div. in part. vj aequal.

S. Zweimal täglich ein Pulver.

Anwend. Gegen Rhachitis.

Berends.

1660. Ry. Ferri alcoholisati gr. j
Magnes. carbon. gr. v
Cinnamomi gr. ij

Sacchari albi ℥j.

M. f. pulvis.

S. Früh und Abends die Hälfte.

Pulvis antatrophicus Hufelandi.

Anwend. Gegen Atrophie der Kinder und bei Rhachitis.

Hufeland.

1661. *Ry.* Ferri alcoholisati

Conch. ppt.

Cort. cinnamom. āā gr. viij

Sacchari albi ℥iv.

M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.

S. Früh und Abends ein Pulver.

Anwend. Gegen Schwäche und Verschleimung des Darmkanals mit Magensäure, Durchfall u. s. w., schleimige Ausflüsse aus den Geschlechtstheilen der Kinder.

Tourtual.

1662. *Ry.* Ferri pulverati

Rhei opt. āā gr. v

Sacchari albi gr. x.

M. f. pulvis.

S. Eins und dann mehrere während eines Tages.

Anwend. Gegen Skrofelsucht und Rhachitis.

Baglivi. Strack. Jahn. L. W. Sachs.

1663. *Ry.* Limatur. ferri

Cremor. tartari āā ʒβ

Rad. scillae ʒj.

M. f. pulvis.

D. S. Aller 2 Stunden eine reichliche Messerspitze voll mit Wachholderthee zu nehmen.

Anwend. In der Wassersucht.

Kausch. Fr. Jahn.

1664. *Ry.* Ferri pulverati $\overline{3}ij$
 Sulphur. depur.
 Myrrhae
 Aloes $\overline{aa}$ $\overline{3}j$
 Fellis tauri q. s.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

S. Früh und Abends 12 Stück.

Anwend. Gegen unterdrückte Menstruation aus Schwäche und Stockung in den Gefäßen.

Bicker.

1665. *Ry.* Ferri pulverati $\overline{3}\beta$
 Rad. columbo $\overline{3}iv$
 „ rhei
 Cort. cinnamom. $\overline{aa}$ $\overline{3}ij$.
 E. c. extract. lign. quass. pil. gr. iij. Consp. cinnamom.

S. Täglich 3mal 3—4 Stück.

Anwend. Nach erschöpfenden Fiebern und anderen schwächenden Krankheiten.

Fr. Jahn.

1666. *Ry.* Ferri pulverati $\overline{3}\beta$
 Extr. millefol.
 „ chamomill. $\overline{aa}$ $\overline{3}ij$
 „ nucis vomic. (spirit.) gr. xvj.
 M. f. c. paux. gummi tragac. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

S. Aller 3 Stunden 3—5 Stück.

Anwend. Gegen hartnäckige, zumal viertägige Wechselfieber.

Jahn.

1667. *Ry.* Ferri pulverati $\mathfrak{z}\text{j}$
 Extr. absinthii q. s.
 F. pil. gr. iij. Consp. lycop.
S. Morgens und Abends 6—8 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen Chlorose, Dyspepsie, Hysterie u. s. w.
Sydenham.

1668. *Ry.* Ferri pulverati $\mathfrak{3}\beta$ — $\text{j}\beta$
 Sapon. venet.
 Extr. chamomill. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{3}\text{ij}$.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.
S. Früh und Abends 10 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen chronische Gelbsucht.
Theden.

1669. *Ry.* Limaturae ferri $\mathfrak{3}\beta$
 Pulv. rad. gentian. rubr. v. columbo $\mathfrak{z}\text{iv}$
 „ „ rhei
 „ cort. cinnamom. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Extr. absinthii q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. pulv. cinnamom.
S. Täglich anfangs 3—4mal 3—4 Stück, später
 mehr zu nehmen.
Anwend. Gegen Leukorrhoe.
Weickard.

1670. *Ry.* Ferri pulverati $\mathfrak{3}\beta$
 Aluminis crudi
 Terebinth. venet.
 Extr. quass. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{3}\text{j}$
 „ cort. chinae $\mathfrak{3}\text{ij}$.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. pulv. liquirit.
S. Aller 3 Stunden 12 Stück zu nehmen.
Anwend. Gegen Nachtripper.
 Zugleich spirituöse und aromatische Einreibungen in das
 Rückgrath.
Quarin.

1671. *Ry.* Ferri pulverati
 Chocolat. pulv. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Croci pulv. $\overline{3ij}$
 Mucilag. gummi tragacanth. q. s.
 F. rotulae gr. xij.

S. Täglich 3—4 Stück.

Anwend. Gegen Chlorose, Leukorrhöe, Kachexie.

Bally.

1672. *Ry.* Summit. absinth. $\overline{3ij}$
 Cort. cinnamom.
 Ferri pulv. $\overline{aa}$ $\overline{3ij}$.
 Inf. in
 Vini opt. $\overline{8ij}$.
 Post horas xxiv cola.

S. Täglich 1—2 Unzen zu nehmen.

Vinum amarum chalybeatum Brerae.

Anwend. Bei Bleichsucht, Pellagra, Magenschwäche, Schwäche des Darmkanals, in der Wiederherstellung von Wurmkrankheiten u. s. w. Der Gebrauch muss einige Zeit lang fortgesetzt werden.

Brera.

1673. *Ry.* Pulv. cort. aurantior.
 „ rad. gentian. $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$
 „ cort. cinnamom. $\overline{3ij}$
 Ferri pulverati $\overline{3ij}$.

Infunde cum

Vini albi rhenani gener. $\overline{8ij}$.

Stent in digest. per nycthemerum.

Cola. D. S. Täglich 2—3 mal ein kleines Weinglas voll zu trinken.

Anwend. In der Reconvalescenz nach erschöpfenden Krankheiten.

Richter.

1674. *Ry.* Limaturae ferri $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Rad. dictamni $\mathfrak{z}\text{j}$
 Vini albi gener. $\mathfrak{q}\text{j}$.
 Post aliquot dies digestionis decantha.

S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel.

Anwend. Bei veralteter Leukorrhöe und nach nervösen Fiebern.

Störk.

Q. Ferrum sulphuricum; schwefelsaures Eisen.

(*Sulphas Ferri, Vitriolum Martis (factitium), Sal Martis, Ferrum vitriolatum; Eisenvitriol, grüner Vitriol.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge, Zuckerwerkformen, Lösung, gr. $\text{j} - \text{v}$, einigemal täglich. — Aeusserlich zu Augenwässern, gr. $\text{j} - \text{iv}$ auf $\mathfrak{z}\beta$; Einspritzungen, gr. $\text{ij} - \text{v}$ auf $\mathfrak{z}\text{j}$; Waschungen, Umschlägen, $\mathfrak{z}\text{j}$ auf $\mathfrak{z}\text{xij}$; Bädern, $\mathfrak{z}\text{j} - \text{iv}$; Streupulver.

1675. *Ry.* Ferri sulphur. cryst. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Kali carbon. e tartari gr. xxv.

Solve in

Aquae menthae crisp. $\mathfrak{z}\text{viiij}$.

Adde

Myrrhae pulv. $\mathfrak{z}$

antea cum

Sacchari albi $\mathfrak{z}\beta$ contrit.

M. D. S. Umgeschüttelt, 4 mal täglich einen bis zwei Esslöffel voll.

Mixtura antihectica Griffithii.

Anwend. Gegen ulceröse, sehr grosse Erweichung zeigende

tuberkulöse und pituitöse Lungenschwindsucht, und besonders gegen die kolliquativen Schweisse im letzten Stadium derselben.

Popken u. A.

1676. *Ry.* Ferri sulphur. crystall. pulv. ʒj
Galbani dep.

Extr. myrrhae pulv. āā ʒiij

Extr. cort. aurantior. q. s.

ut f. pil. ccx. Consp. cinnamom.

S. Aller 3 Stunden 6—10 Stück zu nehmen.

Rothe-Backen Pillen.

Anwend. Gegen Chlorose und Amenorrhöe.

Kämpf.

1677. *Ry.* Ferri sulphur. ʒjβ

Pulv. rad. rhei ʒj

Extr. taraxaci ʒij

Pulv. rad. liquirit. q. s.

F. pil. gr. ij. Consp. pulv. cinnamom.

S. Aller 3 Stunden 5 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Aufreibung der Milz; dabei äusserlich Unguent. oxygenatum einzuteiben.

Fuchs.

1678. *Ry.* Ferri sulphur. cryst.

Kino āā ʒjβ

Terebinth latic.

Extr. gentian. āā ʒiij

Pulv. rad. liquirit. q. s.

ut f. pil. cclxx. Consp. cinnamom.

S. Täglich 4mal 10 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Nachtripper.

Walch.

1679. *Ry.* Myrrhae elect. 3jß
 Ferri sulphur. 3iij
 Pulv. rad. tormentill. 3ij
 Mucilag. gummi mimos. q. s.
 F. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

S. Täglich 4mal 7 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Nachtripper.

Wendt.

1680. *Ry.* Pulv. ferri sulphur. cryst.
 „ catechu
 „ terebinth. coct āā 3j
 Extr. gentian. q. s.
 ut f. Pil. cxx. Consp. cinnamom.

S. Täglich 3mal 3—6 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Nachtripper.

Henschel.

1681. *Ry.* Ferri sulphur.
 Resinae jalapae āā gr. iv
 Semin. santonici gr. vij
 Olei absinthii gutt. j
 Extr. absinthii q. s. ut f. pil. x.

S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen Würmer.

1682. *Ry.* Ferri sulphur. 3ß
 Semin. cinae 3jß
 Sacchari albi 3j
 Mucilag. gummi arab. q. s.
 ut f. l. a. trochisci xxxij.

D. S. Täglich 6—8 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Würmer.

1683. *Ry.* Ferri sulphur. cryst. gr. ij—iij
 Elaeosacch. cinnamom. ʒß.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij ad chartam ce-
 ratam.

S. Täglich 3mal ein Pulver.

Anwend. Gegen passive Metrorrhagieen.

1684. *Ry.* Ferri sulphur. gr. iv
 Zingiberis gr. x—xv.
 M. f. pulvis.

D. S. Täglich 2mal ein solches Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei Amenorrhöe, Bleichsucht, Leukorrhöe und Ver-
 dauungsbeschwerden von Atonie.

1685. *Ry.* Ferri sulphur. ʒß—jß
 Aquae salviae ʒiv
 Pulv. gummi mimos. ʒß

S. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei anhaltendem Nasenbluten.

1686. *Ry.* Ferri sulphur.
 Aluminis dep. āā gr. xij—Lx.
 Solve in
 Decoct. hordei ʒv
 Mellis rosati ʒj.

M. D. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei atonischem Tripper.

Vogt.

1687. *Ry.* Cort. peruvian. opt.
 Rad. ratanhiaie āā ʒß

Coque cum aquae s. q.

In colat. ℥viij solve

Ferri sulphur. ℥jß.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei Erschlaffung der Mutterscheide und des Mastdarms.

1688. *Ry.* Ferri sulphur. ℥vj—xij

Flor. lavandul. ℥j—ij

Dent. tal. dos. iv.

S. Zum Bad.

Anwend. Jedes Pulver wird in 3 Mousselinbeutel vertheilt, mit denen sich der Kranke im Bade reibt, am meisten an den schwachen Stellen, bis das Eisensalz zergangen ist.

Kraus.

R. Ferrum tartaricum; weinsteinsaures Eisen.

(*Tartarus chalybeatus s. ferruginosus s. martiatus, Tartras Ferri et Potassae, Ferrum kalico-tartaricum, Mars solubilis; Eisenweinstein.*)

Form u. Gabe. In Auflösung, nicht gern in Pulver oder Pillen, da sie leicht zerfließen, gr. v—x, einigemal täglich.

1689. *Ry.* Magnes. carbon. ℥ij
Tartari depur. ℥ß

Ferri tartarici $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. f. pulvis.

S. Täglich 2—3mal einen Theelöffel voll während des Aufbrausens zu verbrauchen.

Pulvis aërophorus martialis Hufelandi.

Anwend. Gegen Schwächezustände, Menostasie u. s. w.

Hufeland.

1690. *Ry.* Ferri tartarici $\mathfrak{z}\beta$

Kali nitrici $\mathfrak{z}\beta$

Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$.

M. f. pulvis.

D. S. Aller 4 Stunden eine Messerspitze voll zu nehmen.

Vogler.

1691. *Ry.* Ferri tartarisati puri $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$

Aquae selteranae $\mathfrak{z}\text{ij}$.

S. Weingläserweise.

Sundelin.

1692. *Ry.* Ferri tartarici $\mathfrak{z}\beta$

Extr. gentian. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Solve in

Aquae cinnamon.

„ fontan. āā $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Adde

Spirit. sulphurico-aether. $\mathfrak{z}\text{iv}$

Syrup. cinnamom. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Aller 2 Stunden einen kleinen Esslöffel voll zu nehmen.

1693. *Ry.* Canellae albae $\mathfrak{z}\beta$.

Cont. macera saepius agit. per triduum in
Vini gener. rhenani albi $\mathfrak{g}\text{j}$. Colat. adde
Ferri kalico-tart. $\mathfrak{z}\beta$.

Oder:

1694. *Ry.* Cort. Winterani $\mathfrak{z}\beta$.

Cont. mac. per trid. in
Vini gener. rhen. albi $\mathfrak{g}\text{j}$. Colat. adde
Ferri kalico-tartarici $\mathfrak{z}\beta$
Chinii citrici (sulphur.) $\mathfrak{z}\beta$.

Oder:

1695. *Ry.* Rad. galangae

Semin. cardamom. min. $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$.

Cont. mac. per triduum in

Vini albi rhenani $\mathfrak{g}\text{j}$. Colat. adde

Tinct. ferri tart. $\mathfrak{z}\text{j}$

Salicini (Chinii tart.) $\mathfrak{z}\text{j}$.

Vina martiata composita Herbergeri.

Man soll nach ihm gerbestoffhaltige Dinge (China, Zimmt) nicht mit dem Eisen verbinden.

Globuli Ferri tartarici; Eisenweinstein-
kugeln.

(*Globuli Tartari ferruginosi, chalybeati, martiales; Stahlkugeln.*)

Form u. Gabe. Zum Bad, $\mathfrak{z}\text{j}$ —iv. Klystier, $\mathfrak{z}\text{j}$ —ij.

1696. *Ry.* Globulor. tart. mart. pulv. $\mathfrak{z}\beta$ —ij.

Det. in quadruplo.

S. Eine Portion mit einem Quart Wasser bis zur Auflösung gekocht dem Bade beizumischen.

Anwend. Bei Nervenschwäche, Chlorose u. s. w.

1697. *Ry.* Globulor. tart. mart. $\bar{3}j\beta$
 Cort. salic. pentandr. $\bar{3}iv$.
 Coque ex aquae font. $\mathfrak{L}vj$ ad remanent. $\mathfrak{L}iv$.
 Colat. refriger. adde
 Spirit. lavendul. $\bar{3}iij$.

M. S. Zu 3 Bädern.

Anwend. Als Stärkungsmittel nach erschöpfenden Krankheiten.

1698. *Ry.* Globul. tart. mart. $\bar{3}j\beta$
 Summitat. millefol. $\bar{3}\beta$.
 Infunde aquae ferv. q. s. ad colat. $\bar{3}v$.
 Mellis rosati $\bar{3}j$.

M. S. Zu 2 kleinen halben Klystieren.

Anwend. Gegen Erschlaffung und Vorfall des Mastdarms.

Sundelin.

Filicis maris radix. Farnkrautwurzel,

(*Von Aspidium Filix mas Swtz.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, selten in Aufguss und Abkochung, zu $\bar{3}\beta$ — ij , einigemal täglich. Aether. Extrakt, zu $\mathfrak{J}$ — $\bar{3}\beta$, 1—2mal, in Pillen, Mixturen, Trochisken, Gallerte.

1699. *Ry.* Pulv. rad. filicis mar. rec. $\bar{3}iij$
 „ „ valerian. $\bar{3}j$
 Mellis despum. $\bar{3}ij$.

M. f. electuar.

S. Aller 3 Stunden 1 kleinen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Schubarth.

1700. *Ry.* Pulv. rad. filicis mar. rec. par. $\text{℥ij} - \text{iv}$
 Aquae melissae ℥ij
 Syrup. gumm. mimos. (althaeae) ℥j .

M. S. Abends auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen den kurzgegliederten Bandwurm.

Am andern Morgen lässt man Olei ricini ℥j ß nach-
 nehmen.

Boudet.

1701. *Ry.* Pulv. rad. filicis mar.
 „ „ valerian. sylv.
 „ „ rhei chin. āā ℥j
 Mellis despum. q. s.
 F. electuarium.

S. Aller 2 Stunden 1 Kaffeelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Würmer.

v. Hildenbrand.

1702. a. *Ry.* Pulv. rad. filicis mar. rec. $\text{℥ij} - \text{iiij}$.

D. S. Mit $\text{℥iv} - \text{vj}$ Farrnkrautwurzelthee nüch-
 tern zu nehmen.

Anwend. Gegen den Bandwurm.

Man lässt den Abend zuvor eine schleimig-fette Suppe
 und ein ähnliches Klystier nehmen. Am andern Morgen
 das Pulver und nach 2 Stunden folgende Purganz:

1702. b. *Ry.* Gummi guttae gr. v
 Calomel.
 Resin. scammon. āā gr. xij.
 M. f. c. confection. hyacinth. Bolus. D.

Nusser.

1703. a. Ry. Pulv. rad. filicis mar. rec. ℥iv .

Div. in quatuor part. aequal. D.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Man giebt in zwei auf einander folgenden Tagen des Morgens nüchtern und des Abends zwei Stunden nach einer mässigen Mahlzeit ein Pulver, und am dritten Tage früh folgendes Purgirpulver:

1703. b. Ry. Gummi guttae gr. xij

Kali subcarbonici ℥β

Sapon. Starkeyani gr. ij.

M. D.

Drei Stunden nachher lässt man in einer Tasse Fleischbrühe Olei ricini ℥j trinken und wiederholt diess eine Stunde darauf, und wieder nach 2 Stunden, wofern der Wurm nicht abgehen sollte.

Herrenschwand.

1704. Ry. Pulv. rad. filicis mar. rec. ℥iij .

D. S. Früh nüchtern auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Man lässt zwei Stunden nach eingenommenem Pulver Olei ricini ℥β nehmen, und wiederholt diese Gabe Oel alle halbe Stunden, bis ℥iij des Oeles verbraucht sind.

Odier.

1705. a. Ry. Pulv. rad. filicis mar. rec. ℥vj

„ limatur. stanni angl. ℥j

„ sem. cinae ℥β

„ rad. jalapae

Tart. natronat. āā ℥j

Mellis commun. q. s.

ut f. electuarium.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Man lässt den Kranken einige Tage lang eine sparsame Diät führen, dünne Brodsuppen, leichtes Gemüse und Heering essen, drei Tage lang die Lattwerge nehmen, bis er Empfindungen vom Wurm im Darmkanale verspürt. Als- dann giebt man folgende abführende Lattwerge:

1705. b. *Ry.* Pulv. rad. jalapae
Tart. natronati āā ℥ij
Scammon. alepp. ℥j
Gummi guttae gr. x
Mellis commun. q. s.
ut f. electuar.

D. S. Aller 2 Stunden 1 Theelöffel voll.

Geht der Wurm dennoch nicht ab, so giebt man noch einige Löffel voll frischen Ricinusöles dazu.

Matthieu.

1706. *Ry.* Extr. aether. filicis mar. ℥j
Rad. filicis mar. pulv. rec. gr. xij
Conserv. rosar. q. s.
F. pil. xij - xvj. Consp. lycop.

S. In halbstündigen Zwischenräumen Abends vor Schlafengehen zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Der Kranke darf Abends von 5 Uhr an nichts mehr essen und erhält am andern Morgen ein leichtes Abführmittel. Oder man giebt Abends die Hälfte, am andern Morgen die andere Hälfte des Mittels und 2 Stunden nach der letzteren Olei ricini ℥ij.

Peschier.

1707. *Ry.* Extr. aether. filicis mar. ℥ß
Mellis rosati ℥ß.

M. S. Die Hälfte beim Schlafengehen, die andere Hälfte früh nüchtern.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Geht der Wurm 6—8 Stunden nach der letzteren Gabe nicht ab, so gebe man eine leichte Abführung.

Radius.

Formicae. Ameisen.

(Formica rufa L.)

Form u. Gabe. Im geistigen Aufguss, aber selten, innerlich zu 20—60 Tropfen, täglich einigemal. Aeusserlich zu örtlichen Dampfbädern, Bähungen. Spiritus formicarum als Waschung.

Man vermeide Schwefelsäure, Basen, Salze mit schwächeren Säuren und Salze edler Metalle.

1708. **Ry.** Formicar. rufar. q. s.
ut lagena commun. ad medium usque repleatur
Rad. filicis maris
„ bryoniae aa 3ß
Spirit. vini q. s.
ad lagenam replend. Digere per aliqu. dies. Cola
c. express.

S. Früh einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen alte rheumatische und gichtische Beschwerden.

Rink. Wendt.

1709. **Ry.** Spirit. formicar. 3ij
Liqu. cornu cervi succ. 3j
Elix. visceral. Hoffm. 3ß.

M. S. 30—50 Tropfen zu nehmen und einen aromatischen Thee nachzutrinken.

Anwend. Gegen paralytische Beschwerden, Gliederzittern u. s. w.

Fr. X. Hartmann.

1710. R_y. Spirit. formicar.
 „ vini camphor. āā ʒiij
 Tinct. cantharid. ʒij

M. S. *Täglich 2mal erwärmt einzureiben.*

Anwend. Bei atonischen Rheumatismen, Lähmungen u. dergl.

Vogt.

Fucus crispus L. Krauser Tang.

(*Lichen Carageen, Chondrus crispus Lyngb.;*
Carageentang, geperlttes See- oder irlän-
disches Moos.)

Form u. Gabe. In Abkochung, ʒß—jß auf ʒvj—x;
 Schleim, Gallerte.

1711. R_y. Fuci crispi ʒij.
 Coque cum
 Lactis ʒj ad consist. gelatin.
 Tere cum
 Sacchari albi ʒj
 Amygdal. amar. ij.

S. *Täglich zu verbrauchen.*

Anwend. Bei Zehrkrankheiten und bei erethischen Verstimmungen der Respirations- und Digestionsorgane.

Hufeland.

1712. R_y. Fuci crispi elect. et conc. ʒjß.
 Coque cum
 Aquae font. ʒvij ad colat. ʒv.
 Syrup. rubi idaei ʒjß—ij.

M. S. *Den Tag über zu verbrauchen.*

Anwend. Bei absetzenden Krankheiten.

v. Gräfe.

1713. *Ry.* Fuci crispī elect. et conc. $\mathfrak{3}\beta$

Lactis vaccin. rec. $\mathfrak{3}\text{ix}$.

Coque ad remanent. col. $\mathfrak{3}\text{v}$.

Sacchari albiss. $\mathfrak{3}\beta - \text{j}$

Aquae amygdal. amar. conc. $\mathfrak{3}\text{j}$.

M. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Anwend. In gleichen Fällen wie das vorige.

v. Gräfe.

1714. *Ry.* Fuci crispī $\mathfrak{3}\beta$.

Coque cum

Aquae font. q. s. ad col. $\mathfrak{3}\text{vj}$.

Natri phosphoric $\mathfrak{3}\text{j}\beta$

Syrup. opiatī $\mathfrak{3}\text{ij} - \text{ii}\text{j}$.

S. Aller 2 Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Bei Bluthusten, zwischen den Anfällen.

Clarus.

1715. *Ry.* Fuci crispī $\mathfrak{3}\text{ii}\text{j}$.

Coque cum

Aquae commun. $\mathfrak{8}\text{j}$ ad colat. $\mathfrak{8}\beta$.

Per linteum fortiter exprime et solve

Sacchari albi $\mathfrak{3}\text{j}$.

Refrigerando fiant gelatinae $\mathfrak{3}\text{vij}$.

S. Theelöffelweise.

Gelatina fuci crispī.

Anwend. Bei hektischen Krankheiten.

Cod. med. Hamb.

1716. *Ry.* Pastae cacaotinae $\mathfrak{3}\text{iv}$

Fuci crispī subt. pulv. $\mathfrak{3}\text{vj}$.

Tere leni calore per $\frac{1}{2}$ hor. Adde

Sacchari albiss. $\mathfrak{3}\text{iv}$

Farinae albiss. q. s. (℥vj).
F. tab. ℥β, quae siccentur. S.

Carageen- oder weisse Chocolate.

Anwend. Als nährendes Mittel mit Wasser oder Milch gekocht.

Clarus.

Fuligo splendens. Glanzruss.

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu ʒβ—℥β, einigemal täglich. Tinktur, zu 20—40—100 Tropfen. — Aeusserlich Pinselsaft, ℥j auf ℥j; Salbe, Pflaster, ℥j—iv auf ℥β; Abkochung, ℥j—ij auf ℥j.

Nur mit organischen Substanzen zu verbinden.

1717: Rx. Fuliginis splend.
Aethiop. antimon. āā ℥j
Magnes. muriat. ℥β.
M. f. pulvis.

S. Täglich 2—3mal 1 Theelöffel voll zu geben.

Anwend. In der Crusta lactea.

Plenk.

1718. Rx. Gummi galbani
Extr. chelidonii
Fuliginis splend. āā ℥ij.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 2—3mal 5—8 Stück zu nehmen.

Pilulae resolventes cum fuligine.

Anwend. Bei Unterleibsstockungen.

Pharm. paup. Hamb.

1719. Rx. Fuligin. splend. puri q. s.
Coque per aliquot momenta; filtra per chartam griseam.

Leviter ebulliant in balneo arenae, donec extracti consistentiam assumserit. F. inde pil. gr. iv.
Consp. lycop.

S. Täglich 3—4mal 1 Stück.

Anwend. Gegen Blasenkatarrh.

Miquel.

1720. *Ry.* Fuligin. splend. manip. maj. ij,
Coque cum
Aquae font. ℥j per 1/2 hor.
Cola cum expressione.

S. Zum Waschen, täglich 4mal.

Anwend. Bei Hautausschlägen herpetischer, psorischer und syphilitischer Natur.

Blaud.

1721. *Ry.* Fuligin. splend. manip. ij.
Coque cum s. q. aquae per 3/4 hor. ad rem. ℥iij.

Col. S. In Form lauer Bähungen zu gebrauchen.

Anwend. Gegen skorbutische, unreine, schlaffe Geschwüre, eiternde Leistenbeulen.

Textor.

1722. *Ry.* Fuligin. splend. ℥β
Kali carbon. ℥jβ
Ammon. muriat. ℥ij
Aquae sambuci ℥ix.
Digere leni calore. Filtra.

S. Täglich einigemal 30—60 Tropfen zu nehmen.

Tinctura fuliginis Clauderi.

Anwend. Gegen Gicht, gichtische Kachexie und zur Beförderung der Menstruation.

Hufeland.

1723. *Ry.* Gummi ammoniaci
 Asae foetid. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Tinct. fuliginis $\bar{3}j$
 Laudan. liquid. Syd. gutt. xx.
 Diger. vase bene clauso in baln. vapor. per
 mediam horam.

S. Täglich einigemal 20—30—40 Tropfen zu nehmen.

Tinctura fuliginis antihysterica.

Anwend. Bei Hysterie und andern Krämpfen.

Fr. X. Hartmann.

1724. *Ry.* Opii puri $\bar{3}j$
 Caryophyllor. aromat. gr. iv
 Fuligin splend. loti $\bar{3}j$
 Aquae cinnamom. $\bar{3}\beta$
 Alcohol. $\bar{3}ij$.
 Digere leni calore per vj dies. Colet. et resid.
 exprimatur.

S. Zum Einpinseln des Auges.

Anwend. Gegen Hornhautflecke.

Carron du Villards.

1725. *Ry.* Fuligin. splend.
 Axung. porc. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Extr belladonnae $\bar{3}j$.
 M. exacte.

S. Zum Verband.

Unguentum fuliginis Blandii.

Anwend. Bei Krebsgeschwüren. Zuweilen ohne Belladonna.

Bland.

1726. *Ry.* Axung. porci
Fuliginis splend. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{\zeta}$ ij.
Coque leni igne.

S. Zum Verband.

Anwend. Gegen Grind, skrofulöse und andere unreine Geschwüre.

Blaud.

1727. *Ry.* Fuliginis splend. dep. $\bar{\zeta}$ ij
Coque per vj sexages. in aquae $\mathcal{Q}$ j.
Filtrā per chartam.

S. Zum Einspritzen, täglich 2mal.

Anwend. Gegen Blasenkatarrh.

Miquel.

1728. *Ry.* Carbon. tiliae pulv.
Sulphur. dep. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{\zeta}$ j
Fuliginis splend.
Cort. peruvian. flav. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{\zeta}\beta$
Cerati simpl. q. s.

M. f. unguentum.

S. Täglich 1—2mal eine Drachme einzureiben.

Anwend. Gegen Tinea. Vor den Einreibungen ist der Kopf mit Seifenwasser zu waschen.

Form. méd. de Montp.

1729. *Ry.* Picis albae q. v.
Leni igne liquefact. sensim admisce
Fuliginis taedae q. fieri potest.
F. emplastrum.

S. Pflaster.

Emplastrum fuliginosum Bernhardi.

Anwend. Zur Zertheilung weisser Geschwülste.

Hufeland. Bernstein.

Fumariae herba. Erdrauchkraut.

(*Fumaria officinalis* L.; Taubenkropf,
wilde Raute.)

Form u. Gabe. Frisch ausgepresster Saft, zu $\mathfrak{z}$ ij—iv, täglich. Abkochung, $\mathfrak{z}\beta$ —j auf $\mathfrak{z}$ viiij, esslöffelweise. Klystier, $\mathfrak{z}$ j auf $\mathfrak{z}$ viiij. — Extrakt in Pillen, Bissen, Mixturen, zu $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\beta$, mehrmals täglich.

Man vermeide Salzbilder, salzs. Gold, Sublimat, salpeters. Silber und Quecksilber, Bleisalze, schwefels. Salze, Gerbestoff, Schwefel- und Weinstein-Säure, Alkalien.

1730. Rx. Succ. herb. rec. fumar.
 „ „ „ millefol.
 „ „ „ taraxaci $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ j
 „ „ „ chelidon. maj. $\mathfrak{z}$ j.

M. S. Mit Fleischbrühe zum täglichen Verbrauch.

1731. Rx. Herb. fumariae
 „ c. flor. millefol.
 Rad. taraxaci
 „ saponariae
 „ graminis $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}$ ij.
 Conc. M. f. species.

S. Zur Abkochung auf 10 Tage.

1732. Rx. Extr. fumariae $\mathfrak{z}$ ijj
 Tinct. rhei
 Elixir. aperit. Claud.

Liqu. terr. foliat. tartari $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
 Syrup. diacodii $\overline{3vj}$.

M. S. *Aller 2 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.*

Anwend. In der Gelbsucht.

Fr. Jahn.

1733. *Ry.* Extr. fumariae
 Sapon. hispan. $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$
 Tinct. rhei
 Syrup. fumariae $\overline{ua}$ $\overline{3j}$
 Aquae fumariae $\overline{8j}$.

M. S. *Stündlich einen Esslöffel.*

Anwend. Gegen Steinbeschwerden.

Bicker.

G.

Galangae radix. Galgantwurzel.

(*Von Maranta Galanga L., Alpinia Galanga Roxb.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Morsellen, Lattwerge, $\mathfrak{z}\beta$ —j, einigemal täglich; in Aufguss oder Ebullition, $\mathfrak{z}\text{ij}$ —iv auf $\mathfrak{z}\text{vj}$, esslöffelweise. Als Kaumittel bei Zungenlähmung (*Plenk*).

1734. Rx. Rad. galangae $\mathfrak{z}\beta$
Cardamom. min gr. iv
Sacchari albiss. gr. xvj.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. viij. Det. in charta cerata.

S. Viermal täglich ein Pulver mit Wein zu nehmen.

Anwend. Bei Digestionsschwäche.

Schubarth.

1735. Rx. Rad. galangae
,, rhei $\overline{\text{aa}}$ $\mathfrak{z}\text{j}$.
Inf. aquae fervid. q. s. ad colat $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Adde

Ammon. muriat. mart. gr. xij

Elaeosacch. menth. pip. $\bar{3}\beta$.

S. S. Aller 3 Stunden einen mässigen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Verdauungsschwäche und Durchfall der Kinder.

Wendt.

1736. *Ry.* Rad. galangae
Flaved cort. aurantior.
Cassiae cinnamom. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
Vini gall. rubri q. s.

Digere per nycthemerum. Colat. $\mathcal{Q}$ j adde
Spirit. sulphurico-aether. $\bar{3}$ ij.

M. D. S. Täglich 3—4mal 2 Esslöffel.

Vogt.

Tinctura aromatica; Gewürztinktur.

Form u. Gabe. Innerlich zu 20 — 60 Tropfen,
2—3 mal täglich. Aeusserlich selten.

1737. *Ry.* Rad. rhei inc. $\bar{3}$ ij
Ligni quassiae rasi $\bar{3}\beta$
Aquae commun. ferv. $\bar{3}$ v.
Digere per xij horas; colat. refriger. adde
Tinct. aromat. $\bar{3}$ j
Syrup. cort. aurantior. $\bar{3}\beta$.

M. D. S. Umgeschüttelt, 3 stündlich einen Esslöffel.

Anwend. Um die Muskelthätigkeit des Darmkanals zu erhöhen und Stuhlausleerung zu bewirken.

Schwartze.

1738. *Rx.* Tinct. opii croc. gutt. v—x
 „ aromat. ℥iv
 Aquae foeniculi ℥ij.

M. D. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Im Stadium prodromorum der orientalischen Cholera mit Nutzen angewendet von

Polnischen Aerzten.

1739. *Rx.* Tinct. aromat. ℥ß
 Spirit. lavend. l. roris marini ℥iv.

M. S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei Schwäche in den Unterleib, das Rückgrath, die Gelenke u. s. w. einzureiben.

Galbanum. Mutterharz.

(*Gummi s. Resina Galbani. Von Bubon Galbanum L.; Galbansilge, Bubon.*)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Emulsion, Lösung, zu ℥ß—j, mehrmals täglich; Tinktur, zu 30—60 Tropfen, einigemal, und äusserlich. Äusserlich zu Klystieren, Pflastern, Umschlägen.

Man vermeide concentrirte Mineralsäuren, Salzbilder, kaustische Alkalien, mehrere Metallsalze.

1740. *Rx.* Galbani ℥ij.

Solve in

Aceti scillit.

Aquae foenicul. āā ℥ij

Liqu. ammon. acet. ℥ij

Spirit. nitrico-aether. ℥j

Syrup. althaeae ℥ß.

M. S. Täglich 3—4mal einen Esslöffel.

Anwend. Gegen Asthma humidum.

Jahn.

1741. *Ry.* Galbani
Sapon. med. āā 3ij.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycopod.

S. Täglich 2mal 6—10 Stück.

Anwend. Gegen Unterleibskrankheiten, Gelbsucht, Hypochondrie, Hysterie, Infarctus.

1742. *Ry.* Galbani
Myrrhae āā 3jß
Castorei gr. xv
Asae foetidae gr. x
Balsami peruviani q. s.
ut f. pil. gr. ij. Consp. lycopod.

D. S. Abends 8 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei hysterischen, krampfhaften Beschwerden mit Unterleibsstockungen.

Sydenham.

1743. *Ry.* Galbani 3ij
Extr. pimpinellae 3j
Pulv. rad. scillae
„ „ ipecacuanhae
Sulphur. stibiat. aurant. āā 3ß
Pulv. rad. liquirit. q. s. ut f. pil. ccx.
Consp. pulv. irid. flor. D. in vitro.

S. Täglich 3mal 5 Stück zu nehmen.

Heim's auflösende Galbanumpillen.

Anwend. Bei asthmatischen Beschwerden.

Heim.

1744. *Ry.* Galbani 3v
Extr. croci 3j
„ myrrhae 3ij

Extr. hellebori nigri ℥iv.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycopod.

S. Früh und Abends 6 Stück.

Pilulae emmenagogae Schol. clin. Lips.

Anwend. Gegen Menstrualstockungen, Bleichsucht.

Clarus.

1745. *Ry.* Galbani
Saponis veneti
Extr. panchymagogi āā ℥ij.
M. f. pil. gr. ij. Consp. lycopod.

S. Täglich 4mal 3—4 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei mangelhafter Menstruation mit träger Cirkulation im Unterleibe u. s. w.

Fr. Jahn.

1746. *Ry.* Galbani ℥ij
Olei sabinae gutt. iv—viij—xij
Extr. ferri pomati ℥jß
Rad. valerian. pulv. q. s. ut f. pil. cxx.
Consp. rad. irid. flor. D. in vitro.

S. Täglich 3mal 10 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen hartnäckige Chlorosen mit Anomalieen in der Menstruation aus Atonie der Gefäße, besonders des Uterus.

Lockstädt.

1747. *Ry.* Galbani ℥j—ij
Vitell. ovi j.
Terendo sensim misce cum
Syrup. bals. peruvian. ℥j

Aquae foenicul. $\bar{3}$ ijß
 ut f. emuls., cui adde
 Liqu. ammonii anisati $\bar{3}$ ij.

M. D. S. Umgeschüttelt, aller 2 Stunden einen halben Esslöffel voll zu nehmen.

Phöbus.

1748. *Ry.* Tinct. galbani
 „ absinthii
 Spirit. roris marini $\bar{a}a$ $\bar{3}$ ijj.

M. S. 40—60 Tropfen in einem Löffel Wasser.

Anwend. Gegen Hysterie und schleimiges Asthma.

Vogel.

1749. *Ry.* Tinct. galbani $\bar{3}$ j.

S. Eine Kompresse damit zu befeuchten und über das Auge zu legen.

Anwend. Bei passiven skrofulösen Ophthalmieen und Augenschwäche.

Kopp.

Gegen chronischen Augenliderkrampf als Einreibung empfohlen von

Fischer.

1750. *Ry.* Gummi galbani $\bar{3}$ j
 Tinct. castorei q. s.
 ut f. emplastrum.

S. Auf Leder gestrichen, auf den Unterleib zu legen.

Anwend. Bei Kolik und Magenkrampf.

1751. *Ry.* Emplastr. de galbano-crocat. $\bar{3}$ ß.

Leni calore emollitae adde

Opium pulv. c. paux. aquae in pulvem redacti

Ammon. carbon. pyro-oleos. pulv. āā gr. xv

Camphorae trit. ʒβ

Olei cajeputi gutt. xx.

M. f. emplastrum.

D. S. Auf Leder gestrichen auf die Magengegend zu legen.

Anwend. Gegen das Erbrechen bei der Seekrankheit.

1752. *Ry.* Emplastr. de galbano-crocat. ʒβ.

Leni calore emollitae adde

Opii pulv. c. paux. aquae in pulvem redacti

Camphorae tritae āā gr. xxxv.

M. f. emplastrum.

D. S. Auf Leder gestrichen aufzulegen.

Anwend. Bei Frostbeulen zweiten Grades.

Rust.

1753. *Ry.* Galbani depur. ʒβ

Resin. pinae empyreumat. solid. ʒij

Emplastr. lythargyr. simpl. ʒj.

Liquatis et semirefrig. intere

Aeruginis pulv.

Ammon. muriat. dep. pulv. āā ʒβ

F. emplastrum.

S. Auf Leder gestrichen aufzulegen.

Anwend. Gegen Hühneraugen.

Pharm. Sax.

Galeopsisidis grandiflorae herba cum floribus. Kraut des grossblüthigen Hohlzahns.

(Grossblumige, gelbe Hanfnessel, Blankenheimer Thee, Lieber'sche Brustkräuter. Von *Galeopsis grandiflora* Roth.)

Form u. Gabe. Aufguss oder leichte Abkochung, ℥ß—j auf ℥xij, täglich zu verbrauchen. Man kann Milch zusetzen.

1754. Rx. Summitat. galeopsid. grandifl.
Rad. althaeae āā ℥j
,, liquirit. ℥ij.

Conc. M. S. Den vierten Theil mit ℥jß Wasser gekocht täglich zu verbrauchen.

Anwend. Gegen chronische Brustkatarrhe, die selbst schon an Schleinschwindsucht grenzen, Eiterauswurf, in Folge von Erweichung einzelner Lungenknoten.

Radius.

1755. Rx. Herb. galeopsid. grandifl. ℥j.
Coque cum
Aquae font. ℥j per ½ hor., dein cola.
D. S. Innerhalb 24 Stunden zu verbrauchen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Wesener.

Gallae. Galläpfel.

(*Gallae quercinae, turcicae, aleppenses, tinctoriae.* Auf den Blättern der *Quercus infectoria* Olliv. in Folge des Stiches von *Cynips Quercus folii* L.)

Form u. Gabe. In Pulver (unangenehm), zu ʒß —j, mehrmals täglich; häufiger in Aufguss oder Abkochung, ʒß —j auf ʒvj, esslöffelweise. Aeusserlich zu Salben, Streupulvern, Mund- und Gurgelwässern, Einspritzungen und Bähungen.

Man vermeide Metallsalze, namentlich Eisen- und Spissglanzsalze, Alaun u. a. m.

1756. **Rx.** Gallarum grosse pulv. ʒj

Aquae font. ʒiij—iv.

Coque per sexagesim. v.

S. Allmählig esslöffelweise.

Anwend. Gegen Vergiftung mit Brechweinstein, Zinkvitriol, Alkaloiden u. s. w.

Phöbus.

1757. **Rx.** Gallarum grosse pulv. ʒj.

Macera per xij hor. in aquae destill. ʒj.

Decantha. Adde aquae ʒj. Decantha post xij hor. Adde

Alcohol. rectificat. ʒij

Alcoholati citri comp. ʒvj. Filtra.

Anwend. Man verdünnt diese Tinktur mit dem 6—8fachen Antheil Wasser, und braucht sie mit vielem Nutzen gegen Tripper, weissen Fluss im Hôp. de l'Oursine zu Paris.

Gibert.

1758. *Ry.* Gallarum
 Gummi kino $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Alumin. dep. $\bar{3}ij$.
M. f. pulvis.

S. Zum Aufstreuen.

Anwend. Zum Stillen parenchymatöser Blutungen.

Vogt.

1759. *Ry.* Infus. gallarum ($\bar{3}ij$ — $\bar{3}iij$) $\bar{3}vj$.
 Colat. adde
 Spirit. vini rectific. $\bar{3}vj$.

M. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Gegen Erschlaffung des Zäpfchens und bei Quecksilberspeichelfluss.

1760. *Ry.* Gallarum pulv. $\bar{3}\beta$.
 Coque cum
 Aquae font. q. s. ad colat. $\bar{3}viij$
 Solve
 Alumin. $\bar{3}j$
 Zinci sulphur. gr. ij .

D. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen secundäre Blennorrhöen.

Kortum.

1761. *Ry.* Gallarum $\bar{3}vj$.
 Infunde cum
 Vini albi $\bar{3}vj$.
 Stent per xxiv hor. in leni digestionem.

S. Täglich 3—4mal mit Kompressen umzuschlagen.

Anwend. Als Prophylacticum gegen Wundwerden der Brustwarzen vom 6. Schwangerschaftsmonate ab.

Ueber die Kompressen muss man noch eine trockene Kompresse legen, um schwer vertilgbare Flecke in der Leibwäsche zu vermeiden.

Strahl.

1762. *Rx.* Vini rubri ℥j
 Natri muriatici 3j
 Ferri sulphurici 3ij.
 Coque per aliquot minut. Adde
 Cupri oxydati 3j.
 Iterum coque per duo minuta. Ab igne remotis
 adde
 Pulv. gallarum 3ij.

M. S. Zum äussern Gebrauche.

Anwend. Zum Schwarzfärben der Haare.

Man reibt Bart und Haare mit diesem Mittel, trocknet sie nach einigen Minuten mit einem heissen leinenen Tuche ab, und wäscht sich nun mit gewöhnlichem Wasser.

La Forest.

1763. *Rx.* Gallarum 3j.
 Coque cum
 Aquae font. ℥jß ad colat. ℥j.

D. S. Zum Klystier.

Anwend. Gegen hartnäckigen Durchfall, Mastdarmvorfall, Schleim- und blutige Hämorrhoiden.

1764. *Rx.* Pulv. gallarum alcohol. 3j
 Axung. porci 3j.
 M. f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen schlaaffe Hämorrhoidalknoten.

Bell.

1765. *Rx.* Pulv. gallarum 3iij
 Axung. porci 3ß.
 M. f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Hernien kleiner Kinder.

Gentianae cruciatae radix.

Wurzel des Kreuzenzians.

Form u. Gabe. Die Wurzel in Substanz zum Kauen oder $\mathfrak{z}$ j—j β als Brei, nüchtern täglich, neun Tage hindurch. Die Wunde wird mit gekampherten Rorismarinspiritus verbunden und die Venae raninae eröffnet. Als Mittel gegen Hundswuth.

Lalié.**Gentianae rubrae radix.** Rothe Enzianwurzel.(Von *Gentiana lutea* L.)

Form u. Gabe. In Pulver, Bissen, $\mathfrak{z}\beta$ —j pro dosi; in Aufguss oder Abkochung, $\mathfrak{z}\beta$ —ij auf $\mathfrak{z}$ iv, täglich. Extrakt in Pillen, Bissen, Mixturen, zu gr. v—x, 3—4mal. Tinktur, zu $\mathfrak{z}\beta$ —j.

1766. Ry. Rad. gentian. rubrae
 „ aristoloch. rotund.
 Summitat. centaur. min.
 „ chamaedryos
 „ chamaepytis $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. pulvis.

S. Nach Verordnung.

Pulvis antarthriticus Portlandii.

Anwend. Bei Gicht, die von fehlerhafter Verdauung abhängt.

Man lässt 3 Monate lang jeden Morgen einen Theelöffel voll, dann 3 Monate lang Morgens $\frac{3}{4}$, dann $\frac{1}{2}$ Jahr Morgens $\frac{1}{2}$ Theelöffel voll und später noch eine Zeit lang einen Tag um den andern $\frac{1}{2}$ Theelöffel voll nehmen.

Vogt.

1767. *Ry.* Rad. gentian. rubr. ℥ij
 Flaved. cort. aurantior. ℥j
 Aquae commun. bullient. ℥j .
 Digere per horam et colat. refriger. adde
 Tinct. cort. aurantior. ℥ij .

M. S. Täglich 2—3mal eine halbe Tasse voll zu nehmen.

Anwend. Bei Verdauungsbeschwerden und Magenschwäche.

Schubarth.

1768. *Ry.* Rad. gentian. rubr. ℥ij
 Tinct. aurantior. immatur. ℥jβ
 Cardamom. min. ℥β
 Natri carbon. ℥j
 Aquae bullient. ℥vj .
 Infunde per hor. vj , dein cola.

D. S. Täglich 3mal 1 Löffel voll.

Anwend. Bei Verdauungsbeschwerden und asthenischer Gicht.

Niemann.

1769. *Ry.* Extr. gentian. rubr. ℥ij
 Kali carbonici ℥ij
 Aquae menth. crisp. ℥v
 Tinct. cort. aurantior. ℥v
 Sacchari albi ℥j .

M. S. Täglich 3mal 1 Esslöffel.

Anwend. Als Stärkungsmittel, besonders bei geschwächter Verdauung.

Berends.

1770. *Ry.* Extr. gentianae ℥ij
 Vini hispanici ℥iv
 Tinct. cort. aurantior. ℥ij .

S. S. Aller 3 Stunden einen halben Löffel.

Anwend. Als Stärkungsmittel.

Reil.

1771. *Ry.* Extr. gentian. $\overline{5}\beta$
 Pulv. cort. cinnamom.
 „ rad. gentian. $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{5}\text{ij}$.
M. f. pil gr. ij Consp. cinnam.
D. S. Täglich 2mal 10—15 Stück zu nehmen.

Schubarth.

Gentianium. Gentianin.

(*Gentianinum, Gentiana; Enzianstoff.*)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Solution, zu gr. j—iv.

1772. *Ry.* Gentianini gr. v
 Alcohol. (24°) $\overline{5}\text{j}$.
S. S. Zu einer bis 4 Drachmen in einem Trank.
Anwend. Unter gleichen Verhältnissen wie die officinelle Tinktur.

Mugendie.

1773. *Ry.* Gentianini gr. xvj
 Syrup. commun. $\overline{6}\text{j}$.
M. S. Esstöffelweise.
Anwend. Bei Skrofeln, Verdauungsbeschwerden.

Mugendie.

1774. *Ry.* Gentianini $\overline{5}\beta$
 Kali subcarbonici
 Ferri subcarbonici $\overline{a}\overline{a}$ $\overline{5}\text{j}$
 Spirit. vini rectif. (22°) $\overline{6}\text{j}$.
S. S. Morgens und Abends 1 Kaffeelöffel voll zu nehmen.

Tinctura gentianini alcalina.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Pierquin.

Gluten animale. Thierleim.

(*Colla animalis, Gelatina sicca; Tischlerleim, thierische Gallerte.*)

Form u. Gabe. Als Nahrungsmittel in verschiedenen Verhältnissen, als Bouillontafeln, *Gelatina tabulata*, ℥℥—j; äusserlich auf Papier gestrichen gegen Frostschäden; als Bad ℥j—ij.

Man vermeide concentrirte Salpetersäure, Gerbestoff, Chlor, kaustische Alkalien, Alaun, Kochsalz, viele Metallsalze, Weingeist.

1775. R_y. Pedes vitulinos ij.

Coque in

Aquae mens. ij

usque ad dimidium; colatur. adde

Vini malacens. ℥vj

Sacchari albi ℥iv

Succi ex pom. citri ij.

Coletur iterum, cum albumine ovi agitetur, coquatur per aliquot minut. et coletur.

S. Theelöffelweise.

Gelatina animalis.

Anwend. Als angenehmes Nahrungsmittel und auch gegen Wechselfieber.

1776. R_y. Cornu cervi rasp. et abluti ℥iij

Aquae commun. ℥iijß.

Coque ad modicum ignem in vase tecto per vij—viij horas; liquori per pannum laneum colato, adhuc calido, admisce

Sacchari albi ℥j

Vini rhenani

Succi citri rec. expr. et colat. $\overline{\text{aa}}$ $\overline{\text{3ij}}$.
 Repone in loco frigido, ut f. gelatina.

D. S. Zweistündlich 1—2 Theelöffel.

Ph. Slesv.

1777. *Ry.* Glutinis animal. albi $\overline{\text{℥ij}}$.

Solve in

Aquae tepid. $\overline{\text{℥vj}}$

Kali sulphurati $\overline{\text{3iv}}$.

S. S. In's Bad zu giessen.

Balneum gelatinoso-sulphuratum Dupuytreni.

Anwend. Gegen Skrofeln, Gicht.

Colla Piscium; Fischleim.

(*Ichthyocolla; Hausenblase.*)

Form u. Gabe In Lösung, $\overline{\text{3j}}$ auf $\overline{\text{3xij}}$, tassenweise; als Gallerte, $\overline{\text{3j}}$ auf $\overline{\text{3j}}$.

1778. *Ry.* Ichthyocollae $\overline{\text{3j}}$.

Coque cum

Aquae commun. $\overline{\text{3xvj}}$ ad colat. $\overline{\text{3xij}}$
 in qua solve

Sacchari albiss. $\overline{\text{3β}}$.

Adde

Vini rhenani $\overline{\text{3j}}$.

M. D. S. Tassenweise.

Anwend. Gegen Abzehrung, Schwäche, Durchfälle u. s. w.

Phöbus.

1779. *Ry.* Ichthyocollae $\overline{\text{3iij}}$.

Coque cum

Aquae commun. $\overline{\text{3ix}}$ ad colat. $\overline{\text{3iij}}$.

Cui admisce

Succi citri rec. expr. et colat. $\mathfrak{z}\text{ij}$

Elaeosacch. citri $\mathfrak{z}\text{j}$

Repone in loco frigido, ut in gelatinam abeant.

D. S. Zweistündlich 2 Theelöffel.

Gelatina Ichthyocollae.

Anwend. In gleichen Fällen.

Phöbus.

1780. *Ry.* Ichthyocollae q. s.

ut cum

Aquae $\mathfrak{z}\text{vj}$

liquor glutinosus valde spissus prodeat. Solutioni adde

Liquor. myrrhae $\mathfrak{z}\text{j}$.

D. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei Geschwüren der Harnblase.

Lentin.

1781. *Ry.* Gelatinae $\mathfrak{z}\text{j}$

Lactis $\mathfrak{z}\text{iv}$.

Dissolve len. caloris ope.

S. Zum Klystier.

Swediaur.

Graminis radix. Queckenwurzel.

(Gras-, Hundswurzel, Päden. Von *Triticum repens* L.)

Form u. Gabe. Frisch ausgepresster Saft, unzenweise. Abkochung, $\mathfrak{z}\text{j}$ — ij auf $\mathfrak{z}\text{ij}$, tassenweise. Flüssiges (Mellago) oder dickeres Extrakt, in Pillen, Bissen, Lösungen, $\mathfrak{z}\text{ß}$ — j , täglich.

1782. Ry. Rad. graminis $\bar{3}\text{ij}\beta$
 „ althaeae $\bar{3}\beta$
 „ liquiritiae $\bar{3}\text{vj}$.
 Conc. M. f species.

S. Zwei gehäufte Esslöffel voll mit $1\frac{1}{2}$ Quart Wasser eine Viertelstunde lang zu kochen.

Anwend. Zum gewöhnlichen Getränk.

Berends.

1783. Ry. Rad. graminis
 „ althaeae $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{ij}$
 „ taraxaci $\bar{3}\text{j}$
 „ salep $\bar{3}\text{ij}$
 Rasur. cornu cervi $\bar{3}\beta$
 Semin. foenicul. $\bar{3}\text{ij}$.

C. C. M. S. Drei Esslöffel voll mit 3 Nösel Wasser zu kochen und täglich zu trinken.

Anwend. Als schleimig-nährender Trank.

J. C. Stark.

1784. Ry. Radic. graminis $\bar{3}\text{iiij}$
 „ cichorei $\bar{3}\text{j}$.
 Conc. coque cum
 Aquae font q. s.
 Colatur. $\bar{8}\text{ij}\beta$ adde
 Tartar. natronati $\bar{3}\beta$
 Syrup. mannae $\bar{3}\text{ij}$.

M. D. S. Aller 2—3 Stunden eine Tasse voll zu nehmen.

Anwend. In gastrischen Fiebern, Gelbsucht, bei Anschoppungen im Unterleibe u. s. w.

Vogel.

1785. Ry. Decoct. rad. gramin. concentrati $\bar{3}\text{viiij}$
 Succ. citri rec. $\bar{3}\text{ij}$

Cremor. tartar. $\bar{3}j\beta$

Sacchari albi $\bar{3}j$.

M. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen leichte gallige Fieber.

Fr. Jahn.

1786. *Ry.* Mellag. graminis $\bar{3}j\beta$

Kali tartarici $\bar{3}ij-vj$

Aquae fontan. $\bar{3}v$.

S. Zweistündlich einen Esslöffel.

Berends.

Granāti radicis cortex recens.

Granatwurzelrinde.

(Von Punica Granatum L.)

Form u. Gabe. Selten in Pulver, Pillen, Bissen, $\bar{3}\beta-j\beta$, stündlich; am häufigsten in Abkochung, $\bar{3}\beta-j$ auf $\bar{3}ij$. — Spirit. Extrakt in Lösung, Lattwerge, $\bar{3}j-ij$, 2mal täglich.

Man vermeide Mineralsäuren, Alkalien, Alann, Metallsalze, thierischen Leim.

1787. *Ry.* Cort. rad. granati rec. $\bar{3}ij-ij$.

Macera in aquae font. $\mathfrak{H}ij$ per xxiv hor.

Deinde coque ad remanent. $\mathfrak{H}j$.

Filtra et adde

Sacchari albi q. s. ad grat. saporem.

S. Von halber zu halber Stunde den vierten oder dritten Theil zu geben.

Anwend. Gegen den Bandwurm, Taenia Solium, bewährt.

Selten bewirkt es Erbrechen, was jedoch nicht abhalten darf, die ganze Portion zu verbrauchen. Geht der

Wurm nicht ab, so wiederholt man das Mittel am folgenden Tage, oder lässt erst einige Tage lang ein aus $\bar{3}\text{j}\beta$ bereitetes Dekokt früh und Abends gebrauchen. Der Abführmittel bedarf es in der Regel nicht.

Marinus. Gomez. Radius.

1788. *Ry.* Cort. rad. granati $\bar{3}\text{ij}$.

Coque cum

Aquae font. $\bar{3}\text{xxxij}$ ad remanent. $\bar{3}\text{viij}$.

Colat. S. Von halber zu halber Stunde den vierten Theil.

Anwend. Gegen den kurzgegliederten Bandwurm.

Boudet.

1789. *Ry.* Pulv. cort. rad. granati $\bar{3}\beta$

Sacchari albi $\bar{3}\text{j}$.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. viij.

S. Morgens nüchtern alle Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Osann.

1790. *Ry.* Pulv. cort. rad. granati rec. $\bar{3}\text{j}$

„ „ peruvian. rubri $\bar{3}\text{ij}$

Bals. copaiv. q. s.

F. boli gr. xij. Consp. cinnam.

S. Früh und Abends 1 Bissen zu nehmen.

Anwend. Gegen chronische Schleimflüsse.

Richard.

1791. *Ry.* Extr. spirit. cort. rad. granati $\mathfrak{3vj}$
 Aquae flor tiliae
 „ menthae
 Succ. citri $\mathfrak{aa}$ $\mathfrak{3ij}$

S. S. Von Viertel- zu Viertelstunde den vierten Theil zu nehmen.

Oder:

1792. *Ry.* Extr. spirit. cort. rad. granati $\mathfrak{3vj}$
 Succ. citri $\mathfrak{3ij}$
 Aquae flor tiliae $\mathfrak{3iij}$
 Gummi tragacanth. q. s.
 ut f. electuar.

S. Die Hälfte auf einmal zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Deslandes.

Graphites depuratus. Graphit.

(*Plumbago, Ferrum carbonatum; Reissblei.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
 werge, $\mathfrak{3\beta}$ — $\mathfrak{5\beta}$, einigemal täglich. Aeusserlich als Salbe,
 Pflaster.

1793. *Ry.* Graphitae angl. $\mathfrak{3\beta}$
 Mellis despumati $\mathfrak{3ij}$.
 M. exact f. electuar.

S. Früh und Abends einen Kaffeelöffel.

Anwend. Gegen Flechten und hartnäckige Hautkrankheiten überhaupt

Bei Komplikation mit Syphilis setzt Weinhold Quecksilber, mit Gicht Spiessglanz und Guajak, mit Krätze Schwefel zu.

Weinhold.

1794. *Ry.* Graphitae angl. $\mathfrak{z}\beta$
 Roob juniperi q. s.
F. bolus. *D* tal dos. *vj.*
S. Morgens und Abends ein Stück.
Anwend. Gegen Flechten.

Weinhold.

1795. *Ry.* Graphitis
 Sulphur dep.
 Regul. antimon. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$
 Hydrargyr. oxydulat. nigr.
 Extr. pulsatill. nigr.
 Pulv. herb. violae tricol. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}ij$
 Camphorae $\mathfrak{z}j$.
M. f. c. syrup. fumar. electuar.
S. Theelöffelweise in 8 Tagen zu verbrauchen.
 (Die Formel ist nicht zu loben, weil zu schwere
 Pulver darin sind).
Anwend. Gegen sehr complicirte Flechtenkrankheiten.

Weinhold.

1796. *Ry.* Graphitis
 Sacchari albi $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. pulv. Div. in *vj* part. aequal.
S. Aller 2 Stunden ein Pulver.
Anwend. Gegen Lichen leproides.

v. Hildenbrand.

1797. *Ry.* Graphitae $\mathfrak{z}j$
 Semin. foeniculi $\mathfrak{z}ij$.
M. f. pulvis.
S. Täglich 3 — 4 mal einen halben Theelöffel voll
 zu nehmen.
Anwend. Gegen hartnäckige Flechten und Psoriasis.

Choulant.

634 GRAPHITES DEPURATUS. GRATIOLAE HERBA.

1798. *Ry.* Graphitae pulv. 3vj
Axung. porci 3x.
M. exacte.

S. Zum äussern Gebrauch.

1799. *Ry.* Graphitae depur.
Sulphur dep. aa 3ij
Axung porci q. s.
M. f. unguentum.

S. Salbe.

Unguentum graphiticum Brerae.

Anwend. Gegen Ausschläge mit überwiegender Vegetation.

Brera.

1800. *Ry.* Graphitae pulv. 3ij
Emplastr. saponat. 3j.
Malax. f. emplastrum.

S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Gegen Flechten.

Weinhold.

Gratiolae herba. Gnadenkraut.

(*Gottesgnadenkraut, Purgirkraut, Aurin;*
Von Gratiola officinalis L.)

Das Kraut wird fast nur allein, die Wurzel selten angewendet.

Form u. Gabe. In Pulver gr. j—ij, als Abführungsmittel ʒj—ij; in Abkochung, 3j—ij auf ʒiv, eszlöffelweise; weniger Aufguss, 3j—iv mit ʒj Wein

24 St. digerirt, zweistündlich esslöffelweise; Extrakt, gr. $j - x$, in Auflösung, Pillen, Bissen, 2—3 mal täglich. — Aeusserlich abgekocht als Umschlag, als Klystier, $\text{℥}\beta - j$ auf $\text{℥}viij$.

Man vermeide Gerbestoff.

1801. *Ry.* Herbae gratiolae $\text{℥}ij$.

Infunde cum

Vini rhenani boni $\text{℥}j$.

Digere leni calore per diem unum

Col. S. Aller 2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen hypochondrische Beschwerden mit grosser Torpidität und Verschleimung des Unterleibes.

Richter.

1802. *Ry.* Herbae gratiolae $\text{℥}j$.

Digere cum aquae ferv. q. s.

Colat. expr. $\text{℥}ij$ adde

Syrup. simpl. $\text{℥}\beta$.

M. D. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Abführungsmittel.

Remer.

1803. *Ry.* Herbae gratiolae $\text{℥}j$

Lactis ferv. $\text{℥}j$.

Digere ad cineres calidos per horam.

Colat. adde

Mellis $\text{℥}\beta$.

D. S. Aller 1—2 Stunden 2 Esslöffel.

Anwend. Gegen Würmer erwachsener Kinder.

Fr. X. Hartmann.

1804. Ry. Extr. gratiolae 3ij
 „ belladonnae ʒß
 Aquae laurocerasi 3j.

S. S. *Täglich 3mal 30–60 Tropfen.*

Anwend. Gegen Melancholie, die aus trägen, schleimigen, schwarzgalligen Säften im Unterleibe entspringt, auch nicht lange gedauert, noch einen sehr hohen Grad erreicht hat.

Hufeland.

1805. Ry. Extr. gratiolae 3ij—iij
 Aquae cerasorum 3iij
 „ laurocerasi 3ij—iij
 Mellis puri 3vj—viij.

S. S. *Umgeschüttelt, aller 2 Stunden einen Esslöffel voll.*

Anwend. Gegen Wahnsinn und Geisteskrankheiten überhaupt.

Jahn.

1806. Ry. Extr. gratiolae 3jß
 Pulv. rad. calami aromat. q. s.
 F. pil. lx. Consp. lycop.

S. *Täglich 3mal 1–5 Pillen.*

Anwend. Gegen Atonie der Unterleibsorgane, Stockungen in den parenchymatösen Eingeweiden.

Radius.

1807. Ry. Extr. gratiolae 3ß
 Gummi ammoniac. dep. 3jß
 Sapon. stibiat. pulv ʒj—ij.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop. D. in vitro bene clauso.

S. *Täglich 3mal 5–10 Stück zu nehmen.*

Berends.

1808. Ry. Extr. gratiolae
 Pulv. gratiolae $\overline{\text{aa}}$ $\overline{3j}$
 Mucilag. gummi tragacanth. q. s.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

S. *Täglich 2mal 4—6 Stück.*

Anwend. Gegen Melancholie von Unterleibsstockungen her-
 rührend.

1809. Ry. Herb. gratiolae $\overline{3ij}$ —v
 Aquae font. $\overline{3xij}$.
 Decoque ad tertias partes.

D. S. *Zum Klystier.*

Anwend. Gegen Verstopfung und Askariden.

Planché.

Guajáci lignum. Pockenholz.

(*Lignum sanctum; heiliges Holz, Franzosen-
 holz. Von Guajacum officinale L*)

Form u. Gabe. In Abkochung, $\overline{3j}$ — ij auf $\mathcal{Q}j$,
 täglich. — Tinktur, 40—80 Tropfen, 2—3mal täglich.
 Extrakt entbehrlich.

1810. Ry. Ligni guajaci rasi $\overline{3j}$ —ij.
 Coque c. aquae font $\mathcal{Q}iv$ ad colat. $\mathcal{Q}j$.
 Syrup. cort. aurant. $\overline{3ij}$.

M. S. *Tassenweise den Tag über zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen Gicht, Flechten.

Schubarth.

1811. Ry. Rasnr. ligni guajaci $\overline{3j}$
 Aquae font. $\mathcal{Q}ij$.

Coque ad rem. ℥j Sub finem adde
Rad. liquirit. 3j.

Col. S. *Aller 1—2 Stunden eine halbe Tasse voll zu nehmen.*

Anwend. Als Sudorificum bei chronischen Katarrhen, syphilitischen Krankheiten u. s. w.

Hôp. de la Char.

1812. R_y. Ligni guajaci rasi 3iv
Rad. chinae 3ij.
Inf. aquae serv. ℥xij.
Macera per noctem. Coque ad rem. ℥viij.
D. ad lagenas.

S. *Täglich eine Flasche voll zu verbrauchen.*

Anwend. Gegen Lustseuche.

Tode.

1813. R_y. Ligni guajaci rasi 3ij.
Coque cum aquae q. s. per 1/2 hor.
Colat. ℥j adde
Vini sem. colchici 3ij.

S. *Aller 2 Stunden eine halbe Tasse.*

Anwend. Gegen chronische Gelenkschmerzen.

v. Hildenbrand.

Guajaci resina nativa; natürliches
Guajakharz.

(*Franzosenholzharz.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge, Emulsion, spirit. Lösung, gr. v—xx, einigemal
täglich. Tinktur, 30—70 Tropfen, 3mal.

1814. R_y. Resin. gnajaci 3ij
Tartari depur. 3ß
Sacchari albi 3vj.
M. f. pulvis.

S. Täglich 3mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen gichtische Beschwerden mit Unterleibssto-
ckungen.

Berends.

1815. R_y. Resinae guajaci 3j
Hydrargyr. stibiato-sulphurati
Magnes. carbon. āā ʒj.
M. f. pulvis.

S. In zwei Tagen zu verbrauchen.

Pulvis purificans Hufelandi.

Anwend. Gegen chronische Ausschläge u. s. w. Kindern von
7 Jahren die Hälfte, von 4 Jahren $\frac{1}{3}$; bei hartnäckigen
Fällen statt des Spiessglanzmohrs Plummer'sches Pulver.

Hufeland.

1816. R_y. Resinae guajaci nativ.
Ferri pulverati āā 3ß

Conch. ppt. $\bar{3}\beta$
 Sacchari albi $\bar{3}\text{ij}$.

M. f. pulvis.

S. Zweimal täglich eine Messerspitze oder einen Theelöffel voll zu geben.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Goelis.

1817. *Ry.* Resinae guajaci
 Sulphur. antimon. aurat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\beta$
 Hydrargyr. muriat. mit. gr. x
 Extr taraxaci q s.
 F pil. gr. ij . Consp. Cinnamom.

S. Täglich 3mal 3—4 Pillen.

Anwend. Gegen rheumatische Gelenkschmerzen.

v. Hildenbrand.

1818. *Ry.* Sulphur. dep. $\bar{3}\text{j}$
 Pulv. resinae guajaci $\bar{3}\beta$
 Stibii sulphurat nigri $\bar{3}\text{j}\beta$
 Extr. cardui bened. q. s.
 F. pil. gr. ij . Consp. lycopod.

S. Täglich 3mal 10 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Gicht, chronischen Rheumatismus, hartnäckige Hautausschläge.

Quarin.

1819. *Ry.* Resinae guajaci
 Hydrargyr. stibiato-sulphurat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}\text{j}$
 Extr dulcamar $\bar{3}\text{ij}$
 Syrup. simpl. q. s.
 F. pil. gr. ij . Consp lycopod.

S. Morgens und Abends 8 Stück.

Anwend. in gleichen Fällen.

P. Frank.

1820. *Ry.* Resinae gnajaci $\bar{3}\beta$
 Spirit. sacchari opt $\mathfrak{E}j - ij$.
 Dig. leni calore in vase clauso per viij dies.

Col. S. Täglich 1—2mal einen Esslöffel.

Tinctura guajaci cum taffia parata.

Anwend. Gegen atonische Gicht.

Emerigon.

1821. *Ry.* Tinct. guajaci c. taffia parat. $\bar{3}j$
 Camphorae $\mathfrak{A}j$.

S. S. Täglich 3mal zum Einreiben.

Anwend. Gegen chronische rheumatische Gelenkschmerzen.
 Bisweilen wird einfache Opiumtinktur zugesetzt.

v. Hildenbrand.

1822. *Ry.* Tinct. resinae guajaci alcohol $\bar{3}ij$
 „ hyoscyam. nigr. $\bar{3}j$.

M. S. Früh und Abends 24—30 Tropfen.

Anwend. Gegen Magenkrampf, Gesichtsschmerz. Dabel entzündungswidrige Lebensweise.

Herisson.

1823. *Ry.* Tinct. guajaci alcohol. $\bar{3}vj$
 „ valerian. $\bar{3}j$
 Syrup. cochleariae
 Tinct. benzoës comp. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
 Laudan. liquid. Syd. $\bar{3}j$.

M. S. Einen Theelöffel davon in einer Obertasse warmen Wassers auf die schmerzhafteste Stelle im Munde zu halten.

Anwend. Bei jedem Zahnschmerz sehr empfohlen von

Carus.

Tinctura Guajaci ammoniata; ammonium-
haltige Guajaktinktur.

(*Tinct. guajaci volatilis; flüchtige Guajak-
tinktur.*)

Form u. Gabe. Rein und in Mischung, 20 — 60
Tropfen, mehrmals täglich.

Man vermeide Säuren und Alkalien.

1824. Rx. Tinct. guajaci ammon.
Vini stibiatī āā ʒβ.

M. S. Abends einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Gicht.

Schubarth.

1825. Rx. Tinct. guajaci ammon. ʒj
Extr. aconiti ʒjβ
Tinct. cort. aurantior. ʒij.

S. S. Täglich 3mal 20—30 Tropfen.

[Anwend.] Gegen gichtische Geschwüre und Gicht überhaupt.

Kessler.

1826. Rx. Tinct. guajaci ammon.
Liqu. ammon. succin. āā ʒij
Tinct. opii simpl. ʒβ.

M. S. Dreimal täglich 15—20 Tropfen.

Anwend. Gegen rheumatisches Zahnweh.

Krukenberg.

Gutti. Gummigutt.

(*Guttae gummi. Von Garcinia Cambogia Willd.,
Cambogia gutta L., Stalagmites cambogioides
Murr.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Latt-
werge (unzweckmässig), Auflösung, Emulsion, als Reiz-
mittel gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$, als Purgirmittel gr. j—iij, als
drastisches Purgirmittel gr. v—x.

Man vermeide concentrirte Mineralsäuren, Salzbilder,
kaustische Alkalien, mehrere Metallsalze.

1827. **Ry.** Gutti
Hydrargyr. mur. mit. āā ʒj
Radic. jalapae
Sacchari albi āā ʒj.
M. f. pulv. Div. in iv dos. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Zur Austreibung des Bandwurms.

v. Hildenbrand.

1828. **Ry.** Gutti gr. x
Ferri sulphurici gr. vj
Sacchari albi ʒj
Olei menthae pip. gutt. iij.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. vj.

S. Aller 3—4 Stunden 1 Pulver bis zur gehörigen
Wirkung.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Vogt.

1829. *Ry.* Gutti gr. xxxvj
 Pulv. antepilept. Marchion.
 Rad ange'icae āā gr. viij
 Herb. cardui bened ʒj
 M. f. pulv. Div. in tres part. aequal.

S. Früh ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Der Kranke nimmt nach einem magern Abendessen gr. xij Calomel mit Ansterschalen. Eine halbe Stunde darauf 1 Unze süßes Mandelöl. Am folgenden Morgen ein Guttipulver. Das gewöhnlich entstehende Erbrechen wird durch Chamillen- oder Kardobenediktenthee erleichtert. Folgt 2 Stunden nach eingenommenem Pulver der Wurm nicht, so nimmt der Kranke das zweite, und unter gleichen Umständen das dritte Pulver.

Clossius. Wagler.

1830. *Ry.* Gutti gr. xxxvj
 Pulv. rad. valerian.
 „ sem. cinae āā gr. vj.
 M. f. pulv. Div. in part. iij aequal.

S. Früh ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Der Kranke soll zuvor schleimauflösende Mittel gebrauchen. Den Abend vor dem Einnehmen des Guttipulvers verordnet man gr xij Calomel mit Krebsaugenpulver, welches auf einmal genommen wird. Vor Schlafengehen lässt man den Kranken noch ʒiß süßes Mandelöl nehmen. Den Morgen darauf ein Guttipulver; Erbrechen und Stuhlgang lässt man durch Thee stillen; zwei Stunden darnach giebt man das zweite Pulver; das dritte ist selten nöthig. Während der Kur soll der Kranke im Bette bleiben und nach der Kur stärkende Mittel nehmen.

Ettmüller.

1831. a. Ry. Asae foetidae gr. xxxv
 Pulv. gutti
 „ rad. rhei
 „ „ jalapae āā 3ß
 „ „ ipecacuanhae
 „ herb. digitalis
 Sulphur. stibiat. aurant. āā gr. ijß
 Hydrargyr. muriat. mit. 3ß
 Olei tanaceti
 „ anisi āā gutt. iv
 Extr. gramin. liqu gr. xxxv.
 M. f l. a. pil. gr. ij. Consp. lycop. D. in vitro.
 S. Stündlich 6 Pillen mit 1 Theelöffel gemeinen
 Syrups.

Anwend. Gegen Bandwurm.

Zuvor lässt man den Kranken vom Morgen an bis Abends 7 Uhr 2 stündlich 2 Esslöffel von folgender Mixtur (das erstemal nüchtern) nehmen:

1831. b. Ry. Rad valerian min. 3vj
 Fol sennae 3ij
 Infunde
 Aquae commun. ferv. q. s. ad colat. 3vj, in qua
 solve
 Natri sulphur. dep. cryst. 3iij
 Elaeosacch. tanaceti 3ij
 et adde
 Syrup. mannae 3ij.

M. D.

und schwarzen Kaffee mit vielem Zucker nachtrinken. Zum Mittagsbrod eine dünne Mehlsuppe und einige Stücke Häring mit der Haringsmilch. Abends um 8 Uhr einen Haringsalat (ohne Kartoffeln) mit gehacktem rohen Schinken, einer Zwiebel, recht vielem Oel und einer Portion Zucker. — Zum Getränk den Tag über Zuckerwasser.

Am folgenden Tage von 6 Uhr Morgens an die Pillen. In der Zwischenzeit schwarzen Kaffee mit vielem Zucker. Um 6 1/2 Uhr einen Esslöffel Ol. ricini. Gegen Mittag et-

was Fleischbrühe. Bis 2 oder 3 Uhr Nachmittags geht in der Regel der Wurm ab; wo nicht, so giebt man noch einige Dosen Ricinusöl, bis er abgegangen ist; mit den Pillen hört man auf. — Abends eine Fleischsuppe oder eine Mehlsuppe mit frischer Butter und Zucker. — Am folgenden Tage können zur Vorsorge, damit kein Wurmnest zurückbleibe, noch einige Pillen genommen werden.

Um etwaige Rückfälle zu verhüten, lässt man den Kranken noch öfters Häringssalat und rohen geriebenen Meerrettig mit Essig und vielem Zucker geniessen. Zur Nachkur eine stärkende Diät (Bouillon, Eigelb, Wein) und ein bitteres Mittel.

Kontraindicirt ist die ganze Kurmethode bei Altersschwäche, Schwangerschaft, kurz vor und kurz nach der Menstruation, bei Entzündungen, Schwindsuchten und Abzehrungen aller Art, bei fließenden Hämorrhoiden, Bluthusten. Bei jugendlichen Individuen giebt man verhältnissmässig kleinere Dosen.

C. A. Schmidt in Berlin.

1832. *Ry.* Gutti ʒj
Hydrargyr. muriat. mit. gr. iij
Sacchari albi ʒj.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen atonische Wassersucht.

v. Hildenbrand.

1833. *Ry.* Rad. scillae gr. vj
Gummi gutti gr. xij
Sacchari albi
vel Tart. dep. et Elaeosacch. foeniculi āā ʒj.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Wassersucht.

v. Hildenbrand.

1834. a. Rx. Gutti
 Hydrargyr. muriat. mit. āā gr. β
 Rad. scillae pulv. gr. iij.
 M. f. pulv.

S. *Abends zu nehmen.*

Anwend. Gegen Bauchwassersucht.

In Verbindung mit folgendem zu nehmen:

1834. b. Rx. Spirit. nitrico-aeth. 3β—j
 Hydrargyr. muriat. corr. gr. $\frac{1}{8}$
 Tinct. digitalis gutt. xv
 Mixturae camphorat. pauxillum.
 M. Dent. tal. dos. vj.

S. *Täglich 2—3mal.*

Astley Cooper.

1835. Rx. Gutti gr. vj
 Extr. aloes acid. sulph. corr. 3β.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycopod.

S. *Abends 1—3 Pillen.*

Heim's stärkere Purgirpillen.

Anwend. Zum kräftigen Abführen.

Heim.

1836. Rx. Gutti
 Fol. digital. purp.
 Rad. scillae
 Sulph. antimon. aurat.
 Extr. pimpinell. āā 3β.
 M. f. pil. gr. ij. Consp. lycopod.

S. *Aller 2—3 Stunden 1 Pille.*

Pilulae hydragogae Heimii.

Anwend. Gegen Wassersuchten. — Heim liess bisweilen die Digitalis weg.

Heim, Hufeland.

1837. *Ry.* Gummi gutti gr. iij—vj
 Roob sambuci q. s. ut f. bolus.

S. Auf einmal zn nehmen.

Bolus drasticus Brerae.

Anwend. Bei gastrischen Diarrhöen allen andern Purgirmitteln vorzuziehen, weil das Gummigutt, wenn die Unreinigkeiten des Magens entfernt sind, adstringierend wirkt. Auch bei Würmern anwendbar.

Brera.

1838. *Ry.* Gutti ʒß.
 Solve in
 Liqu. kali carbonici ʒß.

D. S. Täglich 3—4mal 30 Tropfen.

Anwend. In der Wassersucht.

Richter.

1839. *Ry.* Gutti ʒj
 Sal. tartari ʒij.
 Solve in
 Aquae cinnamom. vinos. ʒj.

D. S. Täglich 3—4mal 30 Tropfen.

Anwend. In der Wassersucht.

Baldinger.

1840. *Ry.* Gutti gr. iv
 Spirit. nitr. dulc. ʒj
 Tinct. sennae ʒij
 Syrup. rhamni
 Aquae menth. āā ʒß.

S. S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. In Brustwassersucht bei drohender Erstickungsgefahr.

Ferriar.

1841. *Ry.* Gutti ʒj
 Gummi mimos. ʒj.

Tere cum

Aquae destill. ʒiv, ut f. emulsio.

Cui adde

Liqu. kali carbon. ʒβ

Syr. althaeae ʒβ.

M. D. S. Umgeschüttelt, aller 3 Stunden 1 Ess-
 löffel.

Richter.

H.

Helix Pomatia L. Weinbergschnecke.

(*Gartenschnecke.*)

Form u. Gabe. *In Substanz (ekelhaft), in Abkochung zur Bereitung von Brühen und Gallerten.*

Man vermeide Säuren, Salzbilder, Metallsalze, Gerbestoff.

1842. **Ry.** Helices pomat. xx.

Testa nudat. eluantur et contundantur in mortario marm pist. ligneo; dein coquantur c. aquae commun. q. s. per trihorium. Sub finem coct. adde

Lichen islandici conc. ʒiij

Cort. cinnamom. ʒβ.

Ebulliant per hor. ad colat ℥ij.

S. *Täglich 4mal 1 Tasse voll lauwarm zu trinken.*

Anwend. In abzehrenden Krankheiten als stark nährendes Mittel.

Hellebōri albi radix. Weisse
Nieswurzel.

(*Weisse Germerwurzel. Von Veratrum al-
bum L.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. ℞—j, allmählig vorsichtig steigend bis vj, bei Geisteskranken bis x, einigemal täglich; in Aufguss, Abkochung, ʒß -- iv auf ʒiv—vj, esslöffelweise. — Aeusserlich zu Schnupfpulver (mit Vorsicht), Waschungen.

Man vermeide besonders salzsaures Gold, Gerbestoff.

1843. **Ry.** Rad. hellebor. albi gr. xv
Aceti q. s.
Coque per $\frac{1}{4}$ hor. ad colat. ʒv. Adde
Sacchari albi ʒj.

M. D. S. Aller 2—3 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Geisteskrankheiten.

Wendt.

1844. **Ry.** Rad. hellebori albi ʒj
Alcohol. (35°) ʒiv.
Post septem dies macerationis filtra.

S. Zu 5—10—15 Tropfen in einem passenden Vehikel zu geben.

Tinctura hellebori albi.

Anwend. Als Reiz- und Brechen-erregendes Mittel.

1845. *Ry.* Pulv. hellebori albi $\bar{3}$ ij
 „ rad. irid. flor. $\bar{3}$ j
 „ oryzae $\bar{3}$ j β .
 Mixtur. oleoso-bals. gutt. xx.

M. S. Schnupfpulver.

Anwend. Bei Amaurose, Apoplexie, Lethargus.

Pharm. Hann.

1846. *Ry.* Rad. hellebori albi $\bar{3}$ j.
 Coque cum
 Aquae commun. $\bar{8}$ ij ad remanent. colat. $\bar{8}$ j.
 Refrig. adde
 Alcohol. $\bar{3}$ ij.

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Bei Tinea, Flechten, Krätze und anderen hartnäckigen Hautkrankheiten.

1847. *Ry.* Pulv. rad. helleb. alb. $\bar{3}$ β
 Axung porc. $\bar{3}$ iv
 Olei essent. citri gutt. xx.
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Unguentum hellebori albi Bietti.

Anwend. Gegen Krätze 13—14 Tage anzuwenden.

Batemann setzt zu dieser Salbe Olei de Cedro $\bar{3}$ β .
 Nach der Pharm. Lond. wird $\bar{3}$ j Helleborus zu dieser Salbe genommen.

Biett.

1848. *Ry.* Pulv. rad. helleb. albi $\bar{3}$ ij
 Sulphur. dep. $\bar{3}$ j
 Adip. suill. $\bar{3}$ iv.
 M. f. unguent.

S. Einer Wallnuss gross in die flache Hand und auf die Fusssohlen einzureiben.

Unguentum sulphuris helleboratum Pringlii.

Anwend. Gegen Krätze.

Pringle.

Hellebōri nigri radix. Schwarze
Nieswurzel.

(*Radix Melampodii; Christwurzel. Von Helleborus niger L.*)

Form u. Gabe. In Pillen, zu gr. ij—viij, als *Drasticum* zu gr. xv—xxx, einigemal täglich; im Aufguss, ℥ij—iv auf ℥vj, esslöffelweise. — Extrakt in Pillen, Lösung, zu gr. ij—x, einigemal täglich. — Tinktur, 20—60 Tropfen, einigemal.

Man vermeide Alkalien, Oxalium, Alaun, Metallsalze, Gerbestoff.

1849. *Ry.* Fibrillor. rad. hellebori nigri ℥ij.

Coque cum

Aquae font. q. s.

Colat. ℥viij adde

Kali tartarici ℥j

Mellis despumati ℥ij.

M. D. S. Esslöffelweise zu nehmen.

Anwend. Bei Melancholie.

Reil.

1850. *Ry.* Rad. hellebori nigr ℥j

Herb. absinthii manip. j.

Infunde

Vini mosellani ℥iv.

Digere per iij dies.

Cola. S. Früh nüchtern 2—3 Esslöffel.

Brunner's Nieswurzelauflguss.

Anwend. Gegen Wassersucht von Unterleibsstockungen.

Brunner.

1851. *Ry.* Fibrar. hellebori nigri
 Rad graminis
 Summitat. millefolii
 Flor. chamomill. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j\beta$
 Semin. anisi stellati $\bar{3}ij$.

C. M. f. species.

S. Zum Aufguss.

Anwend. Zur Beförderung der monatlichen Reinigung bei blassen, aufgedunsenen Mädchen mit reizlosem, tragem Temperamente.

Fr. Jahn.

1852. *Ry.* Extr. hellebori nigri
 Ammon. muriat. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}ij$
 Extr. absinthii $\bar{3}j$
 Aquae menthae pip. $\bar{3}v$.

S. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen viertägige Wechselfieber, die darauf meistens beim 2 oder 4. Anfälle verschwinden, mit gleichzeitiger Beseitigung der Fieberkachexie und der Anschoppung im Unterleibe. — Nur selten wird die gleichzeitige Anwendung der China oder Belladonna nöthig.

Berndt.

1853. *Ry.* Extr. hellebori nigri
 „ myrrhae aquosi $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{3}j$
 Herb. cardui bened. q. s.
 ut f. pil. gr. j. Consp. lycopod.

S. Täglich 2mal 4 Stück.

Pilulae tonicae Bacheri.

Anwend. Gegen Wassersucht, Menle, Amenorrhöe.

1854. *Ry.* Extr. hellebori nigri
 Asae foetidae
 Aloes lucidae

Vitriol. martis

Croci āā 3ß

Tinct. aloes q. s.

ut f. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

D. S. Abends 10 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei unterdrückten Hämorrhoiden und mangelnder Menstruation.

Richter.

Helminthochortos. Wurmtang.

(*Meli-*, *Lemithochorton*, *Corallina corsicana*; *Wurmmoos*, *corsikanisches Moos*. *Fucus Helminthochortos* L., *F. ceramium*.)

Form u. Gabe. In Pulver, Lattwerge, ʒj — iij, mehrmals täglich; in Aufguss oder Abkochung, 3j — iij auf ʒiij — iv, esslöffelweise; Gallerte. Aeusserlich zu Klystieren.

Mit Eisensalzen wird der Auszug dunkelbraun und es scheiden sich Flocken ab.

1855. Ry. Helminthochorti ʒiij.

Infunde per xx sexagesimas in aqua ferv.

Colat. ʒvj adde

Syrupi mellis ʒj.

M. S. Esslöffelweise den Tag über.

Linctus anthelminthicus Chaussier.

Anwend. Gegen Spulwürmer.

Chaussier.

856. Ry. Helminthochorti 3ß

Herb. gratiolae ʒj

Aquae commun. ʒvj.

Misce, coque. Colat. $\bar{3}v$ adde
 Ferri sulphurici $\bar{3}\beta$
 Mellis despumati $\bar{3}\beta$.

*S. Erwachsenen Vormittags aller 2 Stunden einen
 Esslöffel voll.*

Anwend. Gegen Würmer aller Art. Laxirt es nach der er-
 sten oder zweiten Gabe nicht, so setzt man es zurück.

Er. Wendt.

1857. *Ry.* Helminthochorti $\bar{3}j$
 Vini rhenani $\bar{3}vij$.
 Digere leni calore per viij horas.
 Colat. refriger. adde
 Tinct. sennae $\bar{3}j$
 Syrup. cort. aurant. $\bar{3}\beta$.

*M. D. S. In einem Tage auf dreimal zu ver-
 brauchen.*

Anwend. Gegen Würmer.

Baldinger.

1858. *Ry.* Helminthochorti $\bar{3}j$
 Aquae comm. bullientis $\bar{3}iv$.
 Ebulliant per x minutas. Colat. refriger. adde
 Aquae flor. aurantior $\bar{3}\beta$
 Syrup. succi citri $\bar{3}j$.

*M. D. S. Des Morgens nüchtern esslöffelweise
 (oder auf einmal) zu nehmen.*

Anwend. Gegen Spulwürmer.

de Montmahou.

1859. *Ry.* Helminthochorti $\bar{3}j$
 Ichthyocollae $\bar{3}\beta$
 Coque c. aquae comm. $\bar{3}i$ ad colat. $\bar{3}iv$, in
 qua statim solve

Sacchari albissimi $\overline{3}$ j.

Repone in loco frigido, ut in gelatinam abeat.

D. S. Theelöffelweise.

Anwend. Für Kinder gegen Spulwürmer.

Sundelin.

1860. *Ry.* Helminthochorti

Semin. cinæ

Rad. valerianæ min. $\overline{aa}$ $\overline{3}\beta$.

Infunde.

Aquæ ferv. q. s. ad colat. $\overline{3}$ vj.

D. S. Umgeschüttelt, zu zwei Klystieren.

Anwend. Gegen Askariden bei Kindern.

Fleisch.

Hordeum. Gerste.

(Von mehreren Arten Hordeum, als: *H. vulgare* L., *distichon* L., *hexastichon* L.)

Form u. Gabe. In Abkochung, $\overline{5}$ ij — $\overline{3}$ j auf 1 Maass Wasser zum Getränk. Gurgelwasser.

1861. *Ry.* Hordei $\overline{3}$ ij.

Coque cum

Aquæ font. q. s. ad crepat.

Colat. $\overline{8}$ ij adde

Sacchari albi l. Oxymell. simpl. q. s.

ad grat. saporem.

D. S. Zum Getränk.

Anwend. Als kühlendes, auflösendes Mittel in fieberhaften Krankheiten.

A. *Hordeum excorticatum*; Gerstengraupen.

(*Hordeum mundatum*; geschälte Gerste, Rollgerste. *Hord. perlatum*; Perlgraupen.)

Form u. Gabe. Als Getränk $\mathfrak{zj}$ —iv auf $\mathfrak{&j}$ —ij.

1862. *Rx.* *Hordei excortic.* $\mathfrak{zj}\beta$.

Coque cum

Aquae font. $\mathfrak{&ij}\beta$ ad colat $\mathfrak{&ij}$.

Adde

Kali nitrici depur. $\mathfrak{zij}$

Sacchari albi $\mathfrak{zij}$.

M. S. Zum Getränk.

Anwend. In hypersthenischen Fiebern.

Berends.

B. *Hordei farina praeparata*; präparirtes Gerstenmehl.

Form u. Gabe. Suppe, Brei, $\mathfrak{z}\beta$ —ij, mit Milch oder Fleischbrühe.

1863. *Rx.* *Farin. hordei praep.* $\mathfrak{zj}$

Lactis vacc. $\mathfrak{&ij}$.

Coque per $\frac{1}{4}$ horam. Adde

Sacchari albissimi q. s. ad grat. saporem.

S. Des Morgens nüchtern im Bette zu geniessen.

Anwend. Bei Atrophie, Lungensucht u. s. w.

Hufeland.

C. Hordei maltum; Gerstenmalz.

Form u. Gabe. In Aufguss oder Abkochung, $\bar{3}j$ — $\bar{ij}$ auf $\mathcal{L}j$ Wasser, täglich, tassenweise. Aeusserlich zu Kataplasmen, Bädern, Klystieren.

1864. *Ry.* Malti hordei
Rad. gramin. $\bar{aa}$ $\bar{3}j$.
C. C. coque ex
Aquae font. $\mathcal{L}ij$ ad rem. $\mathcal{L}j\beta$.

C S. Während des Tages zu verbrauchen.

Malztrank.

Anwend. Auflösendes, leicht nährendes Mittel.

1865. *Ry.* Malti hordei $\bar{3}ijj$.
Coque ex
Aquae font. $\mathcal{L}ijj$ ad colat. $\mathcal{L}ij$, eni adde
Succi citri $\bar{3}\beta$
Vini rhenani $\bar{3}iv$.

M. D. S. Mit Zucker versüsst tassenweise zu verbrauchen.

Anwend. Gegen Skorbut.

Berends.

1866. *Ry.* Malti hordei $\bar{3}j$
Nasturtii aquat. man. j
Aquae comm. $\mathcal{L}iv$.
Coque ad rem. $\mathcal{L}iv$. In colat. solve
Aluminis $\bar{3}ij$
Ammon. muriat. dep. $\bar{3}j$.

D. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei skorbutischen Zufällen.

Sainte-Marie.

1867. *Ry.* Malti hordei contusi

Rad. althaeae inc.

Semin. hordei excort. āā ʒij.

M. f. spec. Disp. tal. dos. iv.

D. S. Eine Portion mit 2 grossen Tassen Wasser auf die Hälfte eingekocht.

Anwend. Zum Klystier.

1868. *Ry.* Malti hordei contusi q. s.

ut f. c. cerevisia cocta cataplasma.

S. Auf Leinwand zu streichen und auf die Oberfläche einen Löffel von der besten Hefe zu verbreiten.

Anwend. Gegen bösartige Verschwärungen Der Umschlag ist innerhalb 24 Stunden 2—3mal zu wechseln.

Williams.

Humuli Lupuli strobili. Hopfen.

(*Coni s. Flores s. Turiones Lupuli; Hopfenzapfen, Kegel. Von Humulus Lupulus L.*)

Form u. Gabe. Selten in Pulver, gr. v—xv, einigemal täglich; in Aufguss, ʒvj—viij auf ʒvj, esslöffelweise. — Bähungen, Umschläge, Kräuterbetten, Bäder ʒiv—viij. — Tinktur (ʒj auf ʒvj Spirit. vini) 30 60 Tropfen. — Extrakt, gr. xv—xx, mehrmals täglich.

1869. *Ry.* Strobul. lupuli ʒß.

Inf. cum

Aquae serv. ℥j.

Digere per ½ horam vase clauso.

Cola. D. S. Tassenweise zu verbrauchen.

Anwend. Bei Magenschwäche und Appetitlosigkeit.

Schubarth.

1870. *Ry.* Strobul. humul. lup. $\mathfrak{Z}j$
 Minut. conc. infunde
 Spirit. vini rectific. $\mathfrak{Z}vj$.
 Digere loco tepido per triduum.
 Tinct. expressa et filtrata $\mathfrak{Z}v$ par sit.

S. Täglich 4mal einen Theelöffel.

Anwend. Gegen habituelle Verdauungsschwäche, Kachexieen, Unthätigkeit der Nieren.

Vogt.

1871. *Ry.* Strobul. humul. lup.
 Herb. scordii
 „ menthae crisp.
 „ serpylli $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{Z}\beta$.

C. M. S. Mit Essig, Branntwein und Wasser, von jedem $\mathfrak{Z}j$, heiss zu übergiessen und mittelst eines Nachtgeschirres in den Leibstuhl zu setzen.

Anwend. Gegen Wassérbruch der Kinder.

Vogt.

1872. *Ry.* Strobul. hnmul. $\mathfrak{Z}j$
 Farin. semin. lini $\mathfrak{Z}ij$.
 Coque cum
 Cerevisiae l. Vinil. Aceti q. s.
 ad consist. cataplasmat.

S. Umschlag.

Anwend. Gegen Quetschungen, Verrenkungen, kalte, skroföse Geschwülste.

Lupulinum; Hopfenstoff.

Form u. Gabe In Pulver, Pillen, Bissen, gr.
 iij—xv, 2—3mal. Salbe.

1873. Rx. Lupulini $\mathfrak{z}\beta$.
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 M. f. pulvis.

S. Eine Messerspitze täglich 3mal in Wasser.

Anwend. Gegen Magenschwäche, Skrofeln.

Magendie.

1874. Rx. Lupulini $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 F. c. paux. gummi tragacanth. pil. gr. ij. Consp.
 canella alba.

S. Täglich 2—3mal 4—10 Stück.

Anwend. Als beruhigendes, magenstärkendes, harntreibendes
 Mittel.

1875. Rx. Lupulini pulv. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Digere in balneo Mariae per v—vj horas in
 Axungiae $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

Colat S. Auf Kompressen zu streichen.

Anwend. Gegen Krebs Schmerzen als Beruhigungsmittel.

Freake.

Hydrargyrus. Quecksilber.

(*Mercurius, Argentum vivum s. liquidum, Hydrargyrum, Hydrargyrium, Aqua argentea, Aqua metallorum; Merkur, Wassersilber.*)

A. Hydrargyrus aceticus; essigsaures
Quecksilberoxydul.

(*Mercurius acetatus, Acetas hydrargyrosus, Terra foliata mercurialis; Quecksilberessigsalz.*)

Form u. Gabe. In Pillen, Bissen, Trochisken, zu gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$, allmählig steigend bis zu gr. ij , täglich 2 mal. Aeusserlich zu Waschungen, Linimenten, Salben.

Man vermeide Säuren, Salzbilder, Alkalien, viele Salze, Seifen, gemeines Wasser, Gerbestoff, Schwefelleber.

1876. R_y. Hydrargyri acetici ʒj
Succi liquirit. ʒj
Aquae destill. q. s.
ut f. pil. Lxxx. Consp. lycopod.

S. Täglich 2mal 4 Stück zu nehmen.

Anwend. In secundärer Syphilis.

Schubarth.

1877. R_y. Hydrargyri acetici
Gummi arab. āā ʒβ
Sacchari albi ʒij
Pulv. rad. althaeae

Amyli pulv. āā 3ij
Mucilag. gummi arab. q. s.
ut f. pil. gr. j.

D. S. Morgens und Abends 2 und allmählig bis
5 Stück täglich zu nehmen.

Drageae s. Pilulae Keyseri.

Anwend. In secundärer Syphilis.

1878. Rx. Hydrargyri acetici 3j
Axung porci 3vj
Olei olivar. 3ij.
M. exacte; f. liniment.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen venerische Flechten.

van Mons.

B. Hydrargyrus ammoniato - muriati-
cus; salzsaures Quecksilberammoniak.

(*Hydrargyrus praecipitatus albus s. cosmeticus, Hydrargyrum amidato-bichloratum, Oxychloretum hydrargyricum cum Ammonio, Ammonium muriaticum hydrargyratum, Lac mercuriale; weisser Quecksilberniederschlag, weisser Präcipitat.*)

Form u. Gabe. Nur äusserlich. Streupulver mit Stärkemehl gegen Ungeziefer (mit Vorsicht!). Salbe, gr. j — x auf 3j.

Man vermeide kaustische Alkalien, Gerbestoff, Hitze.

1879. *Ry.* Hydrargyr ammoniato-muriat. $\bar{3}j$

Unguent. rosati $\bar{3}j$.

M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Milchschorf Erwachsener.

Hecker. Köchlin.

Gegen hartnäckige, tiefe, habituelle, sehr ausgebreitete Flechten. — Der ganze Körper wird mit der Salbe $\frac{1}{4}$ Stunde lang täglich einmal so eingetrieben, dass die Haut glänzt; dabei Temperatur von 15–16° R., magere Diät, blutreinigender Holztrank und wöchentlich ein Seifenbad.

v. Gräfe.

Gegen das blennorrhoeische Stadium der ägyptischen Augenentzündung auf die wuchernde Lidfläche.

Büttner.

1880. *Ry.* Hydrargyr. ammoniato-muriat. $\mathfrak{z}j$

Camphorae gr. v

Adipis suilli $\bar{3}\beta$.

M. f. unguentum.

D. S. Salbe.

Anwend. Gegen Herpes pustulosus, nachdem die entzündlichen Symptome durch erweichende Mittel beseitigt sind.

Bielt

1881. *Ry.* Hydrargyr. ammoniato-muriat. $\mathfrak{z}iij$ —iv

Ungt. digital. purp. $\bar{3}j$.

M. f. unguentum.

S. Täglich 3 — 4 mal einen Theelöffel voll einzureiben und die Stelle mit Wachstaffet zu bedecken.

Anwend. Statt der Brechweinsteinsalbe. Gegen chronische Rheumatismen, inveterirte Gicht und gicht. Kontrakturen,

chronische Dysphagie und hartnäckig heisere Stimme, beginnende Luftröhrenschwindsucht, veraltete Brustkatarrhe, chronischen Husten, Lungenschwäche, schleimige Lungensucht, Keuchhusten, hartnäckige chronische Durchfälle und Kardialgieen, verhärtete skrofulöse Drüsen, skrofulöse Ophthalmieen und Knochenaufstreibung, weisse Geschwulst.

Kopp.

1882. *Ry.* Hydrargyr. ammoniato-muriat. 3j

Axung. porci 3j.

M. f. unguentum.

S. Einer Bohne gross in die Gelenke früh und Abends einzureiben.

Unguentum antipsoricum Werlhofii.

Anwend. Gegen Krätze.

Werlhof.

1883. *Ry.* Hydrargyr. ammon.-muriat. gr. j

Axung porci l. Bntr. de cacao 3j.

M. exacte; f. unguentum.

S. Augensalbe.

Anwend. Gegen katarrhalische Röthung und Schleimabsonderung der Lider, Augenlidkrätze, auch gegen leichte Verdunkelung der Hornhaut. Abends, oder Morgens und Abends eines Stecknadelkopfes gross auf den Augenlidrand oder zwischen die Augenlider zu streichen.

1884. *Ry.* Hydrargyr. ammon.-muriat. gr. j

Zinci oxydat. alb. gr. ij

Axung. porci l. Cerat. albi 3j.

M. exacte; f. unguentum.

S. Augensalbe.

Anwend. In gleichen Fällen, wo die schleimig-eiterige Absonderung stärker ist, auf gleiche Weise anzuwenden.

Radius.

1885. *Ry.* Hydrargyr. ammon.-muriat. gr. xv
 Boli armenae $\mathfrak{z}$ j
 Butyr. rec. insuls. $\mathfrak{z}\beta$.
M. exactiss.

S *Früh und Abends einer Linse gross in's Auge zu streichen.*

Anwend. Gegen Psorophthalmie, skrofulöse Entzündung der Augenlider und Augenliderdrüsen.

Rust.

1886. *Ry.* Hydrargyr. ammon.-muriat. gr. iv—vj
 Aceti plumbi
 Tinct. opii croc. $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$
 Butyr. rec. insulsi $\mathfrak{z}$ ij.
M. exactiss; f. unguentum.

S. *Augensalbe.*

Anwend. Wie die vorhergehende und in gleichen Fällen.

Rust.

1887. *Ry.* Hydrargyr.-ammon.-muriat. gr. xv
 Tutiae praep.
 Boli armenae $\overline{aa}$ $\mathfrak{z}\beta$
 Axung. porci $\mathfrak{z}$ j.
M. in mort vitr. exact., ut f. unguentum.

S. *Einer Linse gross Morgens und Abends in's Auge zu bringen.*

Unguentum ophthalmicum Janini.

Anwend. Gegen chronische Augen- und Augenliderentzündung, variköse Gefässe, Flecken und Geschwüre der Hornhaut.

Janin.

C. Hydrargyrus bibromatus; doppeltbromquecksilber.

(*Hydr. perbromatus s. hydrobromicus oxydatus, Brometum hydrargyricum, Deutobromuretum Mercurii; Quecksilberdeutobromür, Bromquecksilber in maximo, hydrobromsaures Quecksilberoxyd.*)

Form n. Gabe. In Auflösung, zu gr. $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{3}$, 1—2mal täglich.

Man vermeide Alkalien, Silber- und Bleisalze, Schwefelverbindungen, besonders aber Chlor.

1888. Ry. Hydrargyr. bibromati gr. ij
Aqua destill. $\mathfrak{z}$ iv.

S. S. Täglich zweimal 10 Tropfen, nach und nach bis 100 zu nehmen.

Anwend. Gegen Lustseuche.

Werneck.

1889. Ry. Hydrargyr. bibromati gr. j
Aether sulphur. $\mathfrak{z}$ j.

S. S. Täglich nach dem Mittagessen 10—15—20 Tropfen in Haferschleim zu nehmen.

Anwend. Gegen primäre und secundäre Syphilis.

Werneck.

Gegen Kopfgrind.

Prieger.

1890. R_y. Hydrargyr bibrom. gr. j
Aqua destill. ℥j.

S. Zur Befeuchtung von Kompressen.

Anwend. Gegen syphilitische Geschwüre.

Werneck.

D. Hydrargyrus bromatus; einfaches Bromquecksilber.

(*Brometum hydrargyrosus, Protobromuretum
Mercurii; Protobromüre des Quecksilbers.*)

Form u. Gabe. In Pillen, Lösung, gr. $\frac{1}{8}$ – ij,
einigemal täglich.

Dieses Präparat ist in seinen Wirkungen ganz gleich
dem Calomel nach Werneck's Versuchen.

E. Hydrargyrus cyanogenatus; Blau- stoffquecksilber.

(*Hydrargyrus hydrocyanicus, zooticus, borussicus,
Cyanuretum Mercurii; blaues Queck-
silberoxyd, Cyanquecksilber.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Lösung, gr. $\frac{1}{16}$
– $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{2}$ – 1, täglich einigemal; äusserlich zu Mund,
Gurgel, Verbandwässern, Einspritzungen, Salben.

Man vermeide Salzbilder, Wasserstoffsäuren, mehrere
Salze, Schwefelleber, Gerbestoff, gemeines Wasser, Hitze.

1891. *Ry.* Hydrargyr. cyanogenati gr. β
 Pulv. rad. calam. arom. $\mathfrak{z}\beta$.
 M. f. pulv. Dent. tal. dos. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.

S. Morgens und Abends 1 Pulver.

Anwend. Bei hartnäckiger Syphilis.

Horn.

1892. *Ry.* Hydrargyr. cyanogenat. gr. $\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$
 Sacchari albi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
 M. f. pulv. Div. in $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ part. aequal.

S. Abends vor Schlafengehen ein Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen heftige rheumatische, hysterische Kopfschmerzen, die den gewöhnlichen Mitteln widerstehen. Dabei den Tag über ein Sarsaparillendekokt ($\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ zu $\mathfrak{z}\mathfrak{x}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$).

Fricke.

1893. *Ry.* Hydrargyr. cyanogenat. gr. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$
 Opii puri $\mathfrak{z}\beta$ (gr. $\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$)
 Mic. panis albi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$
 Mellis q. s. ut f. pil. $\mathfrak{x}\mathfrak{c}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$. Consp. lycop.

S. Täglich 1—2 Stück.

Anwend. Gegen veraltete Lustseuche.

Parent.

1894. *Ry.* Hydrargyr. cyanog. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{x}$
 Aquae destill. simpl. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

S. Täglich $\frac{1}{2}$ Esslöffel in Quecken- oder Süßholztrank.

Anwend. Gegen veraltete Lustseuche.

Parent.

1895. *Ry.* Hydrargyr. cyanogenat. gr. v
 Aquae destill. ℥β
 Laudan. liquid. ʒβ.

M. S. Früh und Abends 1 Esslöffel in Sarsaparillendekokt.

Anwend. Gegen Syphilis, besonders gegen syphilitische Knochengeschwülste.

Mendoza.

1896. *Ry.* Hydrargyr. cyanogenat. pulv. gr. x
 Decoct. hordei ℥j
 Mellis rosati ʒj.

M. S. Zum Ausspülen des Mundes.

Gargarisma antisyphiliticum Brerae.

Anwend. Bei syphilitischen Geschwüren des Schlundes.

Brera.

1897. *Ry.* Hydrargyr. cyanogenat. gr. ij.
 Solve in

Aquae destill. ʒxiv
 „ laurocerasi ʒij.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Bei Blennorrhoea urethrae secundaria, besonders mit erhöhter Empfindlichkeit.

Horn.

1898. *Ry.* Hydrargyr. cyanogenat. gr. xij
 Axung. porci ʒj.
M. exact.; f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen veraltete Lustseuche.

Parent giebt diesem Mittel wegen seiner grösseren Auflösbarkeit den Vorzug vor dem ätzenden Sublimat.

Parent.

1899. *Ry.* Hydrargyr. cyanogenat. gr. xvj
 Axung. porci $\bar{3}j$
 Oei citri essent. gutt. xv.
M. f. unguent.

S. Eine halbe bis eine ganze Drachme einzureiben.

Anwend. Gegen Herpes squamosus humidus mit Entzündung und Jucken.

Parent empfiehlt eine ähnliche Salbe ohne Citronenöl zum Verbinden von Chankern.

Bielt.

F. Hydrargyrus iodatus; Jodquecksilber.

(*Protoioduretum Hydrargyri, Mercurius oxydulatus hydriodicus, Iodidum hydrargyrosus, Hydrarg. iodatus flavus; Quecksilberprotoiodür, Quecksilberiodidul, Jodquecksilber in minimo.*)

Form u Gabe. In Pulver, Pillen, gr. $\frac{1}{8}$ —j, mehrmals täglich (*Ricord* gab gr. vj täglich); Salbe, $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iiij}$, auf $\bar{3}j$; Augensalbe, gr. $\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iiij}$ auf $\bar{3}j$.

Die Salben dürfen nicht alt werden, weil sie sich leicht zersetzen.

Man vermeide die bei Bromquecksilber aufgeführten Stoffe.

Flüssigkeiten, welche Jodquecksilber enthalten, sind gegen Licht zu schützen.

1900. *Ry.* Hydrargyr. iodati gr. j—viij
 Magnes. albae $\bar{3}j$.
M. f. pulv. D v. in xij part. aequal.

S. Täglich 3mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen hartnäckige Skrofeln, venerische Geschwüre, *Lepra syphilitica*.

Thompson.

1901. *Ry.* Hydrargyri iodati
Lactucarii aa 3ß
Extr. opii aquosi gr. ix
„ guajac. 3j.
M. f. pil. xxxvj. Consp. lycop.

D. S. Täglich 1—6 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen primäre sowohl als sekundäre Syphilis als das beste Mittel gerühmt von

Ricord.

1902. *Ry.* Hydrargyr. iodati gr. vj
Extr. opii gumm. gr. iv
Lactucarii gr. xxiv.
Extr. guajaci gr. xlviiij.
M. f. pil. xlviiij. Consp. lycop.

D. S. Eine, später 2—3—4 Pillen für ein halbjähriges Kind.

Anwend. Bei Syphilis der Kinder.

1903. *Ry.* Hydrargyr. iodati gr. j
Roob juniperi gr. xij
Rad. liquirit. pulv. q. s. ut f. pil. viij.
Consp. lycop.

S. Früh und Abends 2, später 3—4 Stück.

Anwend. Gegen skrofulöse, mit Syphilis verbundene Leiden.

Bielt.

1904. *Ry.* Hydrargyr. iodati ʒj—3ij
Axungiae porc. 3j.
M. exacte; f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen venerische Geschwüre.

Ricord.

1905. *Ry.* Hydrargyr. iodati gr. x
Axungiae 3vj.

M. exacte. *F.* unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen veraltete, hartnäckige venerische Geschwüre.

Biett.

Gegen skrofulöse Geschwüre.

Tünnermann.

1906. *Ry.* Hydrargyr. iodati ʒij—iv
Axungiae 3ij.

M. f. unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. Gegen fressende skrofulöse Geschwüre, die oft das Ansehen syphilitischer haben; besonders wenn die Knochen mit leidend sind.

Lugol.

1907. *Ry.* Hydrargyr. iodati 3j
Axungiae 3j.

M. f. unguentum.

S. Früh und Abends auf die schuppigen Stellen einzureiben.

Anwend. Gegen Psoriasis. Nebenbei Cichorientrank oder schwefelsaure Limonade, Biswellen Bäder.

Boinet.

1908. *Ry.* Hydrargyr. iodati gr. vj
Morphii acet. gr. viij
Axungiae porc. 3j.

M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen hartnäckige Drüsengeschwülste.

Pelletan.

G. Hydrargyrus periodatus; Quecksilberjodid.

(*Deutoioduretum Hydrargyri, Hydr. iodatus ruber, Hydr. biiodatus, Ioduretum hydrargyricum; Doppelt-Jodquecksilber, rothes Jodquecksilber, Jodquecksilber in maximo.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, alkoholischer oder ätherischer Lösung, gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$, zweimal des Tages; äusserlich als Salbe, gr. viij—3j auf 3j.

Man vermeide das bei Hydrargyrus iodatus Angegebene. Geistige Lösungen schütze man gegen Licht und Wärme.

1909. R_y. Hydrargyr. periodati gr. xx
Alcohol. (36°) 3jß.

Solve. D. S. Täglich zweimal 10—20 Tropfen in einem Glase destillirten Wassers zu nehmen.

Anwend. Bei mit Skrofeln complicirter Syphilis.

Magendie. Biett.

1910. R_y. Hydrargyr. periodati ʒj
Aetheris sulphurici 3jß.

S. D. S. Täglich 2 mal 5—6 Tropfen zu nehmen.

Anwend. In denselben Fällen.

Magendie.

1911. R_y. Hydrargyr. iodati rubri gr. j
Roob juniperi gr. xij

Liquirit. pulv. q. s.
ut f. pil. viij. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 2, später 3—4 Stück.

Anwend. Gegen Komplikation veralteter Lustseuche mit Flechten.

Biett.

1912. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri in syrupi comm. pauxill. terendo bene distribuendi gr. v

Micae panis albi

Pulv. sacchari albi āā q. s.

F. pil. gr. ij No. lx. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 2 Stück, jedesmal eine Tasse Haferschleim nachzutrinken und allmählig zu steigen.

Anwend. Gegen Lupus.

Blasius.

1913. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri. gr. xij
Aquae destill. commun. ℥vj.

M. S. Wohlungeschüttelt, mittelst Lämpchen aufzulegen.

Anwend. Gegen Lupus und gewisse von diesem verschiedene phagedänische Geschwüre des Gesichts, welche besonders am obern Theile der Nase vorkommen.

Blasius.

NB. Diese Art der äusseren Anwendung ist unzweckmässig.

1914. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri gr. xv
Adipis suilli ℥ß.

M. exacte; f. unguentum.

S. Zum Verbande.

Anwend. In gleichen Fällen.

Blasius.

1915. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri gr. x
Axung. porci $\bar{3}$ vj.
M. exacte; f. unguentum.

S. Dünne auf Charpie zu streichen.

Anwend. Gegen veraltete, hartnäckige venerische Geschwüre.

Bielt.

1916. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri subtiliss. triti gr. vj
Axungiae porci $\bar{3}$ vj.
M. exactissime; f. unguentum.

S. Ganz dünn auf Charpie gestrichen aufzulegen.

Anwend. Bei wuchernden skrofulösen und syphilitischen Geschwüren.

Kopp.

1917. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri gr. xv
Axungiae $\bar{3}$ ij
Ol. bergamottae gutt. xx.
M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei chronischen Hautausschlägen, z. B. Lichen.

Bielt.

1918. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri subtiliss. pulv. gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$
Axungiae porci rec. $\bar{3}$ ij
Cerae albae gr. ij.
M. f. l. a. unguentum.

S. Augensalbe. Abends vor Schlafengehen dünn auf die geschlossene Augenliderspalte eine kleine Quantität zu streichen.

Anwend. Bei chronischer Augenliderdrüsenentzündung.

Kopp.

1919. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri gr. j
 Cerat. ophthalm. clin. ℥ij
 Olei amygdal. dulc. ℥j.

M. exactissime; f. unguentum.

S. Einer Linse gross mit einem Pinsel täglich einmal auf die getrübe Stelle zu tragen.

Anwend. Gegen torpide Hornhautflecke.

Berl. Klinik.

H. Hydrargyrus kalico-iodatus; Jodkali-Quecksilber.

(Ioduretum Hydrargyri et Potassii.)

Form u. Gabe. In Lösung, gr. j—ij auf ℥j, 10—30 Tropfen, 2—3mal.

Man vermeide Säuren, Schwefellebern, Seifen und mehrere Salze. Die Auflösung ist vor dem Lichte zu schützen.

1920. *Ry.* Hydrargyr. iodati rubri gr. iv
 Kalii iodati ℥j
 Aquae destillatae ℥j.

S. Dreimal des Tages 5 Tropfen und allmählig bis 10 zu steigen.

Oder:

1921. *Ry.* Hydrargyr. kalico-iodati gr. j
 Spirit. vini diluti ℥j.

S. Täglich 3mal 10 Tropfen.

Anwend. Wo Verminderung der stürmischen Herzthätigkeit, Steigerung der Absonderung der Lungen und Erleichterung des Hustens, Wiederherstellung der normalen Absonderung

im Verdauungskanale, Veränderung der Hautabsonderung und Temperatur, gesteigerte Absorption im Lymphsysteme beabsichtigt wird.

Will. Channing.

1. Hydrargyrus muriaticus corrosivus;
ätzendes, salzsaures Quecksilberoxyd.

(*Hydrargyr. sublimatus corrosivus, Hydrarg. oxydatus muriaticus, perchloratus, Hydrargyri Oxymurias, Bichloretum Hydrargyri; Quecksilbersublimat, Doppelchlorquecksilber, Quecksilberchlorid, Chlorquecksilber in maximo.*)

Form u. Gabe. In Auflösungen, Pillen, gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —1, täglich 1—2mal. Aeusserlich zu Mund- und Gurgel-, Augenwässern, gr. $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ auf $\overline{3j}$; Pinselsaft, Verband- und Waschwasser, gr. j — $iiij$ auf $\overline{3j}$; Klystier, gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$; Bad, $\overline{3j}$ — vj ; Salbe, $\mathfrak{z}\beta$ — $\overline{3j}$ auf $\overline{3j}$; Streupulver, sehr ätzend.

Man vermeide reine und kohlensaure Alkalien, Schwefelleber und schwefelwasserstoffhaltende Präparate, Seifen, Zucker, Honig, ätherische Oele, destillirte gewürzhafte Wässer, Phosphor. Wässerige Auflösungen schütze man vor dem Lichte. Stets verordne man nur auf kurze Zeit.

1922. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. vj .
Solve in
Aquae destill. q. s.
Adde
Micae panis albi pulv.

Sacchari albi pulv. āā q. s.
ut f. pil. CLXXX. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 5 Stück zu nehmen.

Hufeland's Sublimatpillen.

Anwend. Gegen veraltete Lustseuche.

Hufeland.

1923. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. xij.

Solve in

Aquae destill. q. s.

Adde

Micae panis albi pulv.

Sacchari albi pulv. āā q. s.

F. pil. CCXXX. Consp. lycopod.

S. Nach Vorschrift.

Dzondi's Sublimatpillen.

Anwend. Gegen Syphilis.

Einen Tag um den andern, unmittelbar nach dem Mittagessen das erstemal 4 Pillen, dann jedesmal 2 mehr zu nehmen, bis man auf 30 (gr. jß) gekommen ist. Treten krankhafte Erscheinungen, z. B. Erbrechen, Koliken u. s. w. hinzu, so beseitigt man diese durch einige Tropfen Opiumtinktur. Dabei führe der Kranke eine schmale Diät, esse sich nur halb satt, und unterhalte eine gelinde Hautausdünstung durch Sarsaparillen - Abkochung.

Dzondi.

1924. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. iij.

Solve in

Aether. sulphur. ʒj.

Solutis adde

Pulv. rad. althaeae ʒj.

Tere usque ad siccitatem et terendo admisce

Sacchari albiss. pulv. ʒß

Gummi mimos. pulv. ʒß.

F. c. aquae destill. q. s. pil. LX.

Consp. pulv. rad. althaeae. D. ad vitrum.

S. *Morgens und Abends eine Pille später allmählig steigend.*

Anwend. Gegen Syphilis.

Martens.

In dieser Formel ist das Doppelchlorquecksilber am wenigsten zersetzt.

1925. R_x. Hydrargyr. muriat. corros. ʒß.

Tere in mort. lapid. cum

Aquae destill. ferv. pauxillo.

Adde

Pulv. rad. althaeae

Sacchari albi pulv. āā ʒjß

Aquae destill. q. s.

ut f. pil. Lxxxx. Consp. pulv. althaeae. D. ad vitrum.

S. *Täglich zweimal ein Stück.*

Anwend. Gegen Syphilis.

J. Fr. Simon.

1926. R_x. Hydrargyr. muriat. corros. ʒß.

Solve in

Aquae destill. q. s.

Adde

Opii puri

Camphorae āā ʒß

Pulv. rad. liquirit.

Extr. rad. liquirit. āā ʒj.

M. f. pil. LX. Consp. lycop.

S. *Früh und Abends anfänglich eine Pille (mit ein paar Bissen Weissbrod).*

von Gräfe's Sublimatpillen.

Anwend. Gegen Syphilis.

v. Gräfe.

682 HYDRARGYRUS MURIATICUS CORROSIVUS.

1927. **Ry.** Hydrargyr. muriat. corros. gr. ij—iv
Ammon. muriat. dep. gr. v—xij.

Solve in

Aquae destill. q. s.

Adde

Extr. cort. aurant. $\mathfrak{z}$ ij

Pulv. cort. aurant. $\mathfrak{z}$ ij

(Camphorae $\mathfrak{z}\beta$ —j)

(Opium puriss. gr. j—iij).

M. f. pil. cxiv. Consp. pulv. cort. aurant.

S. *Früh 2—3, Nachmittags zweimal 3—4, Abends 4—5 Stück zu nehmen.*

Krause's Sublimatpillen.

Anwend. Gegen Syphilis.

Krause.

1928. **Ry.** Hydrargyr. muriat. corros. gr. iij

Aquae destill. q. s. ad solut.

Extr. quassiae

Succ. liquirit. $\bar{a}\bar{a}$ $\mathfrak{z}\beta$.

F. pil. xxx. Consp. lycop.

S. *Eine Stunde nach dem Mittagessen eine Pille und von 3—4 Tagen um 1 Stück zu steigen bis auf 5 Stück.*

Anwend. Gegen rheumatische, und rheumatisch-skrofulöse Hornhautentzündung.

Jüngken.

1929. **Ry.** Hydrargyr. muriat. corros. gr. $\frac{1}{8}$

Opium gummosi gr. $\frac{1}{3}$

Extr. guajaci q. s.

F. pil. ij—iij.

S. *Täglich, 40—50 Tage lang zu nehmen.*

Anwend. Gegen venerische Knochenschmerzen.

Dupuytren.

1930. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. ʒß.

Solve in aquae destill. q. s.

Adde

Pulv. opii puri gr. v

Micae panis albi ʒij

Succ. liquirit. dep. ʒiv.

M. f. pil. C.

D. S. Abends vor Schlafengehen eine Pille zu nehmen, kurz vorher aber jedesmal etwas Weissbrod zu geniessen.

Anwend. Gegen periodischen Stirnhöhlenschmerz. Man muss 5 Abende damit fortfahren.

Kluge.

1931. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. j.

Solve in

Aquae destill. ʒiv.

D. S. Morgens und Abends einen Esslöffel voll.

Anwend. In der Syphilis.

Schwartze.

1932. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. ij

Ammon. muriat. dep. gr. xv.

Solve in

Aquae destill. ʒviiij.

D. S. Täglich 2—3mal einen Esslöffel voll zu nehmen.

Anwend. In gleichen Fällen.

Schwartze.

684 HYDRARGYRUS MURIATICUS CORROSIVUS.

1933. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. vj.
Solve in
Spirit. frument. ℥j.

S. Einen Esslöffel voll Morgens und Abends in
einer Tasse Milch, Gerstentrank u. s. w. zu
nehmen.

‘Liquor mercurialis Swietenii.

Anwend. Gegen Lustseuche.

1934. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. iv.
Solve in
Aquae destill. ℥j.
Adde
Tinct. opii simpl. 3ß—j.

M. S. Morgens und Abends 30 Tropfen in einem
Esslöffel eines schleimigen Dekokts zu nehmen
u. dabei gleichzeitig eine Sarsaparillen-, Guajak-
und Klettenwurzel-Abkochung innerlich.

Anwend. Gegen sekundäre Syphilis.

J. A. Schmidt.

1935. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. j.
Ammon. muriat. dep. gr. ij
Amyli gr. xv
Extr. cicutae gr. vj
Aquae destill. ℥v
Syrup. cort. aurant. 3ß.

M. S. Früh und Abends einen Esslöffel voll zu
nehmen.

Anwend. Gegen veraltete Lustseuche.

Diese Solution wird 3–4mal wiederholt und jedesmal gr. j Su-
blimat mehr zugesetzt. Nach Verbrauch der ersten Solu-
tion, oder wenn Speichelfluss droht, früher, wird eine Sar-
saparillen-Abkochung dazu getrunken.

Eisenmann.

1936. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. ij
 Extr. stramonii gr. ij—iij
 Aquae destill. $\bar{3}$ jß.

S. S. *Aller 2 Stunden 30—50 Tropfen.*

Anwend. Gegen Neuralgien und Rheumatalgien, Prosopalgia rheumatica, Ischias postica.

Schlesier.

1937. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. ij
 Aquae destill. $\bar{3}$ jß
 Vini sem. colchici $\bar{3}$ ß.

S. S. *Aller 2 Stunden 30—40 Tropfen.*

Anwend. Gegen akute Gicht und syphilit. Knochenschmerzen mit gicht. Komplikation.

Lentin. Schneider. Burdach. Hacker.

1938. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. ij
 Aether. sulphur. $\bar{3}$ ij.

S. S. *Früh und Abends 10 Tropfen in einer Tasse lauwarmer Milch.*

Anwend. Gegen Amaurose.

La Fontaine.

1939. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. j.
 Solve in
 Aquae destill. $\bar{3}$ vj.
 Adde
 Tinct. opii crocat. $\bar{3}$ j
 Gumm. mimosae $\bar{3}$ ij.

M. D. S. *Morgens und Abends 1 Esslöffel.*

Anwend. In der Amaurose.

Langenbeck.

1940. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. j
Aquae rosarum. $\bar{\text{z}}\text{vj}$
Tinct. opii croc. $\bar{\text{z}}\beta$.

S. S. Augenwasser.

Aqua ophthalmica Conradi.

Anwend. Gegen leichte katarrhalische, skrofulöse Augenentzündungen.

1941. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. j
Aquae destill. simpl. $\bar{\text{z}}\text{iv}$.

S. S. Die Augenlider oft damit zu befeuchten.

Liquor ophthalmicus mercurialis Ph. paup.

Prag.

Anwend. Gegen Jucken der Lider.

Richter.

1942. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. β —j
Aquae rosarum $\bar{\text{z}}\text{iv}$
Mucilag. sem. cydonior. $\bar{\text{z}}\text{j}$
Laudan. liquid. Sydenh. $\bar{\text{z}}\text{j}$.

M. S. Augenwasser.

Anwend. Zu Anfange des zweiten Stadiums der idiopathischen Augenliderdrüsenentzündung.

Beer.

1943. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. iij
Aquae flor. rosis mar.
„ commun. $\bar{\text{a}}\bar{\text{a}}$ $\bar{\text{z}}\text{iiij}$.

M. S. Zum Einspritzen.

Anwend. Gegen Thränenfistel.

Beer.

1944. **Ry.** Hydrarg. muriat. corr. gr. j.

Solve in

Aquae rosarum

„ laurocerasi āā $\bar{\zeta}\beta$.

D. S. Zwei- bis dreimal täglich einige Tropfen in die Augen zu tröpfeln.

Anwend. Gegen torpide, chronische Entzündungen der Konjunktiva, und bei Nachkrankheiten der Augenblennorrhöen.

Jüngken.

1945. **Ry.** Hydrarg. muriat. corr. gr. j.

Solve in

Aquae destill. $\bar{\zeta}vj$.

Adde

Tinct. opii croc. $\ni\beta$.

D. S. Umgeschüttelt, Augewasser.

Anwend. In dem 2. Stadium der Augenentzündung Neugeborener.

Schön.

1946. **Ry.** Hydrarg. muriat. corr. gr. j.

Solve in

Aquae destill. $\bar{\zeta}iv$.

Adde

Tinct. opii croc. $\ni j$.

D. S. Umgeschüttelt zu Augenbähungen.

Anwend. Bei anfangender Katarakta und Ausschwitzungen der Iris.

Andreae.

1947. **Ry.** Hydrarg. muriat. corr. gr. j.

Solve in

Aquae flor. sambuc. $\bar{\zeta}iv$.

Solutionem mitte in vitrum, cui jam insunt

Aceti saturinini $\overline{3}\beta$

Tinct. opii simpl. $\overline{3}j$.

M. S. Augenwasser.

Anwend. Im dritten Stadium der contagiösen Augenentzündung, nach beseitigten Entzündungszufällen, zur Heilung der Schwäche und Schlaffheit des Sehorgans.

Rust.

1948. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. j

Aquae rosarum $\overline{3}j$

Tinct. galbani $\overline{3}j$.

S. S. Nachdem der Gehörgang durch Einspritzungen gereinigt ist, einige Tropfen in denselben zu giessen und ihn mit Baumwolle zu verschliessen.

Anwend. Bei specifischem Ohrenflusse.

Vogt.

1949. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. j—ij—iij.

Solve in

Aquae destill. $\overline{3}viij$.

Adde

Sacchari saturni $\overline{3}\beta$

Lact. sulphuris $\overline{3}j$.

M. S. Täglich 2mal die afficirten Theile zu waschen.

Anwend. Bei chronischen Hautauschlägen als Aqua cosmetica.

v. Hildenbrand.

1950. *Ry.* Stipit. dulcamar. $\overline{3}j$.

Ebulliant c. aquae destill. q. s. ad colat. $\overline{3}vj$,
in qua solve

Hydrarg. muriat. corr. gr. iv.

D. in vitro charta nigra obducto.

S. Umgeschüttelt, Abends das Gesicht vor Schlafengehen damit zu waschen.

Anwend. Gegen Porrigio larvata und andere Gesichtsaus-
schläge.

Ascherson.

1951. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. $\mathfrak{z}$ j
 Aquae destillat. $\mathfrak{q}$ j
 Pulv. rad. alcannae verae q. s.

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Bei nicht entzündlichen Flechten als Aqua rubra.

Hôp. St. Louis.

1952. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. iv.
 Solve in
 Decoct. cort. ulmi ($\mathfrak{z}$ j) $\mathfrak{z}$ viiij.
 Adde
 Tinct. opii croc. $\mathfrak{z}$ iiij.

D. S. Umgeschüttelt, täglich mehrmals die affi-
 cirten Partieen damit zu waschen.

Anwend. Gegen atonische syphilitische Geschwüre und hart-
 näckige syphilitische Hautleiden.

v. Gräfe. Löffler.

1953. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. iij.
 Solve in
 Aquae rosarum $\mathfrak{z}$ iiij.

D. S. Zweimal des Tages damit an den betreffen-
 den Stellen zu waschen.

Anwend. Gegen Filzläuse sehr bewährt.

Boerhaave. Tode.

1954. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. gr. ij.
 Solve in
 Aquae destillat. $\mathfrak{z}$ viiij.

D. S. Umgeschüttelt, nach dem Beischlafe die
 Geschlechtstheile damit zu waschen.

Anwend. Als Schutzmittel gegen syphilitische Ansteckung.

Hunter. Wedekind.

690 HYDRARGYRUS MURIATICUS CORROSIVUS.

1955. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. iij
Ammon. muriat. dep. ℥j.

Solve in

Aquae destillat. ℥v.

Adde

Tinct. opii croc. ℥j

Mucilag. gummi mimos.

Mellis despum. āā ℥β.

M. D. S. Umgeschüttelt, als Mund- und Gurgelwasser.

Anwend. Gegen syphilitische Mund- und Rachengeschwüre.

Biett.

1956. *Ry.* Cort. peruvian. reg. ℥β.

Coque ex

Aquae ℥xij ad colat. ℥vj

in qua solve

Hydrargyr. muriat. corros. gr. iv

Tinct. myrrhae

Mellis rosati āā ℥β.

M. S. Gurgelwasser.

Anwend. Gegen syphilitische Geschwüre.

Hennen.

1957. *Ry.* Hydrarg. muriat. corros. gr. ij

Decoct. flor. malvae (℥β) ℥v

Lact. vaccini ℥j.

S. S. Zum Gurgeln.

Anwend. Bei syphilitischer Bräune.

Richard.

1958. *Ry.* Hydrargyr. muriat. corros. gr. vj.

Solve in

Aquae destillat. ℥xv.

Adde

Vini opii comp. $\bar{3}\beta$.

M. D. in vitro charta nigra obd.

S. Umgeschüttelt, einzuspritzen.

Anwend. Bei syphilitischen Geschwüren der weiblichen Genitalien.

Hôp. des Vénér.

1959. R_y. Hydrarg. muriat. corr. gr. j β .

Solve in

Aquae destillat. $\bar{3}\text{ij}$.

Adde

Tinct. opii simpl. $\bar{3}\text{ij}$.

M. D. S. Umgeschüttelt, einzuspritzen.

Anwend. Bei syphilitischer Phimose zwischen Eichel und Vorhaut.

Rust.

1960. R_y. Hydrarg. muriat. corr. gr. vj

Extr. cort. peruvian. $\bar{3}\text{j}$

Aquae destillat. $\bar{3}\text{iv}$

Tinct. opii simpl. $\bar{3}\text{ij}$.

S. S. Zum Verbande.

Anwend. Bei atonischen syphilitischen Geschwüren.

Vogt.

1961. R_y. Hydrarg. muriat. corr. $\bar{3}\text{j}$

Ammon. muriat. dep. $\bar{3}\beta$

Spirit. vini rectific. $\bar{3}\text{iv}$.

S. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen örtliche chronische Rheumatismen.

Kopp.

1962. R_y. Hydrarg. muriat. corr. gr. xv—xx.

Solve in

Aquae destillat. $\bar{3}\text{j}$.

S. Umgeschüttelt, mehrmals täglich mit Kompressen überzuschlagen, bis die Stelle wund wird.

Anwend. Gegen verhärtete Bubonen.

Ricord.

1963. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr. gr. vj .
 Aquae calcariae ℥iv .
M. agitando.

D. S. Zum äusserlichen Gebrauch.

Aqua phagedaenica.

Anwend. Bei alten, syphilitischen, fressenden Geschwüren
 und Hautausschlägen.

1964. *Rx.* Sulphur. dep. ℥j
 Ammon. muriat. dep. ℥iiij .
 Coque cum
 Aquae calcar. ℥v ad ℥iiij .
 In colat. solve
 Hydrarg. muriat. corr. ℥β .

M. S. Zum Waschen der kranken Stellen.

Aqua antipsorica Clari.

Anwend. Gegen veraltete und hartnäckige Krätze, nach Ge-
 brauch der gewöhnlichen Einreibungen.

Clarus.

1965. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr. gr. $\frac{1}{6} - \frac{1}{3}$
 Aquae destillat. ℥j
 Mucilag. gummi mimos. ℥jβ
 Pulv. opii dep. gr. j .
M. Disp. tal. dos. ij .

S. Ein Glas voll erwärmt zum Klystier zu geben.

Anwend. Gegen Ruhren und chronische Durchfälle, welche
 dem Opium und andern gewöhnlichen Mitteln trotzten.

Kopp.

1966. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr. gr. $\frac{1}{5} - \frac{1}{4}$.
 Solve in colat. refriger.

Infusi sem. cinae (℥ij) ℥jß.

Adde

Mucilag. gummi mimos. ℥ij.

M. D. S. *Erwärmt und umgeschüttelt als Klystier.*

Anwend. Gegen Askariden, bei Kindern von 6—8 Jahren.

Kopp.

1967. R_x. Hydrarg. muriat. corr. ℥ij—viij
Aquae destillat. ℥j.

S. S. *Zum allgemeinen Bad zu giessen.*

Anwend. Gegen venerische Krankheitsformen, wenn man die Wirkung des Sublimats auf den Magen scheut.

1968. R_x. Hydrarg. muriat. corr. gr. iil.
Solve in
Spirit. vini rectificatiss. ℥j
Aquae destillat. ℥j.

S. *Auf 5—6 Fussbäder (in einem bis unter die Knöchel mit heissem Wasser gefüllten Steingutgefäss, durch Zugiessen von heissem Wasser immer auf 36° R. zu erhalten, 1/2 Stunde lang) zu vertheilen.*

Anwend. Als Antisymphiliticum. Besonders gegen syphilitische Augenentzündung, syphilit. Geschwüre und primitive Bubonen. — Offene Stellen dürfen nicht am Fusse vorhanden sein. Diese Fussbäder sollen die ganzen Sublimatbäder ersetzen.

Verducci.

1969. R_x. Hydrarg. muriat. corr. ℥j—℥ß
Ammon. muriat. dep. ℥jß—ij.
Solve in
Aquae destillat. ℥xij—xviij.

694 HYDRARGYRUS MURIATICUS CORROSIVUS.

Adde

Olei sabinae gutt. xij—xviij

antea in

Spirit. vini rectific. ℥iv —vj solutas.

D. S. Als örtliches Bad.

Anwend. Gegen örtliche Gicht.

Das selbe Bad kann, zugedeckt, 2—3mal des Tages aufgewärmt und angewendet werden.

Kopp.

1970. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr. ℥j — ℥β .

Solve in

Spirit. vini rectific. ℥j .

D. S. Umgeschüttelt, die betreffende Partie zu bestreichen.

Anwend. Zur Destruktion von Aftergewächsen.

Walther.

1971. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr. ℥j

Ferri sulphur. cryst. ℥ij .

Tere cum

Spirit. vini rectific. ℥iiij .

D. S. Umgeschüttelt, mit Charpie aufzulegen.

Anwend. Gegen syphilitische Kondylome, wenn diese der allgemeinen Behandlung nicht weichen.

Kluge.

1972. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr.

Camphorae $\overline{\text{aa}}$ gr. xij

Alumin. crudi

Plumbi acetic. $\overline{\text{aa}}$ ℥j .

M. terendo. Adde

Aceti concentr. ℥ij .

Solut. vitro immissae adde

Aether. sulphur. 3j.

M. S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Gegen das Wiederenstehen weggeschnittener oder viereckiger flacher Kondylome.

Plenk. Fricke.

1973. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr. 3j—ij

Camphorae 3j

Alcohol. 3ij.

S. S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Wie das vorige.

Freyberg. Berl. Charité.

1974. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr. gr. iij—iv.

Subtiliss. pulv. tere cum

Ungt. cetacei 3j

sensim addendo

Liqu. plumbi acetici gutt. xv.

M. S. Jeden zweiten bis dritten Tag soviel ein Nadelkopf beträgt in's Auge zu bringen.

Anwend. Gegen Augenentzündungen, wie G. Unguent. ophthalmicum magicum (s. No. 594).

Guthrie.

1975. *Rx.* Hydrarg. muriat. corr. 3j

Axungiae 3j.

Tere in mort. vitreo per iijL hor.

S. Zum äusseren Gebrauch.

Cirillo's Quecksilber-Salbe.

Anwend. Zum Verbinden alter syphilitischer Geschwüre; auch zum Einreiben in die vorher gebäheten Fusssohlen, 3j—ij, bei veralteter Syphilis, hartnäckigen Gichtleiden.

Cirillo.

1976. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr.
 Ammon. muriat. dep. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}\beta$
 Aquae rosarum $\bar{z}\text{iv}$.
 Solve, filtra et adde
 Adipis suilli $\bar{z}\text{iv}$.
 Conter. in mort. vitreo aquae ferventi imposito
 ad perfectam aquae evaporationem.

S. Salbe.

Hufeland's verbesserte Cirillo'sche Salbe.

Anwend. Gegen hartnäckige Gichtleiden und manche andere
 dyskrasische Krankheiten.

Hufeland.

1977. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. $\bar{z}\text{j}$
 Unguent. rosati $\bar{z}\text{j}$.
M. f. unguent.
S. *Erwachsenen stündlich, Kindern zweistündlich*
einen Theelöffel davon in die Herzgrube oder
auf das Brustbein einzureiben, bis sich Blasen
zeigen.

Anwend. Gegen hydropische Affektionen der Brusthöhle.

Romberg.

1978. *Ry.* Hydrarg. muriat. corr. $\bar{z}\text{ij}$
 Gumm. mimos. pulv.
 Aquae destill. $\bar{a}\bar{a}$ $\bar{z}\text{j}$.
M. f. unguent. spissum.

D. S. Zum Aetzen.

Unguentum corrosivum Graefii.

Anwend. Gegen fleischige, schwammige Auswüchse, krebs-
 hafte Geschwüre, Fisteln u. s. w. Auch zur Bildung künst-
 licher Geschwüre.

v. Gräfe. Jüngken.

K. Hydrargyrus muriaticus mitis; mildes salzsaures Quecksilberoxydul.

(*Hydrargyrus sublimatus dulcis, Hydr. oxydulatus muriaticus, Hydr. chloratus, Calomel, Mercurius dulcis, Chloretum s. Protochloretum Hydrargyri, Aquila alba, Panacea mercurialis; Quecksilberchlorür, versüßtes Quecksilber, Chlorquecksilber in minimo, Kalomel, milder Sublimat.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Trochisken, zu gr. $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{2}$ —j—x, 2—3 mal täglich. Aeusserlich zu Schnupfpulver, Augenpulver, Streupulver, Klystier, Salbe, gr. j—x auf 3j; Verbandwasser.

Man vermeide Salpetersäure, Blausäure, Salzbilder, reine und kohlen saure Alkalien und alkalische Erden, Schwefelmetalle, Seifen, Schwefelleber, Schwefelsäure, Salzsäure, salzsaure Salze, Schwefel, Phosphor.

1979. Rx. Hydrarg. muriat. mitis gr. ij
Sacchari albi ʒij.

M. f. pulv. Div. in iv part. aequal.

D. S. Täglich 2mal 1 Pulver zu nehmen.

1980. Rx. Hydrarg. muriat. mit. gr. iij
Pulv. rad. jalapae ʒj.

M. f. pulvis.

S. Auf einmal zu nehmen.

Anwend. Als kräftiges Abführmittel.

Consbruch.

1981. *Rx.* Hydrarg. muriat. mitis gr. iij
Amyli 3ß
Sacchari albi 3jß.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

D. S. Täglich 3mal 1 Pulver.

Anwend. Für syphilitische Säuglinge und Kinder.

Wendt.

1982. *Rx.* Hydrarg. muriat. mitis gr. $\frac{1}{12}$
Pulv. rad. ipecacuanh. gr. $\frac{1}{16}$
Sacchari albi 3ß.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

S. Früh und Abends 1 Pulver.

Anwend. Gegen Verdauungsbeschwerden, anhaltende Durchfälle, Koliken u. s. w. skrofulöser, atrophischer kleiner Kinder, wenn die Ursache nicht in gestörter Hautthätigkeit liegt.

Fricke.

1983. *Rx.* Hydrarg. muriat. mitis gr. iij
Herb. digital. purp. gr. iv
Sacchari albi 3ß.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Zweimal täglich 1 Pulver.

Anwend. Gegen chronischen Wasserkopf.

Berenda.

1984. *Rx.* Hydrarg. muriat. mitis
Sulphur. aurat. antim. āā gr. j
Pulv. conii macul. gr. viij.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. viij.

S. Täglich 2mal 1 Pulver.

Anwend. Gegen Augapfelwassersucht.

A. G. Richter.

1985. *Rx.* Hydrarg. muriat. mitis gr. iij
Opium puri gr. $\frac{1}{4}$
Herb. digital. purp. gr. j
Elaeosacch. foeniculi $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij. Dent. in charta
cerata.

S. Täglich 1—2 Pulver.

Anwend. Bei Augapfelwassersucht.

Rust.

1986. *Rx.* Hydrarg. muriat. mitis gr. x
Sacchari albi $\mathfrak{z}j$.
Tere exacte, adde
Iodii gr. β .
Tere per v minutas. F. pulv. Div. in x part.
aequal.

S. Aller 2 Stunden 1 Pulver.

Anwend. Gegen Hydrocephalus acutus und Croup.

Werneck.

1987. *Rx.* Hydrarg. muriat. mitis gr. vj
Pulv. extr. belladonnae gr. $j\beta$
„ sacchari albi $3j$.
M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Früh und Abends 1 Stück zu nehmen.

Anwend. In hartnäckigen Fällen von Iritis rheumatica.

Fischer.

1988. *Rx.* Hydrarg. muriat. mitis gr. ij
Herb. digital. purp. gr. j
Rad. jalapae $\mathfrak{z}\beta$.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. xij.

*S. Aller 3 Stunden 1 Pulver, bis wässerige Stühle
erfolgen.*

Anwend. Gegen Brustwassersucht.

Wolff.

1989. **Ry.** Hydrarg. muriat. mitis gr. xij
 Pulv. rad. scillae
 „ fol. digit. purp. āā gr. viij
 Opii puri gr. iv
 Elaeosacch. foeniculi ʒviij.
 M. f. pulv. Div. in viij part. aequal.
S. *Täglich 3—4 Pulver zu nehmen.*

Anwend. Beim Scharlach in der Abschuppungsperiode, wenn sich Symptome der Wassersucht zeigen.

Hufeland.

1990. **Ry.** Hydrarg. muriat. mitis gr. vj—xij
 Opii puri gr. ij—iv
 Sacchari albi ʒij.
 M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.
S. *Aller 2—4—6 Stunden 1 Pulver.*

Anwend. Gegen Leber- und andere akute Entzündungen.

Hamilton.

1991. **Ry.** Hydrarg. muriat. mitis
 Sulph. antim. aurat.
 Extr. aconiti āā gr. xij
 Sacchari albi ʒij.
 M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.
S. *Früh und Abends 1 Pulver zu nehmen.*

Anwend. Im chronischen Rheumatismus.

Richter.

1992. **Ry.** Hydrarg. muriat. mitis gr. ij
 Rad. zingiber. pulv. gr. v
 Kali tartarici ʒß—j
 Syrup. althaeae q. s. ut f. bolus.
 Dent. tal. vj.
S. *Vor Schlafengehen ein Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Hydrothorax.

Portal.

1993. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis gr. vj (ijj)
Fol. digital. purp. gr. xij (vj)
Roob sambuci q. s.
M. f. boli sex.

S. Aller 2 (3—4) Stunden 1 Stück.

Boli resolventes et deprimentes Brerae.

Anwend. Bei Verstopfung der Eingeweide mit entzündlichem Zustande derselben. (Mit Vorsicht zu gebrauchen!)

Brera.

1994. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis
Extr. aconiti āā 3j
Syrup. simpl. q. s.
F. pil. cxx. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 2 Stück, und allmählig mehr.

Anwend. In syphilitischen und arthritischen Affektionen.

Stoll.

1995. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis ʒj
Morphii acet. gr. ij
Extr. liquirit. q. s.
F. pil. xxxij. Consp. irid. flor.

S. Morgens und Abends 3—4 Stück.

Anwend. Gegen sehr schmerzhaftes Hodenentzündung.

Richter.

1996. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis ʒß
Sulphur. antimon. aurat. ʒj
Extr. conii macul.
„ calendulae āā 3ij.
M. f. pil. gr. ij. Consp. cinnamom.

S. Täglich 3mal 5 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen chronische Verhärtungen.

(Diese Masse verlangt Zusatz von 3j—ij Pflanzenpulver.)

Rust.

1997. *R.* Hydrarg. muriat. mitis
 Sulph. stibiat. aurant. āā 3j.
 Terant. per iij circ. horas, adde
 Extr. liquirit. ʒij.
 M. f. pil. ij. Consp. liquirit.

S. Früh und Abends 2 Stück zu nehmen.

Pilulae alterantes Plummeri.

Anwend. Als umstimmendes Mittel in chronischen Ausschlägen, Gicht, Anschwellungen und Verhärtungen drüsiger Organe u. s. w.

Zuweilen verbindet man Extr. conii macul. oder ein ähnliches Mittel damit.

1998. *R.* Hydrarg. muriat. mitis gr. vj
 Extr. conii macul. ʒß
 „ hyoscyami ʒj
 Pulv. rad. rhei 3ß.
 M. f. pil. xxx. Consp. lycop. D. ad vitrum.

S. Aller 3 Stunden 1 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei Stockungen und beginnender Destruktion der Unterleibseingeweide, wenn dieselben mit chronischer Entzündung im Zusammenhange stehen, so wie bei Stockungen in dem Fruchthaler und davon herrührender übermäßiger Menstruation, bei Verhärtungen dieses Organes und der Leber.

Bei Neigung zu Speichelfluss lässt man das Kalomel Anfangs weg.

Diese Pillen rühren wahrscheinlich von H. Meyer in Berlin her.

Thaer.

1999. *R.* Hydrarg. muriat. mitis ʒj
 Sapon. jalapini 3j.

M. f. pil. XL. Consp. lycop.

S. *Täglich 2—3mal 3—4 Stück.*

Pilulae purgantes.

Anwend. Starke Abführung, wo man die Absicht hat, die Aufsaugung und Absonderung zu bethätigen und Umänderung in der Stoffherzeugung herbeizuführen.

2000. *Ry.* Hydrargyr. muriat. mitis
Sulphur. antim. aurat. āā gr. XLV
Pulv. herb. digital. purp. 3ß
Gumm. ammoniaci 3ß
Extr. dulcamarae 3ij.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. *Täglich 3—4mal 6—12 Stück zu nehmen.*

Anwend. Gegen Brustwassersucht.

Dabei lässt man einen Aufguss von Senega oder Kalmaus gebrauchen.

Fr. Jahn.

2001. *Ry.* Hydrargyr. muriat. mit. gr. iv
Aloes succotr. gr. ij
Sacchari albissimi 3ij.
M. f. pulv. subtiliss.

S. *In die Augen zu blasen oder mit einem Pinsel aufzutragen.*

Anwend. Gegen Verdunkelungen und Flecke der Hornhaut.

Boerhaave. Richter.

2002. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis
Sacchari albi āā 3ß
Opii puri 3ß.
M. f. pulv. alcohol.

S. *Zweimal täglich mit einem trocknen Pinsel in's Auge zu tupfen.*

Anwend. Bei chronischen, reizlosen Hornhauttrübungen.

Jüngken.

2003. *Rx.* Hydrargyr. muriat. mitis
Gumm. mimos. āā 3j.
M. f. pulvis.

S. Zum Aufstreuen 2—3mal täglich.

Anwend. Gegen Nabelschwamm Neugeborener.

Arming.

2004. *Rx.* Hydrargyr. muriat. mit.
Extr. opii āā gr. ij—iv.
M. f. pulv. subtiliss. D. tales dos. vj ad char-
tam ceratam.

S. Vor Schlafengehen ein Stück mit Speichel in
die Augenbrauengegend einzureiben.

Anwend. Bei syphilitischen und arthritischen Augenschmerzen.

Rust.

2005. *Rx.* Hydrargyr. muriat. mitis ʒß
Sacchari albi 3ij.
M. f. pulv.

D. S. Schuupfpulver.

Anwend. Gegen beginnende Polypenbildung in der Nase.

Weinhold.

2006. *Rx.* Hydrargyr. muriat. mitis ʒj
 " oxydat. rubri ʒß
Sacchari crystallis. 3ß.
M. f. pulv. subtiliss. D. in vitro.

S. Täglich 3—6mal eine Prise.

Anwend. Bei Ozaena nasalis und chronischem Schnupfen.

Trousseau.

2007. Rx. Hydrarg. muriat. mit. $\text{3}\beta$
Opium puri 3ij
Aquae calcis 3ij .

M. S. *Umgeschüttelt, zum Befeuchten der Charpie.*

Aqua phagedaenica nigra Rustii.

Anwend. Bei primären syphilitischen Geschwüren, Phimose.

Rust.

2008. Rx. Hydrarg. muriat. mit. 3ij
Tinct. myrrhae $\text{3}\beta$
Laudan. liquid. Sydenh.
Decoct. chinae concentr. $\text{aa } \text{3j}$.
M. terendo.

D. S. *Umgeschüttelt, zum Befeuchten der Charpie.*

Aqua mercurialis balsamica Plenckii.

Anwend. Bei schmerzlosen venerischen Geschwüren, um vermehrte Reaktion hervorzurufen.

Plenk.

2009. Rx. Hydrarg. muriat. mit. gr. j—vj
Gummi mimos. pulv. $\text{3}\beta$
Aquae valerianae $\text{3j}\beta$.
M. exacte.

S. *Zum Klystier.*

Anwend. Bei krampfhaften schmerzenden Hämorrhoidalbeschwerden im Mastdarme, Verdickung desselben; auch bei Askariden. Man lässt das Glas in warmes Wasser setzen und, wenn der Inhalt lau ist, umschütteln und in die Spritze giessen.

Kopp.

2010. Rx. Hydrarg. muriat. mit.
Aloes aa gr. ij
Tutiae praep. 3j

Butyr. rec. insuls. $\text{℥}\beta$.
M. f. unguentum.

S. *Täglich dreimal einer kleinen Erbse gross in's Auge zu bringen.*

Anwend. Gegen chronische skrofulöse Augenentzündung.

Scarpa.

2011. R_y. Hydrarg. muriat. mit.
Cerati simpl. $\overline{\text{aa}}$ part. aequal.

M. S. $\text{℥j}—\text{ij}$ auf den Leib einzureiben.

Anwend. Bei manchen Anschwellungen der Leber.

Hôp. de la Charit. Par.

2012. R_y. Hydrarg. muriat. mit.
Scillae pulv. $\overline{\text{aa}}$ ℥ij
Axungiae ℥j .
M. f. unguentum.

S. *Täglich zweimal $\text{℥j}—\text{ij}$ einzureiben.*

Unguentum resovens.

Anwend. Bei chronischen Anschwellungen der Gelenke.

Hôtel-Dieu Par.

2013. R_y. Hydrarg. muriat. mit. $\text{℥}\beta$
Unguent. cerei ℥j
Olei tanaceti gutt. ix.
M. f. unguentum.

S. *Salbe.*

Anwend. Gegen heftiges Jucken von Askariden Abends etwas von der Salbe in den Mastdarm zu streichen.

Kopp.

2014. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis ʒj
 Flor. sulphuris ʒij
 Axung. depur. ʒj.
 M. f. unguentum.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Flechten.

Fouquier.

2015. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis ʒijß
 Carbonis praep. ʒj
 Adipis suilli ʒiij.
 M. f. unguentum.

S. Früh und Abends die kranken Stellen zu bestreichen.

Anwend. Gegen Kopfgrind. Zuvor werden die kranken Stellen mit einem warmen weinigen Chinaaufguss gewaschen.

Bielt.

2016. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis ʒj
 Olei succini rectific.
 „ galbani aa ʒß
 Adipis suilli ʒß.
 M. f. unguentum.

D. S. Zum Einreiben auf der schmerzhaften Stelle und auf dem Proc. mastoideus.

Anwend. Bei Prosopalgie.

Stark.

2017. *Ry.* Hydrarg. muriat. mitis ʒß
 Opii pulv. ʒß
 Adipis suilli ʒß.
 M. f. unguentum.

D. S. Aller 1 — 2 Stunden einer Bohne gross in die vordere Fläche des Halses sanft einzureiben.

Anwend. Bei Croup.

Krüger - Hansen.

2018. R_y. Hydrarg. muriat. mitis
 Pulv. conii maculat.
 Zinci oxydat. albi
 Plumbi acetic. āā 3jß
 Mellis rosati q. s.
 F. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen fressende Bubonen. Ohne Honig auch als Streupulver zu benutzen.

Tode.

L. Hydrargyri nitrici oxydati liquor;
 salpetersaure Quecksilberoxydflüssigkeit.

(*Mercurius nitrosus, Liquor Nitratis hydrargy-
 rici. Anstatt des Liquor Bellostii und der
 Aqua grisea.*)

Form u. Gabe. Selten innerlich, mit destillirtem Wasser 1—3 Tropfen, 1—2mal. Einspritzung, Waschwasser, Aetzmittel.

Man vermeide Säuren, reine und kohlens. Alkalien, salzs., schwefels., phosphors., bernsteins., boraxs., essigs. Salze, Seifen, Schwefellebern, Gerbestoff.

2019. R_y. Liqu. hydragyr. nitrici gutt. xxiv
 Aquae rubi idaei 3j.

M. D. S. Täglich 2mal 20—60 Tropfen.

Anwend. Bei eingewurzelten, sekundären syphilitischen Knochenleiden.

Hecker.

2020. *Rx.* Liqu. hydrarg. nitrici gutt. xv
Aquae destillat. ℞j.

M. S. Zum Waschen.

Anwend. Gegen Jucken der weiblichen Geschlechtstheile.

Wendt.

M. Hydrargyri nitrici oxydulati liquor;
salpetersaure Quecksilberoxydulflüssigkeit.

(Liquor Nitratis hydrargyrosi.)

Form u. Gabe. Mit destillirtem Wasser 1—5
Tropfen, 1—2mal. Aeusserlich zu Einspritzungen, Wa-
schungen, Verbandwässern.

Dieselben Verbindungen wie bei dem vorigen zu ver-
meiden.

2021. *Rx.* Liqu. hydrarg. nitrici oxydulat. gutt. xx
Aquae cinnamom. s. v. ℞j.

S. Früh und Abends 40 Tropfen.

Anwend. Gegen alte venerische Knochenschmerzen und Ge-
schwüre. Man lässt täglich um 2 Tropfen steigen. Dabei
Holztränke.

**Selle. J. D. W. Sachse. Charité
zu Berlin.**

Unguentum Hydrargyri nitrati; gelbe
Quecksilbersalbe.

(*Unguentum Hydrargyri citrinum, Balsamum
mercuriale.*)

2022. Ry. Unguent. citrini 3ij
Cerati cetacei 3jß
Olei olivarum ʒj.
M. f. unguentum.

S. *Täglich zweimal den Gehörgang damit einzu-
streichen.*

Anwend. Gegen Taubheit von verminderter Absonderung des
Ohrenschmalzes.

H. Earle.

2023. Ry. Unguent. citrini 3ij
„ saturnini 3vj.
M. f. unguentum.

S. *Zum Einreiben.*

Anwend. Bei Tinea favosa.

Armstrong.

2024. Ry. Unguent. citrini
„ cetacei āā 3ß.
M. f. unguentum.

S. *Zum Einreiben.*

Anwend. Gegen Prurigo und Sycosis.

Rayer.

N. Hydrargyrus oxydatus; Quecksilberoxyd.

(*Mercurius praecipitatus ruber; rothes
Quecksilberpräcipitat.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, gr. $\frac{1}{8}$ —1,
2—3 mal täglich. Aeusserlich Pulver als Aetzmittel,
Augensalbe und Salbe, gr. j—vj auf 3j.

Man vermeide alle Verbindungen mit mineralischen
Mitteln.

2025. *Ry.* Hydrarg. oxydat. rubri gr. ij
Stibii sulphurati nigri ℥viij.
M. f. pulv. Div. in xvj part. aequal.

D. S. Täglich 2 Stück zu nehmen.

Anwend. Bei inveterirter Syphilis mit Skrofelsucht, beson-
ders auch bei syphilitischem Knochenfrass.

(Berg, dessen Formel unter No. 513 angegeben wurde,
setzte bei jeder Wiederholung gr. ij rothen Präcipitat hinzu,
bis er auf gr. xvj gekommen war.)

Horn. Wendt.

2026. *Ry.* Hydrarg. oxydat. rubri ℥j
Extr. liquirit. 3ij
Pulv. rad. liquirit. q. s.
ut f. pil. clx. Consp. lycop.

D. S. Drei Tage hindurch jedesmal $\frac{1}{2}$ Stunde
nach dem Mittagessen 1 Pille, dann 3 Tage
lang jedesmal 2 u. s. w., bis gr. jß, höchstens
gr. ij Präcipitat pro dosi genommen werden.
Mit diesen Gaben wird so lange fortgefahren,
bis Magen- oder Mund-Beschwerden das Aus-

setzen der Pillen gebieten, oder die Krankheits-symptome verschwinden. Im ersteren Falle giebt man nach Beseitigung jener Beschwerden das Mittel zuerst wieder in geringeren Dosen von neuem; im letzteren fällt man mit der Menge der Pillen in derselben Art, wie man gestiegen ist.

Anwend. Bei hartnäckiger Syphilis, wo eine schwache Brust die Anwendung des Sublimats verbietet.

Berl. Charité.

2027. *Ry.* Hydrarg. oxyd. rubri gr. ij—iij
Pulv. opii puri gr. iv—vj
Sacchari lactis ʒiij.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Täglich 3mal ein Pulver.

Anwend. Gegen tiefwurzelnde, sekundäre Syphilis.

Wendt.

2028. *Ry.* Hydrarg. oxydat. rubri gr. iv
Antimon. crudi ʒβ
Extr. chaerophyll. sylv. ʒiij
Sacchari albi aqu. solut. q. s.
F. pil. cl. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 6 Stück zu nehmen und täglich 2mal um eine Pille zu steigen bis auf 9.

Pilulae mercuriales Ritteri.

Anwend. Gegen Lustseuche, besonders syphilitische Exantheme, in Verbindung mit der Schwitzkur sehr gelobt von

Eisenmann.

2029. *Ry.* Hydrarg. oxydat. rubri gr. iij—v
Morphii acetic. gr. j

Pulv. rad. althaeae q. s.
F. c. aquae destill. gutt. aliqu. pil. xx. Consp.
lycop.

S. *Eine Stunde nach dem Frühstück und vor Schlafengehen eine Pille.*

Anwend. Gegen Syphilis. — Bei skrofulösen Subjekten und alter Syphilis setzt Pitschaft Extr. conii macul. gr. j und eben so viel Zinnober hinzu.

Pitschaft.

2030. R_y. Hydrarg. oxydat. rubri ʒj
Succi liquirit.
Pulv. rad. liquirit. āā q. s.
ut f. pil. gr. ij No. cccc. Consp. lycop.

S. *Morgens und Abends 2 Stück und aller 3 Tage früh und Abends ein Stück mehr bis zu 20 Pillen p. d.*

Anwend. Gegen alle Formen der primären und sekundären Syphilis in Verbindung mit Holztrank in der chirurg. Poliklinik zu Leipzig mit Erfolg angewendet.

Walther.

2031. R_y. Hydrarg. oxydat. rubri gr. v
Extr. conii macul. v. aconiti ʒj
Pulv. rad. althaeae q. s.
F. pil. lx. Consp. althaea. D.

S. *Aller 2 Stunden 1 — 2 Stück und mehr zu nehmen.*

Anwend. Gegen veraltete, festsitzende Syphilis. Daneben ein stark gesättigtes Sarsaparillendekokt und schmale Diät. Der Kranke soll während der Kur das Zimmer hüten.

Kopp.

2032. Ry. Hydrarg. oxydat. rubri

Boli armenae āā 3β

Sacchari albi 3j.

M. f. pulv. subtiliss.

S. *Täglich einmal, so viel ein Wickenkorn beträgt, zwischen die Augenlider zu blasen.*

Anwend. Gegen Augenfell.

Benedict.

2033. Ry. Hydrarg. oxydat. rubri 3β

Aluminis usti 3j.

M. f. pulvis.

D. S. *Zum Aufstreuen.*

Anwend. Gegen wildes Fleisch in Wunden und Geschwüren.

Plenk.

2034. Ry. Hydrarg. oxydat. rubri gr. j

Axung. porci ʒij—iv.

M. exactiss.; f. unguentum.

S. *Eines Stecknadelkopfes gross zwischen die Lider zu streichen.*

Anwend. Gegen chronische katarrhalische Augenentzündung, chronische Schleimflüsse der Lider, Hornhautflecke, Augensidräude u. s. w.

Radius.

2035. Ry. Hydrarg. oxydat. rubri gr. iv—v

Butyr. rec. insulsi 3ij.

M. f. unguentum.

S. *Augensalbe. Täglich 3mal auf die Augenlider anzuwenden.*

Anwend. Gegen Anschwellung und abnorme Absonderung der Bindehaut.

J. A. Schmidt.

2036. *Rx.* Hydrargyr. oxydat. rubri gr. xv
Cupri sulphur. cryst. gr. iv
Camphor. olei ovor. subact. gr. vj
Olei cacao $\mathfrak{3ij}$.

M. exactiss. *F.* unguent.

S. Augensalbe.

Anwend. Gegen chronische Augenlidentzündung.

Beer.

2037. *Rx.* Hydrargyr. oxydat. rubri gr. viij—xvj
Aeruginis cryst. gr. iv—vj
Butyr. rec. insulsi $\mathfrak{3\beta}$.

M. f. ungnent.

S. Augensalbe.

Anwend. Gegen gleiche Leiden.

Benedict.

2038. *Rx.* Hydrargyr. oxydat. rubri gr. vj
Butyr. rec. insulsi $\mathfrak{3ij}$
Aceti plumbici
Tinct. opii crocatae $\overline{aa}$ $\mathfrak{3\beta}$.

M. exactiss. donec omnis humiditas disparuerit.

D. S. Abends oder früh und Abends einer Linse gross in's Auge zu bringen.

Anwend. Bei Lippitudo, Psorophthalmia, Ophthalmia angularis und im 2. Stadium fast aller Ophthalmieen, besonders katarrhalischer und skrofulöser; desgleichen nach Ophthalmio- und Blepharophthalmo-Blepnorrhöen, bei Geschwüren der Augenlider, der Conjunktiva und Hornhaut.

Rust.

2039. *Rx.* Hydrargyr. oxydat. rubri gr. vj—viij
Opii pulver. gr. iv—vj.

Tere cum aquae destill. paux. in pultem, adde

Unguent. rosati 3ij.

M. exactiss.

D. S. Täglich 1—2mal, Nachmittags und Abends vorm Schlafengehen, einer kleinen Erbse gross auf die Augenlidränder oder die innere Fläche der Augenlider zu bringen.

Jüngken.

Fischer bedient sich bei skrofulöser Augenliderdrüsen-entzündung einer ohngefähr halb so starken Salbe.

2040. *Rx.* Cerae albae 3ß.

Leni calore liquefact. admisce

Adipis suilli 3jß

et tandem

Hydrargyr. oxydat. rubri

Plumbi acetici dep. pulv. āā gr. viij

Extr. opii pulv. gr. iv

antea cum paux. aquae destill. in pulvem trita.

M. exacte.

D. S. Augensalbe.

Anwend. In skrofulösen Augenentzündungen, bei Trübung der Hornhaut.

Andreae.

2041. *Rx.* Cerae albae gr. xv

Adipis suilli 3jß.

Liquefact. et refriger. adde

Hydrargyr. oxydat. rubri gr. vijß

Zinci oxydati gr. iv

Camphor. pulv. gr. iij

Olei ovorum gr. ij.

M. exactiss.

D. S. Augensalbe.

Unguentum s. Balsamum ophthalmicum St.

Yvesii.

Anwend. Gegen Psorophthalmie, chronische Ophthalmieen, Flecken und Geschwüre der Hornhaut u. s. w.

2042. *Rx.* Olei cacao
Adipis suilli āā 3j.
Leni igne liquatis et refriger. admisce
Hydrargyr. oxydat. rubri ʒj.
M. f. unguent.

D. S. Um die Orbita herum einzureiben.

Unguentum ophthalmicum Richteri.

Anwend. Bei chronischen Ophthalmieen.

Richter.

2043. *Rx.* Hydrargyr. oxydat. rubri 3ij
Unguent. saturnini 3j.
M. f. unguent.

D. S. Salbe.

Anwend. Gegen skrofulöse Geschwüre.

Rust.

2044. *Rx.* Hydrargyr. oxydat. rubri 3j—ij
Pulv. herb. sabinae ʒj
Unguent. basiliconis 3j.
M. f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen inveterirte kallöse Fussgeschwüre.

Tott.

O. Hydrargyrus oxydulatus trituratione paratus; Quecksilberoxydul durch Reiben.

(*Hydrargyr. cinereus Moscati; graues Quecksilberoxydul.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Lattwerge (unzeckmässig), gr. β — ij , 2—4mal täglich. Aeusserlich als Salbe, Pflaster.

Man vermeide Säuren, saure Salze, Salzbilder, Alkalien, Schwefellebern, Wärme, Sonnenlicht.

2045. *Ry.* Hydrargyr. dep. 3j
Mucilag. gumm. mimos.
Syrup. simpl. āā 3ij .
M. terendo ad extinct. hydrargyr.

S. Mercurius gummosus Plenkii.

2046. *Ry.* Hydrargyr. depur. 3j
Gumm. mimos. 3ij .
Tere cum paux. aquae destill. ad extinct. hydrarg. Adde
Extr. conii macul. 3j
Pulv. rad. liquirit. q. s.
F. pil. gr. ij . Consp. liquirit.

S. Früh und Abends 6—10 Stück.

Anwend. Gegen Syphilis.

Plenk.

2047. *Ry.* Hydrargyr. depur.
Mannae elect. āā 3ij .
Tere donec metallum subactum sit. Adde

Pulv. rad. liquirit. q. s.
F. pil. cxliv. Consp. lycop.

S. *Täglich 5—6 Stück.*

Pilulae mercuriales anglicae.

Oder:

2048. *Ry.* Hydrargyr. dep. ʒij.

Tere cum conserv. rosar. gall. ʒiij donec globuli
dispar.; dein adject.

Rad. liquirit. ʒj

omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

M. f. pil. gr. iij. Consp. lycop.

S. *Früh und Abends 1—4 Stück.*

Pilulae hydrargyri Ph. Lond. et Dublin.

Blaue Pillen (Blue pills) der Engländer.

Anwend. Gegen Lustseuche, verschiedene Hautkrankheiten,
Verstopfung der Unterleibsorgane und Drüsen, als Purgir-
mittel gegen Gelbsuchten, Wassersuchten.

2049. *Ry.* Hydrarg. dep.

Adipis suilli āā gr. xxxvj.

Tere in mort. lapid. ad perfect. hydrarg. extinct.;
tunc adde

Saponis med. pulv. gr. xxxxviij

Amyli q. s.

ut f. pil. Lxxij. Consp. lycop.

D. S. *Täglich 2—3mal 1—12 Stück.*

Pilulae de Sédillot.

Anwend. Gegen Syphilis.

2050. *Ry.* Hydrargyr. ciner. gr. j—iv

Extr. gentianae ʒj.

M. f. l. a. boli iij.

D. S. *Täglich zu verbrauchen.*

Anwend. Bei Syphilis, wenn die Kranken einen sehr schwa-
chen Magen haben.

Brera.

2051. *Ry.* Unguent. cinerei
 Pulv. rad. sarsaparillae āā gr. l.
 M. f. pil. l. Consp. lycop.
D. S. Morgens und Abends Anfangs 1 Pille,
 nach und nach bis auf 4 Pillen zu steigen.
Anwend. Bei Syphiliden.

Biett. Cazenave.

2052. *Ry.* Hydrarg. gumm. Plenckii ʒβ.
 Coque cum
 Lactis vaccini ʒj.
S. Mit Kompressen auf das Auge zu legen.
Anwend. Gegen gonorrhoeische Augenentzündung; als Augen-
 bad gegen syphilitische Augenentzündung.

Plenk. Beer.

2053. *Ry.* Hydrarg. pur. ʒvj
 Sevi ovilli ʒβ.
 Conter. in mort. lapid. ad extinct. hydrarg. Adde
 Olei cacao ʒj.
 Form. tabulae.
 Unguentum hydrargyri cinereum Wendtii pro
 infantibus.

2054. *Ry.* Unguent. hydrarg. ciner. ʒij
 Opii puri gr. xij—ʒj.
 M. exacte.
S. Aller 2 Stunden einer Erbse gross um das
 Auge herum einzureiben.

In Fällen von verengerter Pupille setzt Benedict noch
 Extr. hyoscyami gr. xij—xx zu.

Anwend. Bei Photophobie, syphilitischen und anderen schmerz-
 haften Augenentzündungen; gegen gichtische und syphilitische
 Knochenschmerzen in der Augenhöhle und um dieselbe.

Benedict. v. Gräfe.

2055. *Ry.* Ungt. hydrarg. ciner. ʒij
 Ammon. carbon. ʒβ—j
 Laudan. liquid. ʒj.

M. S. Zwei - bis dreimal täglich in die Augenbrauen einzureiben.

Anwend. Gegen Chorioiditis neben antiskorischer Heilmethode.

Dzondi.

2056. *Ry.* Unguent. ciner. ʒj—ʒij.

D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Syphilis.

Rust's Schmier- und Hungerkur oder Einreibungs- und Entziehungskur besteht in Folgendem:

1) Vorbereitungskur. Ein leichtes Abführmittel entweder aus Rad. jalap. und Tart. dep. oder aus Inf. sennae comp. und natrum sulphur.; vom folgenden Tage an täglich ein laues Bad, worin der Kranke eine Stunde verweilt. Während dieser Zeit schmale Diät, diaphoretisches Getränk und Verhalten, Aufenthalt im Zimmer. Am 14. Tage wieder ein ähnliches Abführmittel. — 2) Hauptkur. Vom 15. Tage an Einreibungen von ʒj—jβ—ij; am 1., 10. und 18. Tage in die Unterschenkel; am 3., 12. und 20. Tage in die Oberschenkel; am 6., 14. u. 22. Tage in die Arme; am 8., 16. u. 24. Tage in den Rücken. Die 7 ersten Einreibungen des Morgens, die 5 letzten spät Abends. Am 17., 19., 21., 23. u. 25. Tage Morgens ein Abführmittel. (Umstände machen zuweilen Abänderungen in dieser Anordnung erforderlich, z. B. zu starker Speichelfluss, oder andere bedenkliche Zufälle, zuweilen sogar das völlige Abbrechen der Kur.) Dabei äusserst schmale Diät, steter Aufenthalt im Bette bei einer Zimmertemperatur von 16—17° R.; die Wäsche darf in dieser Zeit nicht gewechselt werden. Am 26. Tage ein reinigendes Bad, Wechsel der Wäsche und des Zimmers. — 3) Nachkur. Der Kranke darf bei nasser und kalter Witterung das Zimmer vor der 2.—3.

Woche nicht verlassen, muss 14 Tage lang eine leichte Kost führen und alle Funktionen des Körpers in Ordnung erhalten.

2057. *Ry.* Unguent. hydrarg. ciner. $\mathfrak{z}\text{vj}$
 Calcis hydrat. $\mathfrak{z}\text{j}$
 Ammon. muriat. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 Sulphur. depur. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Quaevs harum subst. unguent. merc. separatim admiscenda est trituratione. Ne nimis cito siccum fiat, paux. olei oliv. addere licet.

Anwend. Gegen Syphilis.

Man lässt $\mathfrak{z}\text{j}$, später $\mathfrak{z}\text{ij}$ — ijj abwechselnd in die Unter- oder Oberschenkel einreiben. Es sind 30—40 Einreibungen nöthig. Es machte nie (in Toulon) Speichelfluss.

Reynaud.

2058. *Ry.* Unguent. hydrarg. ciner. $\mathfrak{z}\text{j}$
 „ juniperi $\mathfrak{z}\text{ijj}$.
 M. f. unguent.

S. Zweimal täglich so viel als eine Haselnuss gross ist in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Gegen Bauchwassersucht.

v. Hildenbrand.

2059. *Ry.* Unguent. hydrargyr. ciner. fort. part. xlviij
 Ammon. muriat. part. ijj .
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Zur Zertheilung von Drüsengeschwülsten.

Dupuytren.

2060. *Ry.* Unguent. hydrarg. ciner. $\bar{3}\beta$
 Sapon. domest. $\bar{3}ij$
 Camphorae $\bar{3}\beta$.
 M. f. unguent.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Drüsengeschwülste.

Schreger.

2061. *Ry.* Unguent. hydrarg. ciner. $\bar{3}ij$
 Iodii $\bar{3}iiij$.
 M. f. unguent.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Eierstockwassersucht.

Jahn.

2062. *Ry.* Unguent. hydrarg. ciner. $\bar{3}\beta$
 Kali hydroiodici gr. xij—xx.
 M. exactiss.; f. unguent.

S. Zum äussern Gebrauch.

Anwend. Gegen chronisches Eczema, Ichthyosis, Lupus;
 ausserdem ein starkes Auflösungsmittel bei Verhärtungen
 Entartungen u. s. w.

Blasius.

2063. *Ry.* Unguent. hydrarg. ciner.
 Ammoniac. liquid. $\bar{aa}$ $\bar{3}j$
 Olei olivar. $\bar{3}j$.
 M. f. liniment.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen torpide venerische Bubonen

Ratier.

2064. Rx. Unguent. hydrarg. ciner. ℥iv
 Olei amygd. dulc. ℥ij
 Laudan. liquid. ℥j.
 M. exacte.

S. • Zum Einreiben.

Anwend. Gegen schmerzhaftes Eichelgeschwür.

Ratier.

2065. Rx. Camphorae ℥ij
 Unguent. hydrarg. ciner. ℥β
 Lactis calidi ℥iij
 Micae panis albi q. s.
 M. f. cataplasma.

S. Warm über die Geschlechtstheile zu legen.

Anwend. Gegen Tripper.

Swediaur.

2066. Rx. Unguent. hydrarg. ciner. ℥β
 Liniment. volatil. ℥ij.
 M. f. liniment.

D. S. Zum Einreiben.

Anwend. Bei entzündlich-rheumatischen Affektionen der Gelenke, der Pleura u. s. w., nachdem die Entzündung durch Blutentziehung zum grössten Theil beseitigt worden.

Wallher.

2067. Rx. Emplastr. hydrarg. ciner. ℥j
 Opii crudi
 Camphorae āā ℥β.
 Malax.; f. emplastr.

S. Pflaster.

Anwend. Gegen entzündliche und chronische Verhärtungen aller Art.

Rust.

Gegen weisse Geschwulst.

Biecke.

2068. *Ry.* Emplastr. hydrarg. ciner.
 „ „ diaphor. Mynsichti $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$.
 Mal. opt. Expande supra corium.

S. Pflaster.

Anwend. Auf das Kreuz zu legen bei Kreuzweh, Rheumatalgia haemorrhoidalis.

Fricke.

2069. *Ry.* Emplastr. hydrarg. ciner.
 „ „ cicutae
 „ „ digital. purp.
 Mal.; f. emplastr.

S. Messerrückenstark auf Leder zu streichen.

Anwend. Zur Zertheilung chronischer Drüsengeschwülste.

Walther.

2070. *Ry.* Emplastr. hydrarg. ciner.
 „ „ lithargyrii simpl. $\overline{aa}$ $\overline{3\beta}$.
 Mal.; f. emplastr.

S. Auf Leder zu streichen.

Anwend. Bei entzündlicher Auftreibung der Knochen oder Knochenhaut nach vorausgeschickten Blutentleerungen.

Walther.

P. Hydrargyrus oxydulatus niger;
schwarzes Quecksilberoxydul.

(*Mercurius solubilis Hahnemanni*, *Nitras ammonicus* s. *Ammonium nitricum cum oxydo hydrargyroso*, *Mercurius praecipitatus niger*, *Turpethum nigrum*; auflösliches (unzweckmäßig) Quecksilber.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu gr. $\frac{1}{4}$ —2, zwei- bis dreimal täglich. Salbe, gr. j—viij auf 3j.

Man vermeide dieselben Verbindungen wie beim vorhergehenden Mittel.

2071. R_y. Hydrarg. oxydul. nigri gr. iij
Sacchari albi 3iij.

M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Dreimal des Tages ein Pulver.

Anwend. Gegen Syphilis Neugeborener.

Wendt.

2072. R_y. Hydrarg. oxydulat. nigri gr. jß

Olei amygdal. dulc. 3j

Pulv. gummi mimos. 3ß

Aquae flor. aurantior.

„ cerasor. āā 3vj

Syrup. emuls. 3ß.

M. terendo; f. linctus.

S. Aller 2 Stunden einen Theelöffel voll.

Anwend. Gegen Syphilis Neugeborener.

Fuchs.

2073. *Ry.* Hydrarg. oxydul. nigri gr. j—jß—ijß
Magnes. alb. gr. vj—x
Sacchari lactis ʒj.
M. f. pulv. Div. in x part aequal.

S. Täglich 3—4 Stück zu geben.

Anwend. Gegen skrofulöse Augenentzündung und Ausschläge kleiner Kinder. — Es erregt nicht so leicht Durchfall wie Kalomel, aber bisweilen Erbrechen, wo es dann mit letzterem zu vertauschen ist.

2074. *Ry.* Hydrarg. oxydul. nigri gr. vj
Opil puri gr. iv
Lapid. cancror. gr. xxiv
Sacchari albi ʒij.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

S. Täglich 3mal ein Pulver.

Anwend. Bei primärer Syphilis, namentlich frischen Chankern und im Anfange der sekundären Syphilis.

Wendt.

2075. *Ry.* Hydrarg. oxydul. nigri gr. v
Aquae laurocerasi ʒiij.

S. Täglich einigemal einige Tropfen in das Auge fallen zu lassen.

Anwend. Gegen Verdunkelung der Hornhaut.

Richter.

2076. *Ry.* Hydrarg. oxydul. nigri ʒij
Butyr. rec. insulsi ʒij
Camphorae gr. iv.
M. f. unguentum.

S. Augensalbe.

Anwend. Bei gonorrhöischer Augenentzündung nach vorgeschickter Blutentziehung.

Bell.

2077. *Ry.* Hydrarg. oxydul. nigri gr. j
Opium puri gr. ij
Unguenti rosati 3j.
M. exacte.

S. Einer Linse gross auf die innere Fläche der Augenlider zu bringen.

Anwend. In der Ophthalmia neonatorum.

Fr. Jahn.

2078. *Ry.* Hydrarg. oxydul. nigri gr. x
Adipis suilli 3j.
M. exactiss.; f. unguentum.

S. So viel wie eine Linse beträgt in das Auge zu bringen

Anwend. Gegen Blennorrhöen der Augen, bei noch nicht ganz reizlosem Zustande, wo andere Quecksilbermittel noch nicht vertragen werden.

Blasius.

Q. Hydrargyrus phosphoricus oxydulatus; phosphorsaures Quecksilberoxydul.

(*Mercurius phosphoratus.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen (zweckmässiger), zu gr. $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{2}$, zweimal täglich. In Salbe, gr. v—vj auf 3j.

Man vermeide Alkalien, kohlens., schwefels. und salzs. Salze, starke Säuren, Schwefellebern und Seifen.

2079. *Ry.* Hydrarg. phosphor. oxydul. gr. ij
Pulv. cort. cascarill. 3ij.
M. f. pulv. Div. in xij part. aequal.

D. S. Täglich 3 Pulver zu nehmen.

Anwend. Gegen Lustseuche.

Bemer.

2080. *Ry.* Hydrarg. phosphor. oxydul. gr. ix
 , Antimon. tartaris. gr. j
 Opii crudi subt. pulv. gr. vj
 Confect. rosar. canin. q. s.
 F. pil. vj. Consp. lycop.

D. S. Abends beim Schlafengehen eine Pille.

Anwend. Gegen alte venerische Geschwüre, sekundäre Syphilis, syphilitische Augenentzündung, Rheumatismen und chronische Hautausschläge. Dabei einen Trank aus Sarsaparille, Guajak, Sassafras.

Harris u. Sprague.

2081. *Ry.* Hydrarg. phosphor. oxydul. gr. iv
 Cort. cinnamom. gr xiv
 Sacchari albi 3ß.
 M. f. pulv. Div in viij part aequal

D. S. Früh und Abends ein Stück zu nehmen.

Anwend. Bei eingewurzelter Syphilis.

Schwartze.

2082. *Ry.* Hydrarg. phosphor. oxydul. 3j
 Axung. porci 3xj.
 M. f. unguentum.

S. Aller 12 Stunden gr. vj in die Leisten und in die Achselgrube einzureiben.

Anwend. Gegen üble syphilitische Erscheinungen. — Nie bedurfte es mehr als 3ij. 5—6 Einreibungen genügten.

Albano.

R. Hydrargyrus sulphuratus niger;
schwarzes Schwefelquecksilber.

(*Aethiops mineralis s. mercurialis, Sulphure-
tum Hydrargyri nigrum s. simplex; minerali-
scher Quecksilbermohr.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Tro-
chisken, zu gr. v — xij, zwei - dreimal täglich. Salbe,
3j auf 3j.

Man vermeide Verbindungen mit Salzbildern, Säuren
und sauren Salzen.

2083. R_y. Hydrarg. sulphurat. nigri gr. viij
Magnes. carbon. gr. iv.
Elaeosacch. foenicul. 3ß.
M. f. pulv. Dispens. tal. dos. vj.

S. Täglich drei Pulver zu nehmen.

Anwend. Bei Drüsenleiden.

Richter.

2084. R_y. Hydrarg. sulphurat. nigri gr. jß—viij.
Herb. violae tricolor. gr. iv—x
Sacchari lactis gr. iij—vj.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. xij.

D. S. Früh, Nachmittags und Abends 1 Stück.

Anwend. Gegen Milchschorf der Kinder.

Kopp.

2085. *Ry.* Hydrarg. sulphurat. nigri
 Extr. dulcamar. āā 3ij
 Pulv. rad. althaeae q. s.
 F. pil. cxx. Consp. lycop.

S. Früh, Nachmittags und vor Schlafengehen 4
 —5 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Flechten.

Kopp.

2086. *Ry.* Hydrarg. sulphurat. nigri 3iij
 Sulphur. antimon. aurant. ʒj
 Guajaci
 Sapon. med. āā 3j
 Extr. dulcamar. 3ij.
 M. f. pil. cl. Consp. calam. aromat.

S. Früh, Nachmittags und Abends 8 Stück.

Anwend. In gleichen Fällen.

Kopp.

2087. *Ry.* Hydrarg. sulphurat. nigri 3β
 Guajaci
 Sapon. venet āā 3ij
 Sulphur. stibiat. aurant. ʒij.
 M. f. c. extr. marrub. l. cent. min. pil. gr. ij.
 Consp. cinnamom.

S. Abends und Morgens 10 Stück.

Anwend. Gegen chronische gichtische und rheumatische Beschwerden.

Baldinger.

S. Hydrargyrus sulphuratus ruber factitius; künstlicher Zinnober.

(*Cinnabaris factitia*, *Hydrargyrus persulphuratus*, *Sulphuretum Hydrargyri rubrum*; rothes Schwefelquecksilber, Vermillon.)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, zu gr. v — xx, 2 — 3 mal täglich. Aeusserlich zu Salbe, $\bar{3}j$ — $\bar{ij}$ auf $\bar{3}j$; zu Räucherungen, $\bar{3}ij$ — $\bar{ij}$.

Man vermeide Salzbilder.

2088. *Ry.* Cinnab. factit.
Bismuth. praec. nitric.
Herb. nicotianae $\bar{a}\bar{a}$ gr. xx
Extr. aloes aquos. gr. v.
M. f. pulv. Div. in xx part. aequal.

S. Eine Stunde nach dem Frühstück und beim Schlafengehen ein Pulver (Kindern $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$) zu nehmen.

Anwend. In der sogenannten Epilepsia cerebralis als remedium divinum empfohlen von

Pitschaft.

2089. *Ry.* Cinnab. factit. $\bar{3}j$
Herb. conii macul. gr. $\bar{ij}$
Hydrarg. oxydat. rubri gr. $\bar{j}$
Sacchari albi $\bar{3}\beta$.
M. f. pulv. Div. in xx part. aequal.

S. Nach dem Frühstücke und gegen Abend ein Pulver.

Anwend. Gegen vorgeschrittene Skrofelleiden und ihre hartnäckigen Metamorphosen: Winddern, Pädarthrocace, Ko-

xalgie u. s. w., neben passender äusserer Behandlung. Für Kinder von 1—2 Jahren. Bei vorgeschrittenem Alter vermehrt Pitschaft den Schierling auf gr. x und den Zinnober allmählig auf ℥ij. Bei schwächlichem Magen setzt er wohl auch Extr. aloes aquos. gr. j—ij zu.

Pitschaft.

2090. *Ry.* Hydrarg. sulphurat. flavi ℥j
Sulphur. depur. ℥ij
Adipis suilli ℥ij
Olei citri gutt xv.
M. f. unguentum.

S. Salbe.

Anwend. Gegen Flechten, besonders Herpes lichenoides.

Biett.

2091. *Ry.* Cinnab. alcohol. part. ij
Ammon. muriat. part. j
Axung. porci part. xxxij.
Misce et paulatim adde
Aquae rosar. part. ij.

S. Ein bis zwei Quentchen einzureiben.

Anwend. Gegen Prurigo pedicularis und zur Verminderung der Läuse.

Hôp. St. Louis. Paris.

734 HYDRARGYRUS SULPHURATO-STIBIATUS.

T. Hydrargyrus sulphurato-stibiatus;
Spiessglanzmohr.

(*Aethiops antimonialis, Sulphuretum Hydrargyri et Stibii; schwefelichtes Spiessglanz-quecksilber.*)

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, Bissen, Trochisken, zu gr. v—xij, 2—3mal täglich.

Man vermeide Salzbilder, Säuren und saure Salze.

2092. R_y. Hydrarg. stibiato-sulphur. 3ß—jß
Lapid. cancror. praep. 3j
Elaeosacch. foeniculi 3ij.
M. f. pulvis.

S. Dreimal täglich eine Messerspitze voll.

Anwend. Gegen Skrofeln und skrofulöse Exantheme der Kinder.

Berends.

2093. R_y. Hydrarg. stibiato-sulphur. gr. vj
Herb. conii macul. gr. ij
Magnes. carbon. gr. viij.
M. f. pulv. Disp. tal. dos. x.

D. S. Täglich dreimal ein Pulver.

Anwend. Gegen Skrofeln.

Schubarth.

2094. *Ry.* Hydrarg. stibiato-sulphur. gr. xxiv
 Natri carbon. sicci gr. xvij
 Cort. ligni sassafras pulv.
 Sacchari albi āā 3j.

M. f. pulv. Div. in vj part. aequal.

S. Zweimal täglich ein Pulver.

Anwend. Gegen chronische Hautkrankheiten.

Sundelin.

2095. *Ry.* Hydrarg. stibiato-sulphur.
 Resin. guajac. nativ. āā 3j
 Rad. rhei
 Magnes. carbon.
 Sacchari albi āā 3ß.

M. f. pulv. D. ad scatul.

S. Täglich 2—3mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Gegen skrofulöse Augenleiden mit Photophobie eines 4—6jährigen Kindes.

Jüngken.

2096. *Ry.* Hydrarg. stibiato-sulphur. gr. iv—vj
 Resin. guajaci nativ.
 Sacchari albi āā gr. xij.
M. f. pulv. D. tal. dos. xij.

D. S. Täglich 2—3 Stück zu nehmen.

Anwend. Gegen Lippitudo.

Rust.

2097. *Ry.* Hydrarg. stibiato-sulphur.
 Resin. guajaci nativ. āā gr. x
 Extr. conii macul. gr. iv
 Camphorae gr. ij
 Magnes. carbon. gr. iv

Sacchari albi gr. xv.

M. f. pulv. Disp. tal. dos. xv. D.

S. Täglich dreimal ein Pulver mit Holztrank.

Anwend. Gegen rheumatische Dyskrasie.

Vogt.

2098. *Ry.* Hydrarg. stibiato-sulphur.

Guajaci āā 3j

Extr. stipit. dulcamar. 3ij.

M. f. c. syrup. sacch. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Früh und Abends 8 Stück.

Anwend. Gegen atonische Gicht, gichtische Kachexie und chronische Hautausschläge.

P. Frank.

Fast eben so sind Günther's Pilulae antiherpeticae.

2099. *Ry.* Hydrarg. stibiato-sulphur.

Guajaci

Extr. dulcamar.

„ quassiae āā 3j.

M. f. pil. gr. ij. Consp. lycop.

S. Täglich 2—3mal 5—8 Stück.

Anwend. Gegen Gicht und gichtische Geschwüre.

Kessler.

U. Hydrargyrus vivus depuratus;
gereinigtes Quecksilber.

Form u. Gabe. Innerlich, zu 3iv—viij, gegen Verschlingung und Ineinanderschiebung der Eingeweide, ein bis zweimal. Man lässt einen Löffel Oel nachtrinken.

Hyoscyamus niger L. Bilsenkraut.**A. Hyoscyami herba; Bilsenkraut.**

Form u. Gabe. In Pulver, Pillen, zu gr. ij—iv—viij; im wässerigen oder halbweingeistigen Aufguss, ʒβ—j auf ʒvj; Klystier, ʒβ—j; Einspritzungen, Bähungen, Umschlag; Oelaufguss; Salbe, Pflaster, Dämpfe; Räucherungen; frische Blätter zerquetscht auf schmerzhaft Theile gelegt. Extrakt, gr. j—iij, 1—2mal; Einreibung. Tinktur, 8—20 Tropfen.

Man vermeide Alkalien, Salzbilder, salzsaures Gold, salpetersaures Silber, Quecksilbersalze, Gerbestoff.

2100. R̄y. Rad. althaeae
Herb. tussilag. āā ʒβ.

Coque cum

Aquae font. ʒviij ad rem. ʒvj.

Sub finem coct. adde

Herb. hyoscyami ʒj.

Digere vase clauso per 1/2 hor. Colat. refriger. adde

Syrup. opii ʒj.

M. S. Nach Bedürfniss 1—2 Esslöffel voll.

Anwend. Bei heftigem Reize zum Husten.

Radius.

2101. R̄y. Extr. hyoscyami ʒβ
Vini stibiati ʒij.

S. S. Aller 2—3 Stunden 5—10 Tropfen.

Anwend. Gegen Keuchhusten.

Mufeland.

2102. R̄y. Extr. hyoscyami gr. iv
Gummi arabici ʒj

Olei amygdal. dulc. ℥ij

Syrup. amygdal. ℥vj.

M. D. S. Umgeschüttelt öfters einen Theelöffel voll zu nehmen.

Anwend. Bei Krampf- und Reizhusten der Kinder.

Hufeland.

2103. *Rx.* Extr. hyoscyami ℥ij
Sacchari lactis ℥vjß
Rad. liquirit. ℥ß
Gummi mimos. ℥ij
Elaeosacch. foeniculi ℥iiijß.

M. f. pulv.

S. Täglich 3—4mal 1 Theelöffel voll mit Eibischthee zu nehmen.

Anwend. Gegen Katarrh mit krampfartigem Husten

Vogt.

2104. *Rx.* Extr. hyoscyami
Zinci oxydat. albi āā ℥ß
Magnes. subcarb. ℥ß
Sacchari lactis ℥ijß.

M. f. pulv. Div. in x part. aequal.

S. Aller 3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Pulvis sedativus Vogleri.

Anwend. Als besänftigendes und krampfstillendes Mittel.

Vogler.

2105. *Rx.* Extr. hyoscyami gr. j—ijj
Rad. ipecacuanhae gr. ¼
Kali nitrici dep. ℥ß

Cort. cinnamom. gr. v.
M. f. pulv. Dent. tal. dos. x.

S. Aller 2 — 3 Stunden 1 Pulver in schwachem Melissen- oder Schafgarbentheee.

Anwend. Bei Hämorrhagieen, besonders dem Bluthusten.

Fr. Jahn.

2106. *Ry.* Extr. hyoscyami
Pulv. herb. hyoscyami āā gr. x.
M. f. pil. gr. j. Consp. lycop.

S. Alle Stunden 1 Pille bis zum Nachlassen der Zufälle.

Pilulae sedativae Hufelandi

Anwend. Zur Beseltigung aller Arten von Schmerzen und Krämpfen, selbst syphilitischen Affektionen.

Hufeland.

2107. *Ry.* Extr. hyoscyami 3ß
Herb. digitalis
Rad. ipecacuanhae āā gr. v
Opii puri gr. ij
Pulv. gummi mimosae q. s.
F. pil. xxx. Consp. lycop.

S. Aller 3 Stunden 1 Pille.

Anwend. Gegen Krampfhusten.

Heim.

2108. *Ry.* Extr. hyoscyami 3ß
Tinct. valerianae aether. 5j.

S. S. Alle halbe Stunden 15 Tropfen in Pfeffermünzentheee zu nehmen.

Anwend. Gegen Kopfschmerz hysterischer und nervenschwacher Frauen.

Fr. Jahn.

2109. *Ry.* Tinct. hyoscyami 3j
 „ guajaci 3ij.

M. S. *Früh und Abends 30 Tropfen in Wasser.*

Anwend. Gegen Magenkrampf.

Harrison.

2110. *Ry.* Olei hyoscyami cocti 3ß
 Gummi mimos. pulv. 3vj
 Syrup. althaeae

M. int. et affunde sensim

Aquae cerasor. nigr. 3vj.

D. S. *Stündlich 1 Esslöffel.*

Anwend. Gegen Haemoptysis spastica.

Richter. Marless.

2111. *Ry.* Extr. hyoscyami 3j.

Solve in

Aquae destill. 3j.

M. D. S. *Aller 4 Stunden einige Tropfen lau-
 warm in's Auge zu träufeln.*

Anwend. Gegen Iritis.

J. A. Schmidt.

2112. *Ry.* Extr. hyoscyami 3ß
 Aquae destill. 3ß.

S. S. *In's Auge zu träufeln.*

Anwend. Zur Erweiterung der Pupille beim grauen Staar.

Himly.

2113. *Ry.* Herb. hyoscyami
 Capit. papav. albi

Herb. althaeae $\overline{aa}$ $\overline{3j}$.

Coque ex

Aquae font. $\mathcal{Q}$ iv ad colat. $\mathcal{Q}$ iiij.

S. Flanell oder Leinwandtücher eingetaucht und ausgedrückt mässig warm aufzulegen.

Anwend. Gegen Schmerzen und Stockungen im Unterleibe.

J. A. Schmidt.

2114. *Ry.* Herb. hyoscyami conc.
Flor. chamomill. vulg. conc.
Furfur. triticei $\overline{aa}$ $\overline{3j\beta}$
Camphorae rasae $\overline{3j}$.

M. f. species.

D. S. Den dritten Theil mit $\frac{3}{4}$ Quart heissen Wassers zu übergiessen und mittelst eines Trichters die Dämpfe an das Ohr zu leiten.

Anwend. Bei Ohrenzwang.

Vogt.

2115. *Ry.* Herb. hyoscyami
„ conii macul. $\overline{aa}$ $\overline{3j}$
Semin. lini $\overline{3iv}$.
M. f. pulv. gross.

D. S. Die Hälfte mit kochender Milch zu einem dicken Brei zu machen.

Anwend. Bei entzündlich-schmerzhaften Abscessen.

Phoebus.

v. Gräfe bedient sich eines Kataplames aus gleicher Theilen gegen Augenliderschwieligkeit und Gerstenkörner.

2116. *Ry.* Herb. hyoscyami
„ ledi palustris
Summit. millefol.
Fol. aurantior.

Rad. valerian. āā ʒβ.

C. M. f. species.

S. Zwei Quentchen mit ʒj—jβ Wasser zu kochen und lau als Klystier anzuwenden.

Anwend. In hartnäckigen Krämpfen und Zuckungen, heftigem, galligem Erbrechen, Bluthusten und Blutbrechen, einseitigem Kopfweh, Koliken, Darmgicht u. s. w. Zuvor ein eröffnendes Klystier.

Wendt.

2117. Rx. Herb. hyoscyami ʒj

Opii puri gr. ij

Amyli ʒβ.

C. C. M. f. species.

S. Mit zwei Weingläsern voll frischen Wassers übergossen und durchgeseiht zum Klystier.

Anwend. Gegen kramphhafte Strikturen der Harnröhre, des Sphinkters der Blase und des Mastdarmes, Stuhlzwang bei Ruhr u. s. w.

Vogt.

2118. Rx. Olei hyoscyami infusi ʒj

Liqu. ammon. caustici

„ „ succinici

Tinct. opii croc. āā ʒij.

M. f. liniment.

S. Zweistündlich 1 Theelöffel voll in den Unterleib einzureiben.

Anwend. Bei Seitenstich, Kolik, falschen Wehen, Strangurie.

Starke.

2119. Rx. Extr. hyoscyami ʒβ

Saponis albi ʒij

Olei lini ʒvj.

M. f. liniment.

S. Zum Einreiben.

Anwend. Gegen Drüsenanschwellungen.

Dupuytren.

2120. *Rx.* Extr. hyoscyami gr. xij
Butyr. rec. insulsi ʒij.
M. f. unguentum.

S. Täglich 3 mal erbsengross in die Gegend des foramen supraorbitale und in die Aussenseite des oberen Augenlides einzureiben.

Anwend. Gegen skrofulöse Lichtscheu.

Wutzer.

2121. *Rx.* Extr. hyoscyami ʒß
„ opii gr. v
Ungt. hydrarg. cinerei ʒj.
M. f. unguentum.

S. In die Stirn- und Schläfengegend einzureiben.

Anwend. Bei Entzündung der Retina.

v. Gräfe.

B. Hyoscyami semina; Bilsenkrautsamen.

Form u. Gabe. In Emulsion, ʒß — ʒß auf ʒvj, 2stündlich 1 Esslöffel. Extrakt, gr. ʒ — ij, ein- bis zweimal täglich.

2122. *Rx.* Semin. hyoscyami gr. x — xxx
„ papav. alb. ʒjß — ij
Aquae cerasor. nigr. ʒviiij
Syrup. amygdal. ʒij.
M. f. emulsio.

S. Alle Stunden 1/2 — 1 Esslöffel.

Anwend. Gegen Nervenschmerzen, Schlaflosigkeit.

Kraus.

2123. R_y. Semin. hyoscyami gr. x—xx

„ papav. albi ʒvj

Aquae cerasor. nigr. ʒvj

Syrup. emulsivi ʒβ.

M. f. emulsio.

D. S. Aller 2 Stunden einen Esslöffel voll.

Anwend. Gegen Blutspucken mit erhöhter, krampfhafter Reizbarkeit.


Schwartze.



Druck von Fr. Rückmann in Leipzig.

Med.

Walther



Walther, Johann Carl Wilhelm,

Ausführliches Recept-Taschenbuch in alphabetischer Ordnung für praktische
Aerzte und Wundärzte mit einleitenden Bemerkungen über die Art und Weise
Recepte zu verordnen
Bd.: 1

Leipzig 1847

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Med 4757 -1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11192802-3